

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משוקקת ללא מרשם רופא

אקמולי® פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תות שדה

אקמולי® פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תותי-פרוטי

הרכב
כל 1 מ"ל מכיל:

פראצטמול (Paracetamol) 50 מ"ג.
לימדיע על מרכיבים בלתי פעילים ולארגינים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על הטיפול, אם יש יך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. התרופה מיועדת לילדים, אך בילדים מתחת לגיל 3 שנים, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש. יש ליוועץ את התרופה בצורה נכונה. הטיפול ברוקח אם הניך זקוק למידע נוסף, יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה. התרופה מיועדת לילדים ויכולה להלקוח גם על ידי מבוגרים. המידע בעלון זה מיועד עבור ילדים ועבור מבוגרים הנוטלים תרופה זו.

1. למה מיועדת התרופה?
התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום.
קבוצה תרופוטית:
משכך כאבים ומוריד חום.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פראצטמול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין לטילול תכשירי המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב תופעות עוריות חמורות.
- אם אתה או ילדך רגישים למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, יש להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לזקק בכבד כאשר:
 - ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
 - בתקופות הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
 - נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא.
אין לטילול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למניעת מינון יתר/הרעלה של פראצטמול.
יש להימנע מלקיחת מינון גבוה של תרופה זו (גם אם בתוך טווח המינון המומלץ) בזמן צום.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם אתה או ילדך סובלים או סבלתם בעבר מ:

- ליקוי בתפקוד הכבד
- ליקוי בתפקוד הכליה
- אלכוהוליזם
- צהבת

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה וויטמינים, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידיע את הרופא או הרוקח אם הניך נוטל תרופה מהקבוצות הבאות או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה:
פניטואין, קרבמזפין, ברביטורטים (לטיפול באפילפסיה)
תרופות נגד קרישת דם (כמו וארפרין)
תרופות לטיפול בדיכאון (כגון נוגדי דיכאון טריציקליים)
תרופות המחזרות ייצור אנזימים בכבד (כגון ברביטורטים)
תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים
סטולופרמיד או דומפרדון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות עיכול אחרות)
אנטיביוטיקות (כגון ריפמפיצין או כלורמפניקול)
פרובנצידי (טיפול בשידודן)
כולסטרין (להפחתת עודף שומנים בדם)

אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול
יש לידע את הרופא או את הרוקח אתה אתה לוקח פלוקלוקסצילין flucloxacillin (אנטיביוטיקה) עקב סיכון חמור לאי תקינות בדם ובגודלים High anion gap metabolic acidosis) אשר מחייבת טיפול דחוף ועלולה לקרות במיוחד במקרים של גיעה ללייטית חמורה, אלחם עם (מצב בו חיידיקים ופרעילים שלהם נמצאים בדם ומובילים לגיעה באיברים), תת תזונה, אלכוהוליזם כרוני, ובמקרים שיש שימוש במינון יומי מקסימלי של פראצטמול.

שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך אלכוהול בגלל הגדלת הסיכון לזקק בכבד. היריון והנקה
אם אתה בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה. יש לטילול את המנה הנמוכה ביותר היעילה עבורך בהנחיית הרופא או הרוקח החום, למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. היועצו: ברופא אם אין הקלה באבא או בחום או אם את צריכה לטילול את התרופה לעיתים תכופות יותר.

שימוש בילדים

יש להיוועץ ברופא בעת השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים.
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה את המרכיב קסיליטול בכמות של 1.5 גרם בכל 5 מ"ל סירופ. ייתכן השפעה משלשלת קלה. הערך הקלורי הוא 2.4 קילוקלוריות ל-1 גרם קסיליטול.

התרופה מכילה FDC colour No. 40 העלול לגרום להרעלה אלרגית.

התרופה מכילה תנרן בכמות של 5.86 מ"ג בכל 5 מ"ל סירופ. התרופה מכילה פחות מ-1mmol (23 מ"ג) תנרן לכל 5 מ"ל סירופ ולפיכך נחשבת בטוחה לנולד תנרן.

תרופה זו מכילה 625 מ"ג פרופילן גליקול בכל 5 מ"ל סירופ. היוועץ ברופא אם ברוקח לפני תחילת הטיפול:

- אם הילד שלך מתחת לגיל 5 שנים, במיוחד אם הילד שלך מוטול בתרופות אחרות המכילות פרופילן גליקול או אלכוהול.
- אין לקחת את התרופה אם אתה סובל ממחלות כבד או כליה. ייתכן שהרופא יתן לך לבצע בדיקות נוספות במהלך נטילת תרופה זו.
- אין לקחת את התרופה אם את בהריון או מניקה, אלא אם המומלץ על ידי הרופא. ייתכן שהרופא יתן לך לבצע בדיקות נוספות במהלך נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

ילדים
מצא את המינון המתאים בטבלאות המופיעות בהמשך.

אם ידוע לך משקל הילד - יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל המציינת מינון לפי משקל.
רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל הילד.
טבלת משקל עבור אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל:

משקל הילד	מנה במ"ל	מספר מנות מקסימלי ליממה
3 ק"ג	0.9	עד 5 פעמים ביממה
4 ק"ג	1.2	עד 5 פעמים ביממה
5 ק"ג	1.5	עד 5 פעמים ביממה
6 ק"ג	1.8	עד 5 פעמים ביממה
7 ק"ג	2.1	עד 5 פעמים ביממה
8 ק"ג	2.4	עד 5 פעמים ביממה
9 ק"ג	2.7	עד 5 פעמים ביממה
10 ק"ג	3.0	עד 5 פעמים ביממה
11 ק"ג	3.3	עד 5 פעמים ביממה
12 ק"ג	3.6	עד 5 פעמים ביממה
13 ק"ג	3.9	עד 5 פעמים ביממה
14 ק"ג	4.2	עד 5 פעמים ביממה
15 ק"ג	4.5	עד 5 פעמים ביממה
16 ק"ג	4.8	עד 5 פעמים ביממה
17 ק"ג	5.1	עד 5 פעמים ביממה
18 ק"ג	5.4	עד 5 פעמים ביממה
19 ק"ג	5.7	עד 5 פעמים ביממה
20 ק"ג	6	עד 5 פעמים ביממה
21 ק"ג	6.3	עד 5 פעמים ביממה
22 ק"ג	6.6	עד 5 פעמים ביממה
23 ק"ג	6.9	עד 5 פעמים ביממה
24 ק"ג	7.2	עד 5 פעמים ביממה
25 ק"ג	7.5	עד 5 פעמים ביממה
26 ק"ג	7.8	עד 5 פעמים ביממה
27 ק"ג	8.1	עד 5 פעמים ביממה
28 ק"ג	8.4	עד 5 פעמים ביממה
29 ק"ג	8.7	עד 5 פעמים ביממה
30 ק"ג	9	עד 5 פעמים ביממה

טבלת גיל עבור אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל. רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

גיל הילד	מנה במ"ל	מספר מנות מקסימלי ליממה
0-3 חודשים	0.8	עד 5 פעמים ביממה
4-11 חודשים	1.6	עד 5 פעמים ביממה
12-23 חודשים	2.4	עד 5 פעמים ביממה
2-3 שנים	3.2	עד 5 פעמים ביממה
4-5 שנים	4.8	עד 5 פעמים ביממה
6-8 שנים	6.4	עד 5 פעמים ביממה
9-10 שנים	8	עד 5 פעמים ביממה
11 שנים	9.6	עד 5 פעמים ביממה

אין לטבול על המנה המומלצת או על מספר המנות המקסימלי ביממה. יש לטילולת המנות במרווחים של לפחות 4 שעות.

ילדים מגיל 12 שנים ומעלה:
10 מ"ל כל 4-5 שעות, לפי הצורך. אין לטבול על המנה המומלצת.

מבוגרים:
10 מ"ל כל 4-5 שעות, לפי הצורך. אין לטבול על 4 גרם של פראצטמול (המצוי ב-80 מ"ל סירופ) במשך 24 שעות.

יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

אופן השימוש
יש להשתמש במזרק במזרק המצורף לשם דיוק במינון. כל שנת (קו) במזרק מודדת 0.1 מ"ל.

יש להכניס את המזרק לתוך הפתח המיוחד שבצוואר הבקבוק. בעוד

המזרק מוחזק במקומו, יש להפוך את הבקבוק ולמשך בעדינות את הבוכנה של המזרק כלפי מטה עד הסימון המבוקש (כמות התרופה במ"ל). בסיום המילוי, יש להפוך בחזרה את הבקבוק ולשחרר בעדינות את המזרק, יש להכניס את המזרק לפי של הילד לכוון הלחי ולרוקן את תכולתו באטיות.

לאחר השימוש ולפני כל הכנסה נוספת של המזרק לבקבוק, יש להפריד את חלקי המזרק ולשטוף במים פושרים וסבון.

אם אתה או ילדך נטלת מנת יתר או אם בטעות בילד ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. גם אם אתה חש בטוב על אף נטילת מינון יתר, טיפול מיידי הוא חיוני, **בגלל הסיכון להתפתחות זקק חמור לכבד.** יש לטילול יתר לעולה לגרום לתסמינים הבאים: בחילה, הקאה, שלשול, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בכטן העליונה, וייתכן שהתסמינים לא משקפים את חומרת הזקק לכבד.

אין לטילול תרופות בחושן! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שיהיך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם היך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד:

- אם מופיעות תגובות אלרגיות כגון פריחה וגרד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון, או הצוואר אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה, התנפחות של הגפיים.
- פראצטמול עלול לגרום במקרים נדירים, להופעת מחלות עור חריפות שהסימנים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, התקלפות ונגעים בעור, גפיעה עורית נרחבת.
- תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ולא סבלת מתופעות לוואי. אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא.
- אם מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: דימומים, חבורות, התפתחות דלקות ביתר קלות כגון דלקת גרון.
- בשימוש ממושך בתרופה אתה עלול לסבול מבעיות חמורות בתפקודי הכליות והכבד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי ממחירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות ליחיה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלהו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה ואל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-C°-25.** אין לאחסן במקרה.
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה עד לתאריך התפוגה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תות שדה מכיל גם:

Water, xylitol, propylene glycol, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour strawberry, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No. 40

נוסף על המרכיב הפעיל, אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תותי-פרוטי מכיל גם:

Water, xylitol, propylene glycol, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour tutti-frutti, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No. 40, colour blue FDC No. 2

יצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

כלל אריזה בקבוק סירופ ומזרק לשם דיוק במינון.
אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תות שדה: סירופ שקוף בצבע אדום-חום אדום.
אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תותי-פרוטי: סירופ שקוף בצבע ורוד-אדום חום אדום.

גודל האריזה 50 מ"ל או 100 מ"ל. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

יצרן: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114, בנימינה 3055002, ישראל.

בעל הרישום: טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

עלון זה נערך במאי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תות שדה: 140.18.31762

אקמולי פורטה 50 מ"ג/1 מ"ל בטעם תותי-פרוטי: 140.17.31761

לשם הפסות וההקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.