نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصي (مستحضرات) 1986 يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب أنظمة الصيادلة

أكامولي® فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم الفراولة

أكامولي® فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم توتي-فروتي

التركيبة

سرميبه يحتوي كل 1 ملل على: پاراسينامول (Paracetamol) 50 ملغ. للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 -"معلومات إضافية"

"معلومات إضافية".

هُ أَلْ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك الشواء . كوني هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء . إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع يعطى هذا الدواء دون الحاجة إلى وصفة طبيب. الدواء مخصص للأولاء، لكن يجب استشارة المايت عمرهم أعوام . وجب استشارة أقل من 3 أعوام. يجب استعمال الدواء بشكل صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى استعمال الحوام شكل استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تتلاش استعمال الرغم من استعمال الاعراض خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

للأولاد ويمكن استعماله في المعلومات الواردة في الدواء مخصص للأولاد ويمكن استعماله أيضًا من قبل البالغين المعلومات الواردة في هذه النشرة مخصصة للأولاد وللبالغين الذين يستعملون هذا الدواء.

لأي غرض مخصص هذا الدواء؟
 الدواء مخصص للسكين الآلام ولخفض الحرارة.
 الفصيلة العلاجية:
 مسكن للآلام وخافض للحرارة.

2. قبل استعمال الدواء لا يجوز استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة پاراسيتامول أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

مذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

حرى. ذا وُجدت لديك أو لدى ولدك حساسية لأي غذاء أو لأي دواء، فعليك إخبار الطبيب بذلك إذا

عداء أو لاي دواء، فعليك إحبار الطبيب بدلك قبل استعمال الدواء. يسبب ضررًا اللكبد عندما: ويسب ضررًا اللكبد عندما: الموصى بها أو لفترة مطوّلة. ويتم شرب المشروبات الكحولية في فترة العلاج.

خلل في وطيفة الكلية الكحولية

اليرقان التفاعلات بين الأدوية التفاعلات بين الأدوية أدا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أجرى بصفة أدوية أجرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة أطبيب، إضافات خذاتية وفيتامينات، فأخبر إطلبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواءً من الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواءً من الفصائل التالية، أو إذا أنهيت اللو علاجًا بالدواء: • فينيتونين، كاربامازيين، الباربيتورات (لعلاج الصرع) الصرع، الصرع) أدوية مضادة لتخثر

الصرع)
أدوية مضادة لتخثر الدم (مثل وارفارين)
أدوية مصادة لتخثر الدم (مثل مصادات الاكتناب
الثلاثية الحلقات)
أدوية تحفز إنتاج الإنزيمات في الكبد (مثل
الدربيتورات)
مستحضرات مصادات الالتهاب اللاستير ويدية
ميتو كلوپر اميد أو دومپيريدون (لعلاج العثيان،
منتوكلوپر اميد أو دومپيريدون (لعلاج العثيان،
منتوكلوپر اميد أو دومپيريدون (لعلاج العثيان،
منتوكلوپر اميد أو دومپيريدون (لعلاج العثيان،
كاور امفينيكرل)

التّقيو ومشاكل الهضم الأخرى) مضادات حيوية (مثل ريفاميبسين أو كلار مفينيكرل) و بروبينيسيد (لعلاج النقرس) و بروبينيسيد (لعلاج النقرس) و كوليستيرامين (لتقليل فاتض الدهنيات في الدم) مستحضرات أخرى تحتوي على برا اسيتمال والمستحضرات أخرى تحتوي على برا اسيتمال إذا كنت تستعمل فلوكلوكساسيلين أو الصيدلي إذا كنت ألام وفي السوائل (eductoxacillin) ما يستوجب في الدم وفي السوائل (metabolic acidosis من العلاج المستعجل، وقد يحدث خاصة في العلاج المستعجل، وقد يحدث خاصة في العرق وضع تتواجد فيه الجرائيم ومسمومها في الدرعة اليومية القصوى من براسيتامول المستهلاك الكحول المستعمل باراسيتامول واستهلاك الكحول المستعمل باراسيتامول واستهلاك الكحول المستعمل باراسيتامول واستهلاك الكحول المستعمل والإرضاع المحول خلال فترة العلاج المستعمل الدواء يخدس تطالق المشتهلات المخبوب المتعمل الدواء يجب تناول أقل الدراء الأقصر مدة زمنية ممكنة استثميري قبل الدراء الأقصر مدة زمنية ممكنة استشير و إذا الخصر مدة زمنية ممكنة استشير و المستبيات الحراء المؤسرة الخفيف الطبب إذا لم يطرأ اخفيف للالم والو اخفض الطبب إذا لم يطرأ اخفيف للالم أو الفصر مدة زمنية ممكنة استشيري المستشول الطبب إذا لم يطرأ اخفيف للالم أو المعمى أو إذا

برت المتبسب مدة زمنية ممكنة. استشيري المرارة، الأقصر مدة زمنية ممكنة. استشيري الطبيب إذا لم يطرأ تخفيف للألم أو للحمى أو إذا الطبيب الخبيب إذا لم يطرا نحقيف للالم أو للحمى أو إذا كان عليك استعمال الدواء في أحيان أكثر تقاربًا. الاستعمال لدى الأولاد يجب استشارة الطبيب عند استعمال هذا الدواء لدى الأولاد الذين يبلغون أقل من 3 أعوام من لدى الأولاد الذين يبلغون أقل من 3 أعوام من

ى الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عراض الجانبية وكذلك عن أي د

جديد على الوالدين بداح الطبيب المعلج على المحالج على الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء ويوري الدواء على المُحَلِّي كسلِيتول (رايليتول) بكمية 1.5 غم في كل 5 ملل من الشراب قد يكون هناك تأثير مُسْهل خفيف الشراب قد يكون هناك كالمراب المراب المراب على المراب المراب على الم الشراب. قد يكون هنك ىانير مىموس ــــــ.. القيمة الكالورية هي 2.4 كيلوكالوري لـ 1 غم . كسيليتول.

كسيليتول. يحتوي الدواء على colour red FDC 40 No. 40 الذي قد يسبب رد فعل تحسسيًا. يحتوي الدواء على الصوديوم بكمية 5.86 ملغ

في كل 5 ملل من الشراب. يحتوي الدواء على أقل من 1 mmol (23 ملغ) من الصودبوم في كل 5 ملل من الشراب ولذلك يُعتبر خاليًا من الصودبوم. من الصودبوم. ويحتري هذا الدواء على 625 ملغ من بروپبلين جليكول في كل 5 ملل من الشراب. استشر الطبيب أو الصيدلي قبل البده بالعلاج: وإذا كان عمر ولدك أقل من 5 أعوام، خلصة إذا كان ولدك يتلقى العلاج بادوية أخرى تحتوي على بروپبلين جليكول أو على الكحول.

تحتوي على پروپيلين چليدول او على الكحول، و الكحول او كالكحول و الكورة الإرزاق الكورة الإراء فحوص إضافية يحلك أن الكلية. يُحتمل أن يحيك الطبيب إلى إجراء فحوص إضافية خلال فترة استعمال هذا الدواء. و يجرز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعًا، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. يُحتمل أن يحيلك الطبيب إلى إجراء فحوص إضافية خلال فترة استعمال هذا الدواء.

كيف تستعمل الدواء؟
 عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج

الجرعة الدوانية المتبعة عند غياب تعليمات

الأولاد <u>- ي- -</u> جد الجرعة الدوائية المناسبة في الجداول الواردة لاحقًا.

محد.

الخرعة الدوانية كما يظهر في جدول الوزن الذي الخرعة الدوانية كما يظهر في جدول الوزن الذي يشير إلى الجرعة الدوانية بحسب الوزن.

قفط إذا كان وزن الولد غير معلوم - فسيتم تحديد الجرعة الدوانية بحسب العمر كما يظهر في جدول العمر الذي يشير إلى الجرعة الدوانية حده الماد، نعه المدالة،

جدول الوزن الأكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل:

رته 50 ملغ/1 ملل:	لاكامولي فور	دول الوزن	
عدد الجرعات الأقصى لكل 24 ساعة	الجرعة بالميليلتر	وزن الولد	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	0.9	3 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	1.2	4 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	1.5	5 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	1.8	6 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	2.1	7 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	2.4	8 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	2.7	9 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	3.0	10 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	3.3	11 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	3.6	12 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	3.9	13 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	4.2	14 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	4.5	15 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	4.8	16 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	5.1	17 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	5.4	18 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	5.7	19 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	6	20 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	6.3	21 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	6.6	22 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	6.9	23 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	7.2	24 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	7.5	25 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	7.8	26 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	8.1	27 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	8.4	28 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	8.7	29 كغم	
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	9	30 كغم	
دول العمر الأكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل:			

جدون المتعر و مساوي عوريد ال من تقس المسن بشكل فلا تتفاوت أوزان الأولاد من نقس المسن بشكل ملحوظ لذلك بجب الاجتهاد في استيضاح وزن الولد وتحديد الجرعة الدوانية بحسب جدول الوزن. فقط إذا لم يكن ممكنًا استيضاح وزن الولد، فيمكن تحديد الجرعة الدوانية بحسب هذا

ود، فيمل تحديد الجرعة الدوالية بحسب هدا جدول.		
عدد الجرعات الأقصى لكل 24 ساعة	الجرعة بالميليلتر	عمر الولد
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	0.8	0-3 أشهر
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	1.6	4-11 شهرًا
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	2.4	23-12 شهرًا
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	3.2	2-3 سنوات
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	4.8	4-5 سنوات
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	6.4	6-8 سنوات
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	8	9-10 سنوات
حتى 5 مرات خلال 24 ساعة	9.6	11 سنة
115 at 141	11 30 -11	1407 01

_____ بجرر الجرعة الموصى بها أو عدد رعات الأقصى خلال 24 ساعة. ب تناول/ إعطاء الجرعات بفواصل زمنية لا عن 4 ساعات. لا د من مد - - -يُمنع تجاوز الجرعات الأقص

. من عمر 12 عامًا فما فوق: لل كل 4-5 ساعات، بحسب الحاجة. يُمنع الأولاد تِجاوُز الجرعة الموصى بها.

تجاوز الجرعة الموصى بها. الساقتين المجرة المربعة الموصى بها. الساقتين الملك لك-5 ساعات، بحسب الحاجة. يُمنع تجاوز 4 غرامات من بار اسيتامول (الموجودة في 80 ملل من الشراب خلال 24 ساعة. يجب مراجعة الطبيب الحاسمة الماليب الحمى لاكثر من 3 أيام أو إذا لم تتلاش الأعراض خلال 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

كيفية الاستعمال

فية الاستعمال المحقنة المرفقة من أجل الدقة يجب استعمال المحقنة المرفقة من أجل الدقة في الجرعة الدوائية، كل علامة تأثير (خط) على المحقنة في الفوهة الخاصة يجب إدخال المحقنة في الفوهة الخاصة الموجودة في عن القنينة، بينما تكون المحقنة في مكانها، يجب قلب القنينة وسحب مكبس المحقنة بلطف إلى الأسفل حتى الوصول إلى التأثير المطلوب (كمية الدواء بالمبليلةر). بعد انتهاء التعبئة، يجب معادة الدواء بالمبليلةر). عدد انتهاء التعبئة، يجب معادة الدواء بالمبليلةر). ما كانت عليه، وتحد المحقنة الطف ما كانت عليه، وتحرير المحقنة بلطف. يجب إدخال المحقنة في فم الولد باتجاه الخد

ما سسد و بسد و بسد و بسد و بسد و بسد و بسد و بالا المحقدة في فم الوس بسد و و بعد الاستمال، وقبل كل الدخال الصنافي المحقدة في القنيلة، يجب فصل جزأي المحقدة و تشطفهما بالماء الفاتر و الصابون. و المناول و للك جرعة مفرطة أو إذا قام ولد يبلغ الدواء بالخطأ، فيجب التوجه فورًا المارة في المستشفى المدارئ في المدارئ في المدارئ في المدارئ المدارئ في المدارئ المدارئ في المدارئ ا

سرر الكبد. لا يجوز تناول الأدوية في العكمة! راجع الملصق وتكد من الجرعة في كل مرو تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية أدا كنت بحاجة اليها. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

الم الأعراض الجاتبية و المتعالل الأعراض الجاتبية المثل أن المتعالل الأعراض الجاتبية مثل أن دواء، قد يؤدي استعمال الكامولي فورته المرار، عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة المتعالل الخاتي من أي المتعالل المتعالل من أي المتعالل المتعالل من أي المتعالل من أي المتعالل المتعالل من أي المتعالل المتعالل المتعالل من أي المتعالل المتعالل المتعالل المتعالل من أي المتعالل ا

قائمه الاسرسي والمنه المسلمة فورا: أعراض جانبية خطيرة أعراض جانبية خطيرة يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب فورا: والظهرت ردود فعل تحسية مثل الطفح الطبادي والحكة، انتقاخ الوجه، الشفتين، السان، الحاق، أو الرقية مما قد يؤدي إلى صمعيات في التنفس أو البلع، انتفاخ الأطرف. قد يؤدي بإراسيتامول في حالات نادرة إلى الخير المراض جلدية حادة قد تكون علاماتها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحويصلات، التقشر والأقات في الجلد، التصرر الجلدي الموسع.

التقشر والأفات في الجلد، التضرر الجلدي الموسع.
لموسع.
قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة
إيضًا إذا استعملت في الماضي مستحضرات
تحتري على المركب الفعال پاراسيتامول ولم
تعان من أعراض جانبية .
إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف
الملاج والتوجه فورًا إلى الطبيب.
إذا ظهرت علامات على حدوث تغيرات في
الجهاز الدموي مثل: حالات نزيف دموي،
لكمات، نشوء التهابات بسهولة كبيرة مثل
عند الاستعمال المطول للدواء قد تعاني من
عند الاستعمال المطول للدواء قد تعاني من

التبليغ عن الأعراض الجانبية

لتبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة الاستمارة المتصلة التبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر،

بعب حفظه في مكان مغلق بعيدا عن متناول

أدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال

وزيئهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقوز

بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استمعال الدواء بعد تاريخ انتهاء

المحيدة شير تاريخ انتهاء المصلاحية إلى اليوم

البخير من ذلك الشير.

• يجب التخزين في درجة حرارة دون 2°25.

• يجب التخزين في المتلاجة.

• بد فتح القنينة لأول مرة يمكن استعمال الدواء

حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

م معلومات إضافية.

م معلومات إضافية.

م المعلومات إضافية.

فورته 50 ملمزار ملل بطعد الله امة أمضا على المولي على المولي على المولي على المولي على المولي على المولي المولي على المولي المؤورة 100 ملغراء المل المولي على المولي المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المولي على المولي على المولي المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المؤورة 100 ملغراء المناطق المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المؤورة 100 ملغراء المل بطعد الله أمضا على المؤورة 100 ملغراء 10

6. معلّومات إصافية المركّب الفعال، يحتوي إكامولي للإضافة الى المركّب الفعال، يحتوي إكامولي فورد 50 ملغ/1 ملل بطعم الفراولة أيضًا على: ويرد 50 ملغ/1 ملل بطعم الفراولة ايضًا على: Water, xylitol, propylene glycor, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour strawberry, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No. 40 بالإضافة إلى المركّب الفعال، يحتوي أكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم توتي-فروتي أيضًا على:

Water, xylitol, propylene glycol,

glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour tuttifrutti, ammonium glycyrrhizinate,

frutti, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanillal, colour red FDC No. 40, colour blue FDC No. 2 كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: في كل عبوة توجد قلبلة شراب، ومحقلة من أجل الدفة في الجرعة الدوائية. أكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم الغرافة. أكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم توتى خوروتي: شراب شفاف لونه وردي أحمر بني أحمر بني أحمر بني أحمر بني أحمر عجم العبوة 50 ملل أو 100 ملل. قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

حبم المجود 00 مثل أو 100 مثل كم المستور جميع أحجام العبوات. المصنع: فيتاميد للصناعات الدوائية م.ض. ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، إسرائيل. صلب. 1114 بينامين 2000000، إسرسي. صلحب الامتياز: يقع السرائيل م.ض.، شارع دفوره هانيقيئه 1124، ثل اييب 6944020 وفقًا تم تحرير هذه النشرة في أيار/مايو 2023 وفقًا الرشادات وزارة الصحة.

رقما تسجيل الدواء الصحة. رقما تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: أكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم الفراولة: 140.18.31762 أكامولي فورته 50 ملغ/1 ملل بطعم

2011 ما 1441. الملك بطعم الكامورية (ما يطعم الكامورية (ما 140.17.31761 مثل بطعم من الجا التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

ACAMOLI FORTE SYR PIL MW0523