

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

### מנטקס™ קרם

הקרם מכיל בוטנאפין הידרוכלוריד 1% w/w Butenafine Hydrochloride .  
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 6 ' מידע נוסף' וסעיף 2 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בעלון זה.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי חשוב על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורך בלבד לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

תכשיר אנטי פטרייתי לפטרת הרגליים, פטרת העור ופטרת המפשעות.  
לפטרת העור והמפשעות השימוש בתכשיר הוא לתקופה של עד 4 שבועות.  
**קבוצה תרפויטית:** אנטי פטרייתי מקבוצת בנזילאמינים.

#### 2. לפני השימוש בתרופה

##### אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לבוטנאפין הידרוכלוריד (Butenafine Hydrochloride) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים של מנטקס קרם (ראה סעיף 6 בעלון זה).

נדרשת תשומת לב וזהירות מיוחדת, אם אתה רגיש לתכשירים אנטי פטרייתיים מסוג אלילאמין (allylamine antifungals), שכן ייתכן ותהיה רגיש גם למנטקס קרם.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה  
התכשיר אינו מיועד לשימוש אורלי, עיני או אינטרווגינלי.

##### ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12.  
לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים מתחת לגיל 12.

##### אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

##### הריון הנקה ופוריות

אם הינך בהריון או מניקה ספרי על כך לרופא.  
הריון

אם הינך בהריון יש להשתמש בתרופה רק אם הורה על כך הרופא לאחר שנמצא על ידו צורך רפואי מובהק לשימוש בתרופה זו במהלך ההריון.

##### הנקה

על נשים מיניקות להמנע ממריחת התכשיר באזור השדיים .

##### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה 2 מ"ג/ג"ר סודיום בנזואט (sodium benzoate) העלול לגרום לגירוי מקומי. כמו כן, התרופה מכילה צטיל אלכוהול (cetyl alcohol) העלול לגרום לתגובות עוריות מקומיות (כגון דלקת עוד ממגע- contact dermatitis).

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
  - עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
  - המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
- המינון המקובל בדרך כלל הוא:  
לטיפול בפטרת הרגליים, יש להשתמש במנטקס קרם פעמיים ביום למשך 7 ימים, או פעם ביום למשך 4 שבועות.  
לטיפול בפטרת העור ופטרות המפשעות, יש להשתמש במנטקס קרם פעם ביום, למשך שבועיים.
- אין לעבור על המנה המומלצת.**  
יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים ורקמות ריריות (כגון פה ואף). במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף אותן היטב במים.  
לא לבלוע! תכשיר זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד.  
הדרך המקובלת לשימוש במנטקס קרם היא כדלקמן:
- מקום הטיפול חייב להיות יבש לפני השימוש במנטקס קרם. אם ברצונך להשתמש בתכשיר לאחר מקלחת, יש לייבש היטב את מקום הטיפול.
  - יש למרוח כמות מספקת של מנטקס קרם, כך שתכסה את כל מקום הטיפול.
  - אין לחבש את מקום הטיפול, אלא אם קיבלת הנחייה אחרת מהרופא.
  - יש לשטוף את הידיים היטב לאחר השימוש במנטקס קרם.
- אין להשתמש במנטקס קרם לטיפול בכל בעיה בריאותית אחרת פרט לזו שלשמה הוא נרשם.
  - יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצבך הבריאותי, אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא.
  - יש להודיע לרופא אם אין שיפור בתום הטיפול שנקבע על ידו, או אם החמיר מצבך הרפואי במהלך הטיפול.
- אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.  
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**  
**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

- כמו בכל תרופה, השימוש במנטקס קרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
- הפסק בטיפול ופנה לרופא מיד:  
במידה ומופיע גירוי, גירוד, רגישות, צריבה, שלפוחיות, נפיחות, פריחה או דלקת מקומיים, שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר (נדיר).
- בנוסף לפעילות הרצויה של התכשיר, בזמן השימוש בו עלול להופיע גירוי קל או אדמומיות העור במקום המריחה.
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי החמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון עליך להתייעץ עם הרופא מיד.**  
**דיווח על תופעות לוואי:**  
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>  
בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאג'יס באמצעות הכתובת הבאה: [Padagis.co.il](http://Padagis.co.il)

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- יש לאחסן במקום קריר באריזה המקורית, מתחת ל-25°C.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש במשך 3 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.

## 6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם את החומרים הבלתי פעילים הבאים:  
Purified water, propylene glycol dicaprilate, cetyl alcohol, glyceryl monostearate, glycerine, white soft paraffin, stearic acid, polyoxyethylene cetyl ether, diethanolamine, sodium benzoate.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
שפופרת אלומיניום המכילה 10, 15, 20 גרם קרם לבן לשימוש רב פעמי.  
ייתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.
- שם היצרן, בעל הרישום וכתובתו: פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.  
עלון זה נערך בפברואר 2024
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 11063.28947
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

02.2024