

## טוג'יאו תמייסה להזקה תעורה בעט סולוסטאר

חוּמָר פָּעֵיל: כל עט סולוסטאר ממולא מריאש מכיל 300 יחידות/ $\text{ml}$  של איסולין גלארין (insulin glargine).

כל עט סולוסטאר מספק 80-1 יחידות, בהפרשים של חידה אחת.

חוּמָר בְּלִתי פְּלִיעִים: ראה סעיף 6.

קרָא בְּעַיּוֹן אֶת הָעָלוֹן עַד סְופּוֹ בְּטֻרְמָה שְׁתַמְשׁ בְּתַרְפָּה.

עלון מילוי מידי תמצתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נספפות, פנה אל הרופא או האחות.

תרופה זו נהרשה בעבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה

להיה לך לפחות אפלו אם ראה לך כי חשבה רופאי דומה.

1. **למַה מִירְוָתָה הַתַּרְפָּה?**

טוג'יאו היא תמייסה להזקה המכילה אינסולין גלארין. אינסולין גלארין הוא אינסולין שעבָר שניי (מודיפיקציה) והוא דומה מאוד לאינסולין המאמן. לעומת 300 יחידות/ $\text{ml}$  מילימטר כטול (mEq/L), מילימטר כטול (mMol/L) של איסולין גלארין (100 יחידות/ $\text{ml}$ ).

טוג'יאו משמש לטיפול במובגרים, מתבגרים ולילדים. סוכרת היהת מלחלה משגשגת בבלוטת המין. היא עלולה לגרום לבעיות נפשיות (כגון אפיגרין [אדרנליין], סלבטומל, טריבורולין, לאסומנה).

רמת הסוכר בدم עלולה לעלות או לרדת אם אתה לוקח:

- חומשי בטוא קלונדין (ללחץ דם גבוה).

- מלחי ליתום (לבעוות וPsioter).

- חומשי בטוא לשימוש רפואיים אחרים (שנמצאים בשל גלגולת המין).

- אלואופין, קלאופין ונוגזרות פנטיאזינים (כגון אפיגרין [אדרנליין], גאנטידין וסורפין - ללחץ דם גבוה) עשויים להשפיע על רמת סוכר גובה מידי בדם (היפוגליקמיה).

הם עשויים להשפיע על רמת סוכר גובה מידי בדם (היפוגליקמיה).

לך שרים יכול להשפיע על רמת סוכר גובה מידי.

שים בשימוש בתרופה בדם איסולין גלארין (3 אינסולין במל' לבלוטת אינסולין גלארין 100 יחידות/ $\text{ml}$ ).

טוג'יאו משמש לטיפול בעורך בתרופה בדם (היפוגליקמיה). מגיל 6 שנים. סוכרת היהת מלחלה שבחורה ציביה ולאורך זמן.

טוג'יאו מושירה לשוליטה על סוכרך. אם דודש, אתה יכול לשונת את זין ההזקה שלך. זאת כיון שהתרופה מושירה את רמת הסוכר בדם ייורר פעמיים מכך.

בדם לאורך זמן (ראה סעיף 3).

2. **לפְנֵי השימוש בתַּרְפָּה:**

אין להשתמש בתַּרְפָּה: אם הנר גרש (אלרגי) לאינסולין גלארין או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של תרופה זו (ראה סעיף 6).

ازהרות מיחוד הנוגעת לשימוש בתַּרְפָּה:

שוחח עם הרופא או האחות לפני תחילת השימוש בתוג'יאו.

עקבו בבדיקות אוורור הוראות המינין, הנטרו (בדיקות דם ושתן), דיאטת ועיפוי גוף/רוני (בבדיקה פיסית או אימון) וטיניקת החזקה.

שאוחרן קיבלת הרופא.

שים לב מיחסם של נזירים (במיוחד נזירים מידי) או גבואה מידי:

• רמת הסוכר בדם גבוהה או גבוהה מידי (היפוגליקמיה).

בדם נזיר מידי, עקוב אחר הוראות להזקה (היפוגליקמיה) (ראה סעיף 3).

אם אתה עובר מאיינסולין סוגו, שם איןך אחר, ייורר פעמיים מכך.

צורך בשינוי מינון איינסולין שלך.

• פיגוליטון. ראה "שימוש בפיוגוליטון ייך עד עם איינסולין".

ודא שאתה משתמש באינסולין הנכון. דודש על טיעוות בתרופה במיוחד נזירים מידי (היפוגליקמיה).

טיעוות בתרופה במיוחד נזירים מידי (היפוגליקמיה). אם רמת הסוכר גבוהה או גבוהה מידי (היפוגליקמיה).

הבדר בתרופה בדם נזיר מידי (היפוגליקמיה) (ראה סעיף 3).

הבדר בתרופה בדם נזיר מידי (היפוגליקמיה).

לבדר בתרופה בדם נזיר מידי (היפוגליקמיה).

