



עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

CFC מנטולין משאף ללא

כל מנתה מדוזה מכילה:

סאלבוטאמול (כסולפאט) 100 מ"ג/מנתה
נטולין משאף מכיל 200 מנתה מדוזה.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 – "מידע נוספים".
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על
התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה
לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

נטולין משאף הוא מריחיב סمفוניות בעל פעילות קצרת טווח (6-4 שעות), מהירה (תוך 5 דקות) בחסימה הפיכה של דרכי הנשימה.
הוא מתאים במיוחד להקללה ולמניעה של תסמיני מחלת האסתמה.
יש לשמש בו להקללה על תסמינים כאשר הם מופיעים וכן על מנת למנוע את הופעת
התסמינים באותו נסיבות המוכרות על ידי החולה ככאלו שימושו הרתקני אסתמה
(כגון לפניו פעילות גופנית או חשיפה בלתי נמנעת לאלרגן).
נטולין משאף מועיל במיוחד כתרופה להקללה על אסתמה קלה, ביןונית וחריפה, בתנאי
שהתלוות בו אינה מעכבת את התחלת הטיפול והשימוש השגרתי בקורטיקוסטרואידים
בשאיפה.

קבוצת תרפואטיבית:
AGONIST SLOW-RELEASE ADDERALL 2.

נטולין משאף מכיל תרופה הנקראת סאלבוטאמול. היא שייכת לקבוצת תרופות הנקראת
מרחיבי סمفוניות מהיר פעולה.
• מרחיבי סمفוניות עורירים לדרכי האויר בריאות להישאר פתוחות, דבר המקל על כניסה
ויציאה אויר.
• הם עורירים להקל על לחץ בבית החזה, צפופים ושיעול.

נטולין משאף מכיל מרכיב הנקרא $\text{HFA } 134\text{a}$. זה פחת מזיך לסביבה ממשאים ישנים
יותר. למשאים ישנים יותר עשוי להיות טעם שונה מאשר לונטולין משאף. זה לא ישנה
את האופן שבו התרופה פועלת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגish (אלרגי) לסאלבוטאמול סולפאת או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

יש להשתמש בוונטולין משאף לפי הצורך ולא באופן סדייר.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בוונטולין משאף, ספר לרופא אם:

- האסתמה שלך פעילה (לדוגמה יש לך תסמינים תכופים או התלקחות כמו קוצר נשימה שגורם لكושי בדיבור, באכילה או בשינה, שיעול, צפוזפים, לחץ בבית החזה או יכולת גופנית מוגבלת), עליך לספר על כך במידית לרופא אשר עשוי להתחיל או לעלות מינון של תרופה הניננת לשילטה באסתמה שלך כמו קוורטיקוסטרואיד בשאיפה.
- יש לך לחץ דם גבוה.
- יש לך פעילות יתר של בלוטת התannis.
- יש לך היסטוריה של בעיות לב כמו דופק לא סדייר, דופק מהיר או תעוקת חזה.
- אתה נוטל נגירות קסנתין (כמו תאופילין) או סטרואידים לטיפול באסתמה.
- אתה נוטל משתנים, המשמשים לעיתים לטיפול בחץ דם גבוה או במחלת לב.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

- אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או הרוקח. יש לידע במียוח את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
- תרופות לדופק לא סדייר או מהיר (במיוחד מקבוצת חוסמי בטא כגון פרופרנולול).
 - תרופות אחרות לאסתמה שלך.

שימוש בתרופה ומazon

ניתן להשתמש בוונטולין משאף בכל שעת היממה, עם או בלי אוכל.

הירין והנקה

אם אתה בהירין או מניקה, חשוב שיתacen שתא בהירין או אם את מתכנת להרות, הטייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שוונטולין משאף ישפייע על יכולת הנהוג או להשתמש בכליים או במכונות כלשהם.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח

אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

מבוגרים ומתבגרים מגיל 12 ומעלה

- להקלת אסתמה - שאיפה אחת או שתי שאיפות.
- למניעת אסתמה - שתי שאיפות 10-15 דקות לפני פעילות גופנית או חסיפה לאלרגנים.
- לטיפול רגיל - שתי שאיפות עד 4 פעמים ביום.
- המינון המקסימלי הוא 8 שאיפות בפרק זמן של 24 שעות.

ילדים מתחת לגיל 12

- להקלת אסתמה - שאיפה אחת. ניתן להעלות את המינון עד שתי שאיפות אם נדרש.
- למניעת אסתמה - שאיפה אחת 10-15 דקות לפני פעילות גופנית או חסיפה לאלרגנים. ניתן להעלות את המינון עד שתי שאיפות אם נדרש.
- לטיפול רגיל - שתי שאיפות עד 4 פעמים ביום.
- המינון המקסימלי הוא 8 שאיפות בפרק זמן של 24 שעות.
- ייתכן שתמצא שמתאים (ספירר), עם או בלי מסכת פנים, מועיל אם אתה צריך לחתך ונטולן משאף לתינוק או ליד מתחת לגיל 5. פנה לרופא אם אתה חושב שתזדקק לאחד מהם.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עקבות אחרי הוראות השימוש המופיעות בסוף העalon.

אם נטלה בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלה מינון גבוה יותר ממה שהיה צריך, שוחח עם הרופא בהקדם האפשרי.

התופעות הבאות עלולות להתרחש:

- הלב שלך יפעם מהר יותר מהרגיל
- אתה תרגיש רעד
- פעילות יתר (היפראקטיביות)

תופעות אלה חולפות בדרך כלל בתוך שעות ספורות.

אם שאפת מנת יתר או אם בטעות שאףILD מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, קח אותה ברגע שאתה נזכר. אולם, אם הגיע הזמן למננה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אל טיפול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמקד בטיפול כפי שהוא מוצב על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנץ נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנץ זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ רפואי או ברוקת.

אם נשימתך או הצפופים מחמירים מיד לאחר נטילת תרופה זו, הפסיק להשתמש בה מיד, וספר לרופא בהקדם האפשרי.

כמו בכל תרופה, השימוש בוונטולין משאף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מעף אחת מהן.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע עם תרופה זו:

תגובהות אלרגיות (אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים)

אם יש לך תגובה אלרגית, הפסיק להשתמש בוונטולין משאף ונפה לרופא מיד. סימנים של תגובה אלרגית כוללים: התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון אשר עלולה לגרום لكשיי בליעה או קשיי נשימה, פריחה מגגדת, תחושת עילפון וסחרחות והתקמטות.

פנה לרופא בהקדם האפשרי אם:

- אתה מרגיש שלבר פועם מהר יותר או חזק יותר מהרגיל (דפיקות לב). תופעה זו בדרך כלל אינה מזיקה, ולרוב חולפת לאחר שהשתמשה בתרופה במשך זמן מה.
- ייתכן שתרגיש שהדופק שלך לא סדיר או שהוא פועם פעימה נוספת.
- תופעות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים.

אם אחת מתופעות אלה מופיעה אצלך, פנה לרופא בהקדם האפשרי. **אל תפסיק להשתמש בתרופה זו אלא אם נאמר לך לעשות כן.**

ספר לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות, אשר עלולות גם הן להופיע במהלך השימוש בתרופה זו:

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- תחושת רעד.
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- גירוי בפה ובגרון.
- התכווצויות שריריים.

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- רמה נמוכה של אשלגן בדם.
- זרימת דם מוגברת לגפיים (התרכבות פריפריאלית).

תופעות לוואי נדירות מאד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- שינויים בדפוסי השינה ושינויים בהתנהגות, כמו חוסר מנוחה והתרגשות יתר.

תופעות הלוואי הבאות עלולות גם להופיע אך שכיחותן אינה ידועה:

- כאב בבית החזה בגלל בעיות לב כמו תעוקת חזה (אנגינה). ספר לרופא או לרוקח אם זה מתרחש. אל תפסיק להשתמש בתרופה זו אלא אם נאמר לך לעשות זאת.

אם אתה חושב שתרופה זו אינה פועלת מספיק טוב עבורך
אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת כראוי, פנה לרופא בהקדם האפשרי. ייתכן כי בעיית הנשימה שלך חמירה ויתacen שאתה צריך תרופה אחרת. אל טיפול מנותן נוספת
של ונטולין משאף אלא אם הרופא הורה לך על כך.

אם הופיעה תופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת
לוואי שלא צוינה לעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה
ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחה
ראיתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה
מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-30°C. הגן מכפוף ומחזיפה ישירה לאור שימוש.
- אם המשאף מתקרר מאוד, הוציא את מכל המתכת מתחום מעטפת הפלסטיק וחם אותו
בידך למשך מספר דקות לפני השימוש. אל תשתמש באמצעי אחר כדי לחם אותו.
- מכל המתכת הינו מכל לחץ. אין לחשוף אותו לטמפרטורות הגבוהות מ-50°C. אין לנקב,
לשבר או לשרוף את המשאף גם אם הוא ריק.
- אין להשליך תרופות לביבוב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות
שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם: HFA 134a.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ונטולין משאף כולל מכל אלומיניום סגור בשסתום מדידה, מעטפת פלסטיק ומכסה פיה.
כל מכל מכיל 200 מנות מדודות של סאלבוטאמול (כסולפאט) 100 מיקרוגרם.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בלז 25, פתח תקווה.
- יצרן: גלקסו וולקאם S.A., בורגס, ספרד.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 113-25-29560.

- לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה גוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש:

- ונטולין משאף מייצר רסס עדין אותו אתה שואף דרך הפה לריאות. הרופא, האחות או הרוקח יראו לך כיצד להשתמש במשאף. אם איןך בטוח שאל את הרופא, האחות או הרוקח.
- כל מכל של משאף מספק 200 מנות לשאייה.

אל תשתמש במשאף לעיתים קרובות יותר ממה שהנזהה אותך הרופא. ספר לרופא בהקדם האפשרי אם נראה לך שהתרופה איננה פועלת עלייך כרגע (לדוגמא אם אתה זקוק למינון גבוה יותר של התרופה כדי להקל על בעיות הנשימה שלך או שהשימוש במשאף שלך לא יוצר הקלה הנמתחת לפחות 3 שעות) כיון שייתכן כי בעית הנשימה מהמירה ואולי תצטרכך תרופה אחרת.


אם אתה משתמש בוונטולין משאף יותר מפעם אחת בשבוע לטיפול בתסמיני האסתמה שלך, לא כולל שימוש מניעתי לפני פעילות גופנית, זה מצביע על אסתמה שאינה נשלטת היטב זהה עלול לגרום את הסיכון להתקפות חמורות של אסתמה (החמרה של האסתמה) שייתכן יהיה להם סיבוכים חמורים שכולים להיות מסכני חיים או אפילו קטלניים. عليك לפנות לרופא בהקדם האפשרי כדי לבחון את הטיפול שלך באסתמה.

אם אתה משתמש בתרופה אנטידלקטיבית לריאות באופן يوم-יומי לדוגמא "קורטיקוסטרואיד בשאייה", חשוב להמשיך להשתמש בה באופן סדיר, אפילו אם אתה מרגיש יותר טוב.

ייתכן שהרופא אמר לך להשתמש במינון גבוה מהמקובל לטיפול חירום אם הנשימה או הצפוזפים שלך מחמירים מאוד. חשוב מאד שתיכזם להוראות הרופא לגבי כמה שאיופות לκחת ובאיזה תדירות להשתמש במשאף.

בדיקות המשאף

1. בשימוש במשאף בפעם הראשונה, בדוק שהוא עובד. הסר את מכסה הפה על ידי לחיצה עדינה בצדדי המכסה עם האגודל והאצבע שלך ומשיכתו החוצה.



2. כדי לוודא שהמשאף עובד, נער אותו היטב, כוון את הפה הרחק ממרק ולחץ על המכל לשחרור שתי לחיצות לאוויר. אם לא השתמש במשאף במשך 5 ימים או יותר, נער אותו היטב ושחרר שתי לחיצות של התרופה לאוויר.

השימוש במשאף

חשוב להתחיל לנשום לאט ככל האפשר מיד לפני השימוש במשאף.
1. עמוד או שב זקורף בעת השימוש במשאף.

2. הסר את מכסה הפה (כפי שנראה בתמונה הראשונה). בדוק בתוך ומוחוץ לפיה כדי לוודא שהיא נקייה וחופשית מעצמים זרים.

3. נער את המשאף 4 או 5 פעמים כדי להבטיח שככל העצמים הזרים המשוחזרים הוסרו ושתוכנות המשאף התערבבה בצורה שווה.



4. החזק את המשאף בצורה אנכית כשהאגודל שלך בבסיס, מתחת לפיה. נשוף החוצה כמידת יכולתך. אל תשאף פנימה עדין.



5. מקם את הפה בפה בין השיניים. סגור את שפתיים מסביב לפיה. אל תנשור.



6. שאף דרך הפה. מיד לאחר שהתחלפת לשאוף פנימה, לחץ כלפי מטה על החלק העליון של המכל לשחרור מנה מהתרופה. עשה זאת תוך כדי שאיפה عمוקה ויציבה פנימה.



7. החזק את נשימתך, הוציא את המשאף מהפה ואת האצבע מחלקו העליון של המכל. המשך להחזיק את נשימתך לכמה שניות, או ככל יכולתך.



8. אם הרופא אמר לך ללקחת שתי שאיפות, חכה חצי דקה לפני שתיקח שאיפה נוספת וחזור על שלבים 3-7.

9. יש להחזיר תמיד את מכסה הפה למקוםו מיד לאחר השימוש כדי למנוע כניסה אבק. החזר את המכסה למקוםו על ידי לחיצה חזקה עד להישמע הקליק.

התאמן לפני מראה בפעמים הראשונות. אם אתה רואה 'רסס' יוצא מחלקו העליון של המשאף או מצידי הפה אתה צריך להתחילה שוב.

ייתכן שילדים קטנים יזדקקו לעזרת הוריהם בהפעלת המשאף. עודד את הילד לנשוף החוצה והפעיל את המשאף מיד לאחר שהילד התחיל התחליל התחליל. תרגלו את השיטה יחד. ייתכן שתמצא שמתאים (ספירים), עם או בלי מסכת פנים, מועיל אם אתה צריך לחתה ונוטולין משאף לתינוק או לילד מתחת לגיל 5. פנה לרופא אם אתה חושב שתזדקק לאחד מהם.

ילדים בוגרים או אנשים עם חולשה בידיהם יכולים למצוא שקל יותר להחזיר את המשאף בשתי הידיים. שים את שתי האצבעות על חלקו העליון של המכל ואת שני האגודלים מתחת לפיה. אם זה לא עוזר, הרופא, הרוקח או האחות יכולים לסייע לך.

ניקוי המשאף

בכדי למנוע מהמשאף להיחסם, חשוב לנוקות אותו לפחות פעמיים בשבוע.

כדי לנוקות את המשאף:

- הסר את מכל המתכת מתוך מעטפת הפלסטייק של המשאף והסר את מכסה הפיה.
- שטוף ביסודות את מעטפת הפלסטייק תחת זרם מים חמים.
- ייבש את מעטפת הפלסטייק ביסודות מבנים ומחוץ.
- החזר את מכל המתכת לתוך מעטפת הפלסטייק ושים את מכסה הפיה.
- אל תשים את מכל המתכת בתוך המים.

נערך בפברואר 2024.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינותו של קבוצת החברות של GSK.

© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Ven Inh PT v8