

**(6) רשימת תיוג עבור הרופא לצורך התחלת הטיפול
ברבלימיד/תלידומיד סלג'ן/אימנוביד
בגבר**

שם התרופה: רבלימיד
 תלידומיד סלג'ן
 אימנוביד

שם המטופל: _____

תאריך לידה: _____

סמן ✓ או לא ידוע	ייעוץ
	נמסר מידע לגבי הצורך בשימוש בקונדום במהלך הטיפול, כולל אלה שעברו כריתת צינור הזרע, במהלך הפסקות בין מנות ובמשך 4 שבועות לאחר הפסקת הטיפול אם בת הזוג פורייה.
	נמסר מידע כי במקרה שהמטופל אינו יכול להשתמש בקונדום בשל רגישות, על בת הזוג להשתמש באמצעי מניעה אחד לפחות, החל מ- 4 שבועות לפני תחילת הטיפול או לחילופין 4 שבועות טרם המגע המיני הראשון במקרה שהמטופל היה על טיפול בנוסף, על בת הזוג להשתמש באמצעי מניעה במהלך הפסקות בטיפול, במהלך הטיפול כולו ובמשך 4 שבועות לאחר סיום הטיפול.
	נמסר למטופל מידע לגבי האיסור על שיתוף תרופות.
	נמסר מידע לגבי החזרת התרופה שלא נצרכה לרוקח / משרד הרופא.
	נמסר מידע לגבי האיסור לתרום דם או זרע בעת נטילת התרופה ובמשך 4 שבועות לאחר הפסקת נטילת רבלימיד / תלידומיד סלג'ן / אימנוביד .