



עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

השימוש בגילאים 4-18 שנים הינו על פי מרשם רפואי בלבד

מעל גיל 18 שנים - התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

פליקסונז טרסיס לאפ

פלוטיקזון פרופיונאט w/w 0.05%
כל מנה מדודה מכילה 50 מ"ג של פלוטיקזון פרופיונאט.

רשימת החומרם הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר - ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

עליך לשתחש בתרופה על פי ההוראות המופיעות בעalon זה. היועץ ברוקח אם הינך זוקם למידע נוספת. עליך לפנות לרופא אם תסמנני המחלת (סימפטומים) חמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיעדת התרופה?

לא הוראת רפואי:

מניעה וטיפול בנזלת אלרגית עונתית כולל קדחת השחת במבוגרים.

על פי הוראת רפואי:

מניעה וטיפול בנזלת אלרגית עונתית כולל קדחת השחת בילדים מגיל 4 שנים ומעלה ונזלת רב שנתית במבוגרים וילדים מגיל 4 שנים ומעלה.

קבוצה תרפואיית: קוורטיקוסטרואידים.

החוואר הפעיל הוא פלוטיקזון פרופיונאט, קוורטיקוסטרואיד בעל פעילות אנטि-דלקתית אשר בשימוש יומיומי, פועל באופן דומה לכימיקלים הטבעיים של הגוף על מנת לשלוט בדלקת. טרסיס זה עוזר לשולט בתגובה הגוף לאלרגנים בסביבה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתחש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בסעיף 6).
- אתה מתחת לגיל 4 שנים.

ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

לפני השימוש בפליקסונז טרסיס לאפ ספר לרופא אם:

- יש לך זיהום באף או בסינוסים, אם יש לך חום גבוה, או אם לאחרונה עברת ניתוח, נפצעת או הופיעו כיבים באף.

- לא חל שיפור בתסמיינים, או אם התסמיינים אינם תחת שליטה, לאחר 7 ימים, היועץ ברופא או ברוקח שלך.
- צור קשר עם הרופא אם אתה חווה ראייה מוטשטשת או הפרעות ראייה אחרות, אשר יכולות להיות כתוצאה ממצבים כגון קטרקט או גלאוקומה.
- אין להשתמש בתרסיס מעל 3 חודשים ברציפות אלא אם כן הרופא מורה לך.
- הרופא הנכח אורך לקחת מינונים גבוהים של פליקסונז תרסיס לאף, ויתכנו מצבים בהם הרופא ינחה אותך להוסף טיפול בתרופות נוספות משפחתי הסטרואידים.

ילדים ומתבגרים

התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל 4 שנים.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקה, או אם לך חותם לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או ברוקח. במיעוד אם אתה לוקה:

- **טרופות קוֹרְטִיקוֹסְטוֹרוֹאַיּוֹדִיּוֹת** (כולל קרמיים לאקזמה, משאפים לאסתמה, טబליות, זריקות, תרסיסים לאף, וטיפות עיניים או טיפול אף)
- **רִיטּוֹנוֹאָבֵיר או קוֹבִּיסְטַטָּט** (תרופות לטיפול ב-**VIH**)
- **קְטוּקוֹנוֹאָזּוֹל (לטיפול ב-**צִיזּוֹמִים פְּטִירִיִּתִים**).**

ישנן תרופות אשר עלולות להגבר את ההשפעה של פליקסונז תרסיס לאף וייתכן כי הרופא שלך ירצה לבצע אחר מכך אם אתה נוטל תרופות אלו (כולל מספר תרופות המשמשות לטיפול ב-**VIH**: ריטונאביר, קוֹבִּיסְטַטָּט).

שימוש בתרופה ומזון

ניתן להשתמש בפלליקסונז תרסיס לאף בכל שעה ביום, עם או ללא אוכל.

הירין והנקה

אם הינך בהירין, מתכוונת להיכנס להירין או מניקה, היועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכוניות

לא סביר שלפלליקסונז תרסיס לאף תהיה השפעה על יכולת הנהיגה שלך או הפעלת המכוניות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פלליקסונז תרסיס לאף מכיל 0.02 מ"ג **בנזילקוניום קלורייד** בכל יחידת mana. בנזילקוניום קלורייד עשוי לגרום לביעות נשימה (ברונכוספאזם - עווית סימפונות). בנזילקוניום קלורייד עשוי גם לגרום לגירוי או נפיחות בתוך האף, במיוחד אם השימוש הוא לטוח ארך.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

מניעה וטיפול בנזלת אלרגית עונתית כולל קדחת השחת לילדים מגיל 4 שנים ומעלה ונזלת רב שנתית מבוגרים וילדים מגיל 4 שנים ומעלה הינם על פי מרשם רופא בלבד.

עליך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם איןך בטוח לגבי למינון ואופן הטיפול בתרופה. יש לנער **היטב תמיד לפני השימוש**. לשימוש באף בלבד. אין **לבלווע**. פליקסונז תרסיס לאף פועל במהלך הפחתת הדלקת והනפיחות באף, למרות שייתכן כי ידרשו 3 או 4 ימים להשגת הפעולות המוגנה המרבית שלו. כדי למנוע את התחלת

התסминים, התחל את השימוש בפליקסונז תרסיס לאף לפני חסיפה לאחד הארגנים השכיחים שלו. השתדל להשתמש בתרסיס בשעות הבוקר.

- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 4 שנים.
- לשימוש באף בלבד, יש להימנע מגע עם העיניים.
- ידרשו מספר ימים להתחלה פעילות התרופה. لكن המשך להשתמש בה, גם אם לא תרגיש הטבה מיידי.
- השתמש בספררי באופן יום-יומי.

המיןון המקורי בדרכּ כלל למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 הוא: שתי לחיצות לכל נחיר פעם ביום, עדיף בבוקר.

עם השימוש בתסминים, תוכל להפחית את המיןון **לחיצה אחת לכל נחיר פעם ביום**. אם התסминים חמורים במיוחד, ייתכן שתצטרכּ **לrosso** שתי לחיצות לכל נחיר פעמיים ביום עד שהתשמינים ישתפרו.

- אין להשתמש ביותר מ-8 לחיצות (4 פעמיים לכל נחיר), 400 מק"ג, ביום.
- השתמש במיןון הנמור ביותר האפשרי כדי לשלוט בתסминים שלו.
- אם התסמינים שלו לא משתפרים או שאינם בשליטה היטב אחרי 7 ימים, היועץ ברופא או ברוקח שלו.

המיןון המקורי בדרכּ כלל לילדים בני 4 עד 11 שנים הוא:

- המיןון ההתחלי הרגיל הוא לחיצה אחת לכל נחיר פעם ביום, עדיף בבוקר.
 - המיןון המקורי הוא 4 לחיצות (2 לחיצות לכל נחיר) ביום.
- פליקסונז תרסיס לאף אינו מועד לשימוש למשך תקופה של יותר מחודש אחד ילדים.
אין לעבר על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מיןון גבוה יותר
דווח לרופא שלו.

חשוב לחתת את המנה שלו בהתאם להמלצת הרופא או משטר המיןון המומלץ. שימור במנת תרופה קטנה יותר או גדולה יותר עלול להחמיר את התסминים שלו.


אם שכחת ליטול את התרופה
אין ליטול מנה כפולה, כי את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה שנרשמה לך על ידי הרופא
אם התרופה נרשמה לך על ידי הרופא, אל תפסיק את הטיפול גם אם אתה מרגיש טוב יותר, אלא אם כן הרופא הורה לך להפסיק. אם תפסיק את הטיפול, התסминים עלולים לחזור.

לפני השימוש בבקבוקן חדש של פליקסונז תרסיס לאף:


- לפליקסונז תרסיס לאף יש מכסה שמגן על הפיה ושומר על ניקיונה. זכור להסיר את המכסה לפני השימוש בתרסיס (תמונה 1).
- לפני תחילת השימוש בבקבוקן חדש של פליקסונז תרסיס לאף, או אם לא השתמש בתרסיס מספר ימים, לחץ על המשאבה מטה מספר פעמים עד שתתකבל התזה עדינה.
- החזק את הבקבוקן ישר, כמתואר בתמונה, כשהאצבע והאמה תומכות שני צדי הפיה והאגודל מתחת לבקבוקן.
- מבלי להזיז את האgodל, לחץ כלפי מטה באמצעות אצבעותיך בכדי לשאוב את התרסיס (תמונה 2).
- בעת הלחיצה, ודא שאין מפנה את פיות התרסיס אליך או אל אדם אחר.

- אם התרסיס עדיין איןנו פועל, נסה לנוקתו כמתואר בסעיף 'ניקוי התרסיס'. אין להשתמש בסיכה או בחפץ חד בניסיון לפתוח חסימה או להרחיב את החור שבפיית התרסיס, מכיוון שפעולתה זו תחרוס את מגנון ההתקזה.



השימוש בפליקסונג תרסיס לאף:


1. נער היבט את הבקבוקון והסר את המכסה.
2. קנח את אפר בעדינות.
3. סגור נחיר אחד, כמתואר בתמונה, והכנס את הפיה לנחיר השני. הטה את הראש מעט קדימה ושמור את הבקבוקון זקופה. החזק את הבקבוקון כמתואר (תמונה 3).
4. החל לשאוף אוויר פנימה לאט, דרך אפר. בזמן שאתה שואף אוויר, התז מהתרסיס התזה עדינה לתוך הנחיר על ידי לחיצת אצבעותיך על צוואר הפיה כלפי מטה בחזקה (תמונה 4).
5. נשופ אוויר החוצה דרך הפיה. חזר על שלב 4 כדי להתיז התזה שנייה לאותו נחיר.
6. הוציא את הפיה מנחיר זה ונשופ אוויר החוצה דרך הפיה (תמונה 5).
7. חזר על שלבים 3 עד 6 לנחיר השני.
8. לאחר השימוש בתרסיס, נגב את הפיה בזיהירות באמצעות טישו או ממחטה נקיים וסגור את התרסיס במכסה.



ניקוי התרסיס:

- נקה את התרסיס שלך לפחות פעם אחת בשבוע או לעיתים קרובות יותר אם הוא נחסם.
1. הסר את המכסה ואת הפיה (תמונה 6).
 2. השרה את הפיה ואת המכסה במים חמימים במספר דקות ואז שטוף במים ברז זורמים.
 3. נער את עודפי המים והנה לייבוש במקום חמימים – לא חם מדי!
 4. הרכב שוב את הפיה.

5. במקרה הצורך, לחץ על המשאבה מספר פעמים עד שתתකבל התזה עדינה.



- אין ליתול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך גוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הינך זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. **תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בפליקסונה תרסיס לאף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

תופעות לוואי נדירות מאד (תופעות שמופיעות לפחות מ-1 מכל 10,000 משתמשים)
הפסיק **לקחת את התרופה ופנה מיד לקבالت טיפול רפואי**.
כמויות קטנה של אנשים חווים תגבות אלרגיות לפלייקסונה תרסיס לאף. תגבות אלה, אם לא מטופלות, עלולות להתרחב לבעה חמורה יותר ואף מסכנת חיים.
תגבות אלרגיות. תגבות אלה יכולות לכלול הופעת פריחה או אדמומיות בעור, נפיחות בפה, בלשון או בפנים, חולשה פתואמית או סחרחות (שעלולה להביא לעילפון או איבוד הכרה), שיעול, צפצופים או קשי נשימה.

מיד לאחר השימוש בתרסיס

- אתה עלול להתעטש מעט, אך זה ייפסק מהר.
- לעיתים רחוקות אתה עלול לחוש ריח או טעם לא נעימים.

הפסיק לקחת את התרופה ודוחה לרופא אם אתה חווה:

- בעיות בעיניים כגון כאב או ראייה מטרוששת.
- בעיות באף כגון כאב או דימום מתמשך.

דווח לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה חווה את תופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאד (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
• דימומים מהאף.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 ממשתמשים מתוך 100):
• כאב ראש.

- ריח או טעם לא נעימים.
- יובש או גירוי באף או בגרון.

תופעות לוואי נדירות מאד (תופעות שמופיעות לפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- תגבות עוריות – החל מאדמומיות, פריחה וגרד וכלה בתגבות עוריות חמורות יותר כדוגמת עור יבש, סדק וمتקלף.
- בעיות בעיניים כגון כאב או ראייה מטרוששת.

- פגיעה באף.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- ראייה מטושטשת.
- פצעים באף.

תופעות לוואי נוספות שדווחו:

- התעטשות לאחר השימוש בתרסיס, אך זו חולפת במהרה.

לעתים רחוקות מאוד, הייצור התקין של סטרואידים בגוף עלול להיות מושפע. סביר יותר שהוא יקרה אם אתה משתמש במינונים גבוהים במשך זמן רב. הרופא שלך יעזור לך שולט בתסמינים הללו.

אצל ילדים תופעת לוואי זו עלולה לגרום, לעיתים רחוקות, להאטת גדילה. ילדים המטופלים בפליקסוניז טרסיס לפחות תקופה ארוכה, הרופא ינטר את הגובה באופן קבוע.

חשוב להזכיר על הוראות המינון שצוטנו בסעיף 3. שימוש בפליקסוניז טרסיס לפחות מ-3 חודשים ברציפות יכול לגרום למספר שינויים בגוף, כגון גROWTH STRETCHING (הגדלת גובה הגוף) או גROWTH RETARDATION (האטת גידול הגוף). מוגברת הזיהומיות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיזוק על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיזוק על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיזוק על תופעות לוואי, או על ידי כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 30°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם – Dextrose (anhydrous), microcrystalline cellulose and sodium carboxymethylcellulose (Avicel RC591), phenylethyl alcohol, benzalkonium chloride, polysorbate 80, purified water and dilute hydrochloric acid.
- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה - פלייקסונייז טרסיס לפחות מסופק בבקבוקן זכוכית עם משאבה מתאימה המכיל 120 מיליליטרים.
- בעל הרישום: גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בלז 25, פתח תקווה.
- שם הייצור וכותבתו: גלקסו וולקאם S.A., בורגס, ספרד.

- נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 060-33-26912
- לשם הפשטה ולהקלת הקירה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינט בעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.
© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Fli ANS PT v7C