

ساناكتيك 3% جل

يحتوي الجل على ديكلوفيناك صوديوم (Diclofenac Sodium).

3% بتركيز.

يحتوي 1 غرام من ساناكتيك على 30 ملغم ديكلوفيناك (Diclofenac Sodium).

صوديوم (Diclofenac Sodium).

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في الدواء: أنظر

في الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

والفقرة 6 "معلومات إضافية" في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك

الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن

الدواء. إذا توفرت لديك أي أسئلة إضافية، راجع الطبيب

أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو

قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة

للحالات.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ساناكتيك مُخصص لعلاج التقران السفعي الموضعي

في الجلد (actinic keratosis).

الفصيلة العلاجية: مضادات الإلتهاب الاستيروئيدية.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كت حساساً (أليسريجي) لل المادة الفعالة ديكلوفيناك صوديوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

- قاسيت في الماضي من رد فعل تحسسي مثل طفح في الجلد (شري)، صعوبات في التنفس (صفير) أو رشح تحسسي نتيجة لتناول أسيپرلين أو كل دواء آخر من نوع مضادات الإلتهاب الاستيروئيدية.
- كت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

لا يمكن نفي إمكانية حدوث أمراض جانبية جهازية إذا كنت تستعمل ساناكتيك على مناطق كبيرة من الجلد ولفترات زمنية مطولة.

قبل العلاج بـ ساناكتيك، إحك للطبيب إذا:
• وجد لديك أو كان لديك في الماضي قرحة معدية أو نزف من المعدة.

• وُجدت لديك مشاكل في القلب، الكبد أو الكلية.
• وُجدت لديك مشكلة نزف من أي نوع كان أو أنه تصيب بكميات بسهولة.

• عليك تجنب التعرض للشمس، بما في ذلك مراكز التسغيف، خلال العلاج بـ ساناكتيك. في حال ظهور ردود فعل في الجلد، يجب التوقف عن إستعمال الدواء.

• لا يجوز الدهن على جروح، تلوث أو إلتهاب (dermatitis) في الجلد.

• يجب منع ملامسة ساناكتيك بالعينين، الجزء الداخلي من الأنف والفم.

• بعد إستعمال المستحضرات التي تحتوي على ديكلوفيناك على الجلد يمكنك إستعمال ضمادة تفافة (غير سادة). لا يجوز تضييد المكان بشكل مُحكم ومطيق.

الأطفال والمراهقون

ساناكتيك غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال.

التداخالت/ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو ربما قد حملت، عليك إستشارة الطبيب. بالإمكان إستعمال ساناكتيك بحذر خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل، لكن لا يجوز إستعمال ساناكتيك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

يوجد لهذا الدواء عرض جانبى محتمل من إصابة كلوية لدى الجنين وقلة السائل الالمينوسى بدءاً من الأسبوع الـ 20 للحمل. يوصى بالإمتناع عن إستعمال مستحضرات من فصيلة الـ NSAIDs بدءاً من الأسبوع الـ 20 للحمل وإستشارة فرد من الطاقم الطبى بحسب الحاجة. إذا كنت مرضعة، عليك إستشارة الطبيب. بالإمكان إستعمال ساناكتيك بحذر في فترة الإرضاع لكن لا يجوز إستعمال الدواء على الثديين.

إذا كنت حاملاً، تحاولين أن تحلمي أو كنت مرضعة، ووصف لك طبيب علاجاً بـ ساناكتيك، منمنع لك إستعمال هذا الدواء على منطقة من الجلد تزيد مساحتها عن ثلث مساحة جلد جسمك ولا يجوز الإستعمال لأكثر من ثلاثة أسابيع.

السيادة واستعمال الماكنتات

لا يوجد تأثير للدهن الموضعي على الجلد من ديكلوفيناك على القدرة على السيادة أو إستعمال الماكنتات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوى على كحول بنزيلي، الذي قد يسبب رد فعل تحسسي أو تهيج موضعي طفيف.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل طبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

• بالإضافة إلى إستعمال ساناكتيك مرتين في اليوم، إلا إذا أمرك الطبيب خلاف ذلك.

• قبل الإستعمال، قم بتقب غطاء الألومينيوم الموجود في فتحة الأنبوبة بواسطة السادة.

• أخرج بلهف كمية صغيرة من الجل على الجلد في المنطقة المعالجة. تغير الكمية المطلوبة من الجل وفقاً لحجم المنطقة المعالجة. عادة، كمية ذات 0.5 غرام جل (تقريباً بحجم حبة البازلاء) تكفي لمنطقة واحدة بمساحة 5 سم × 5 سم. لا يجوز إستعمال أكثر من 8 غرام ليوم.

من الجائز أن تشعر بشعور بارد في المنطقة عندما تدهن الجل على جلدك.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

• فترة العلاج الموصى بها هي 60-90 يوماً. لوحظ التحسن الأقصى في فترات علاج تقارب الـ 90 يوماً. من الجائز لأن يحدث شفاء تام حتى شهر بعد إيقاف العلاج.

• يجب غسل اليدين بعد دهن الجل، إلا إذا كانت اليدين هي المنطقة المعالجة.

طريقة الإستعمال
للاستعمال الخارجي فقط.
لا يجوز بل الجل.

إذا استعملت بالخطأ كمية أكبر من المطلوب من ساناكتيك، قم بازالة فاپنچ الجل بواسطة الغسل بالماء.
إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت دهن ساناكتيك في الوقت المخصص، إستمر في الدهن كالمعتاد وفقاً لتعليمات الطبيب.
لا يجوز دهن مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسى.
إذا كنت تحظى للتوقف عن إستعمال الدواء، يجب مناقشة التداعيات مع الطبيب قبل التوقف.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. وضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ساناكتيك قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.
يجب إيقاف العلاج بـ ساناكتيك والتوجه إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية التالية:
طفح في الجلد (شرى)، صعوبات في التنفس (صفير)، إنفاس الوجه، رشح تحسسي. قد تشير هذه الأعراض لوجود حساسية لـ ساناكتيك.
في حال ظهرت إحدى الأعراض الجانبية الشائعة التالية بشكل شديد أو إذا إستمرت أكثر من عدة أيام، يجب التوقف عن إستعمال ساناكتيك والتوجه إلى الطبيب: حكة، طفح، إحمرار في الجلد، التهاب، التهاب الجلد نتيجة اللمس، ألم وحوصلات.

أعراض جانبية إضافية شائعة (common) تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:
تهيج أو وخذ في المنطقة المعالجة، التهاب الملتحمة، حساسية، شعور بالألم عند لمس الجلد، شعور بدباربيس وإبر في الجلد، تصلب العضلات، التهاب في الجلد، إكزيما، جلد جاف، إنفاس، طفح (يشمل قشرة أو حوصلات)، تقرح الجلد، قرحة في الجلد.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:
ألم في العين، جفاف/تدمع العينين، ألم في البطن، إسهال، غثيان، تساقط شعر، إنفاس في الوجه، نزف مفرط أو جلد دهني، طفح يشبّه الحصبة.

أعراض جانبية نادرة (rare) تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:
التهاب في الجلد مع حوصلات كبيرة.
أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:
نزف بطيء، مشاكل في الكلى، صعوبات في التنفس (ربو)، نزف بطيء، مشاكل في الكلى، صعوبات في التنفس (ربو).

طفح تلوثي في الجلد، حساسية الجلد لضوء الشمس.
تم التبليغ عن تغير مؤقت في لون الشعر في منطقة الدهن. على الأغلب يعود الوضع إلى سابق عهده عند إيقاف العلاج.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتberry عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<http://sideeffects.health.gov.il>
بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة پاداچيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

(5) كيفية تخزين الدواء؟
• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال / أو الرضيع، وذلك تفادياً إصابتهم بالتسوس.
• لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) (الذي يظهر على ظهر العلبة والأنبوبة).
• يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- يجب الحماية من الحرارة.
- لا يجوز التجميد.
- بعد الفتح لأول مرة يمكن الإستعمال لمدة 3 أشهر، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنتهاء الصلاحية.
- لا يجوز إلقاء أدوية في حاوية النفايات أو مياه المجاري (المغسلة، المرحاض). إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيداً إستعمالك. تساعد هذه الوسائل على حماية البيئة.

(6) معلومات إضافية
• يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Purified water, glycerin, polyethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monoethyl ether, hydroxyethyl cellulose, benzyl alcohol.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أنبوبية ألومنيوم التي تحتوي على 50 غرام جل شفاف - مائل إلى الأصفر تغلق بواسطة سادة لولبة بلاستيكية بيضاء. للإستعمال المتكرر.

• صاحب الإمتياز والمنتج: پاداچيس إسرائيل فارماستيكتا م.ض، شارع راكيفيت 1، شوهام.

• تم إعدادها في أيار 2023 بموجب تعليمات وزارة

الصحة.
• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
150-56-33561

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.