



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (מנשרים) התשמ"ו – 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פאקט 20, 30 טבליות

הרכב:
כל טבליה של **פאקסט 20** מכילה: פארוקסטין (כהידרוכלוריד) 20 מ"ג

כל טבליה של **פאקסט 30** מכילה: פארוקסטין (כהידרוכלוריד) 30 מ"ג

Paroxetine (as HCl) 20 mg

Paroxetine (as HCl) 30 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר אנו ראה ברקע 2 – מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה", ופרק 6 –

"מידע נוסף"

קרא בעיון בלון זה עד סופו בטום שתמשם בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח שלך.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לך אם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה נוגדת דיכאון חודרה, מעלת את הסיכון להתנהגות מחשבות אובדניות במטופלים עד גיל 25. עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים מקרוביהם לעקוב אחר שינויים בגון החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, חוקפנות וכדומה. במידה וחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מייד לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

קבוצה תרופתית: מעכב סלקטיבי של קליטה חזרת של סרוטונין (SSRI).

פעילות רפואית: לטיפול בתסמינים של דיכאון מכל הסוגים, כולל דיכאון מלווה בחרדה, ומניעת חזרת הפרעות נפשיות, טיפול בתסמינים ומניעת חזרה של הפרעה טורדנית כפייתית (OCD) (obsessive compulsive disorder ועל הפרעות חרדה עם או בלי אגורפוביה ולטיפול בתסמינים של פחד חברתי (social phobia).

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה רגיש (אלרגי) לפארוקסטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הלא פעילים ראה פרק 6 – "מידע נוסף").

• אתה לוקח תרופות ומחליטונים כלוריד (מתיל כחול) (MAOIs), לרבות מוקלומיד ומחליטונינים כלוריד (מתיל כחול) או אם לקחת אותם בכל זמן שהו בשבועיים האחרונים. הרופא ייעץ לך כיצד לעיך לחתיל לקחת **פאקסט** מרגע שתפסיק לקחת את מעכב מונואמין אוקסידאז.

• אתה לוקח תרופה אנטי-פסיכוטית הנקראת תיורידאין או תרופה אנטי-פסיכוטית הנקראת פימחיד.

• אתה אחד מאלה חל עליך, ספר לרופא מבלי לקחת פאקסט

אזהרות וחובדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפאקסט, ספר לרופא אם:

• אתה לוקח תרופות אחרות כשהו (ראה פרק 2 – "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות")

• אתה לוקח טמוקסיפן לטיפול בסרטן שד או בבעיות פוריות. **פאקסט** עלול לגרום לטמוקסיפן להיות פחות יעילה, כך שהרופא שלך עשוי להמליץ לקחת נוגד דיכאון אחר.
• יש לך בעיה בכליות, בכבד או בבלב.
• לאחר בדיקת אק"ג נמצאה חריגה ברשום FQT, מחלות לב שלך הידועה כהארכת מקטע QT.
• יש לך היסטוריה משפחתית של הארכת QT, מחלות לב כגון אי-פסיקת לב. קצב לב נמוך או רמות אשלגן נמוכות או רמות מגנזיום נמוכות.
• יש לך אפילפסיה או היסטוריה של התקפים או פרכוסים.
• היו לך אי פעם תופעות של מאניה (פעלתנות יתר הנהגותית ומחשבתית).

• אתה מקבל טיפול בחשמל (ECT).
• יש לך היסטוריה של דימומים או שאתה לוקח תרופות אחרות שעשויות להגביר את הסיכוי לדימום (אלה תרופות המשמשות לדלל את הדם, כמו וארפרין, אונטי-פסיכוטיות כמו פרפאזין או קלואאפין, נוגדי דיכאון טריציקליים, תרופות משטות לטיפול בכאב ובדלקת הנקראות תרופות נוגדות דלקת שאינן מסטורידיות [NSAIDs] כמו: חומצה אצטיל-סליצילית, איבופרופן, סקלוקסיב, אטודולק, דיקלופנק, מלוקסיקם).

תרופות כגון **פאקסט** (המכונות מעכבים סלקטיביים של ספיגה חזרת של סרוטונין, SSRIs) עלולות לגרום לתסמינים של "הפרעה בתפקוד המיני" (ראה פרק 4 – "תופעות לוואי"). בחלק מהמקרים, התסמינים הללו נמשכו לאחר הפסקת הטיפול.
אינטראקציות/הגובות בין תרופות
תרופות מסוימות יכולות להשפיע על אופן הפעולה של **פאקסט**, או להגביר את הסבירות שיהיו לו תופעות לוואי. **פאקסט** עלול גם להשפיע על האופן שבו תרופות מסוימות פועלות.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
• תרופות הדיכאון או מניקה, חושבת שיתכן ואת בהיריון או מחנכת הלתות, התינוק עם הרופא על הרופא לעד השימוש בתרופה זו.
• בתרופות שאינתיאמית לקוח **פאקסט** במהלך החודשים הראשונים להיריון, היו מספר דיווחים שהראו סיכון מוגבר למומים מולדים, כפרט כאלה הפוגעים בלב.

באוקלוסייה הכללית, כ-1 מכל 100 תינוקות נולד עם מום בלב. באימות שלקחו **פאקסט** זה עלה ל-2 מכל 100 תינוקות. ייתכן שאת והרופא שלך תחליט שיהיה טוב יותר עבורך להחליף לטיפול אחר או להפסיק לקחת בהדרגה **פאקסט** בזמן שאת בהיריון. אולם בהתאם לנסיבות שלך, ייתכן והרופא יציע שיהיה טוב יותר עבורך להמשיך לקחת **פאקסט**.

דאי שהרופא שלך יודע שאת לוקחת פאקסט. אם את נוטלת **פאקסט** בסמוך לסוף ההיריון שלך, ייתכן סיכון מוגבר לדימום נרתיקי כבד זמן קצר לאחר הלידה, במיוחד אם יש לך היסטוריה של הפרעות דימום. הרופא שלך או המיילדת צריכים להיות מודעים לכך שאת נוטלת **פאקסט** כדי שיוכלו ליישך לך. כאשר תרופות כמו **פאקסט** נלקחות במהלך ההריון, במיוחד בשלבים המתקדמים של ההריון, יתר עלולות להעלות את הסיכון למצב רפואי חמור בלידה. הנקרא יתר לחץ דם ריאתי מתמשך של היילוד (PPHN), ב-PPHN לחץ הדם בכלי הדם בין הלב של התינוק והריאות גבוה מדי. אם את לוקחת תרופות גם במהלך 3 חודשי ההריון האחרונים, לייילוד שלך עלולים להיות גם מצבים רפואיים אחרים, שמתחילים לרוב במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה. התסמינים כוללים:

אנשים מבוגרים ומחנכים מתחת לגיל 18
אין להשתמש ב**פאקסט** בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18. **פאקסט** אינו מיועד ואין להשתמש בו לטיפול בילדים ובמתבגרים, מאחר ומקרים קליניים מצאו קשר בין **פאקסט** ועלייה בסיכון להתנהגות אובדנית ועיונית.

השימוש ב**פאקסט** או הנבדק בילדים מתחת לגיל 7 שנים.
אם אתה מדוכא ואו יש לך הפרעה בדיכאון או בהפרעת החרדה שלך (SSRI).
אופיואידים. תרופות הנקראות טריפטנים, כמו סומאטריפטן, המשמשות לטיפול בכאב ובדלקת.
טרמדול, בפרנורפין ופטידין, **מיסכני כאבים.**

נוגדי דיכאון אחרים לרבות SSRIs אחרים, טריפטופן ונוגדי דיכאון טריציקליים כמו קלומיפראמין, נורטריפטילין ודסיפראמין.
תוסף מזונה הנקרא טריפטופן.
חומרים ויטוריים מסוימים (משמשים בהדרמה),
תרופות כמו ליתיום, מינרפידון, פרפאזין, קלואפין, (הנקראות אנטי-פסיכוטיות) המשמשות לטיפול במצבים **פסיכיאטריים** מסוימים.
פנטניל, שימוש בהדרמה או רציטונין,
שילוב של פוסאפארנאבי ורציטונין, המשמש לטיפול ב**דיהום** (פגלסטיס **היפוסיו האנושי** (HIV))

היפריקום (St. John's wort), צומח מרפא לדיכאון.
פנובארביטל, סודיום, סודיום, סודיום ואלפרטאט או קארבאמאזאפין, המשמשות לטיפול **בהתקפים** או **באפילפסיה.**
אסטנוקסטין, המשמשות לטיפול בהפרעת **הריכח הפיראקטיבית** (ADHD).
פירוציקלידן, המשמשות להקלה על רעד במיוחד **במחלת הפרקניסון.**
וארפרין או תרופות אחרות (הנקראות נוגדי קרישה) המשמשות **לדילול הדם.**

• פרופאפנזון, פלקאייד ותרופות המשמשות לטיפול ב**דופק לא סדיר.**
• מטופרולול, חוסם בטא המשמש לטיפול ב**לחץ דם גבוה ובבעיות לב.**
• פראבאקסאטין, המשמשות לטיפול ב**כולסטרול גבוה.**
• ריפאמפיצטין, המשמשות לטיפול ב**שחפת (TB)** ו**בצורה.**
• לינולוליד, **אנטי-ביורטיק.**
• טמוקסיפן, אשר מומקשת לטיפול בסרטן שד או בבעיות פוריות.

תופעות לוואי חשובות שצפוע עם פאקסט
חלק מהמטופלים הלוכחים **פאקסט** מפתחים תופעה הנקראת אקתיזיה, ובה הם **מרגישים חסרי מנוחה ומרגישים כאילו אינם יכולים לשבת או לעמוד בשקט.** מטופלים אחרים מפתחים תופעה שנקראת **תסמונת סרוטונין** ונודות דיכאון מקבוצת SSRI ו-SNRI עלולות לגרום לתסמונת סרוטונין (דיר) "תופעות לוואי חשובות לוואי חשובות שצפוע עם **פאקסט** ופרק 4 – "תופעות לוואי".

התסמונת עלולה להתרחש בשכיחות גבוהה יותר אם הניך נוטל בו זמנית תרופות נוספות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (ראה לעיל). יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שהינך נוטל.

שימוש בתרופה ומזון

נטילת **פאקסט** בבוקר עם מזון תקטין את הסבירות לך שתרגיש בחילה.

שימוש בתרופה בצריכת אלכוהול
הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא שלך ימליץ לך **איזה מינון לקחת כאשר תתחיל לקחת פאקסט**, אך אתה תסמינים או חלק מהמרכיבים של התרופה הלוואי שלך.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן ואת בהיריון או מחנכת הלתות, התינוק עם הרופא על הרופא לעד השימוש בתרופה זו. בתרופות שאינתיאמית לקוח **פאקסט** במהלך החודשים הראשונים להיריון, היו מספר דיווחים שהראו סיכון מוגבר למומים מולדים, כפרט כאלה הפוגעים בלב.

באוקלוסייה הכללית, כ-1 מכל 100 תינוקות נולד עם מום בלב. באימות שלקחו **פאקסט** זה עלה ל-2 מכל 100 תינוקות. ייתכן שאת והרופא שלך תחליט שיהיה טוב יותר עבורך להחליף לטיפול אחר או להפסיק לקחת בהדרגה **פאקסט** בזמן שאת בהיריון. אולם בהתאם לנסיבות שלך, ייתכן והרופא יציע שיהיה טוב יותר עבורך להמשיך לקחת **פאקסט**.

דאי שהרופא שלך יודע שאת לוקחת פאקסט. אם את נוטלת **פאקסט** בסמוך לסוף ההיריון שלך, ייתכן סיכון מוגבר לדימום נרתיקי כבד זמן קצר לאחר הלידה, במיוחד אם יש לך היסטוריה של הפרעות דימום. הרופא שלך או המיילדת צריכים להיות מודעים לכך שאת נוטלת **פאקסט** כדי שיוכלו ליישך לך. כאשר תרופות כמו **פאקסט** נלקחות במהלך ההריון, במיוחד בשלבים המתקדמים של ההריון, יתר עלולות להעלות את הסיכון למצב רפואי חמור בלידה. הנקרא יתר לחץ דם ריאתי מתמשך של היילוד (PPHN), ב-PPHN לחץ הדם בכלי הדם בין הלב של התינוק והריאות גבוה מדי. אם את לוקחת תרופות גם במהלך 3 חודשי ההריון האחרונים, לייילוד שלך עלולים להיות גם מצבים רפואיים אחרים, שמתחילים לרוב במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה. התסמינים כוללים:

אנשים מבוגרים ומחנכים מתחת לגיל 18
אין להשתמש ב**פאקסט** בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18. **פאקסט** אינו מיועד ואין להשתמש בו לטיפול בילדים ובמתבגרים, מאחר ומקרים קליניים מצאו קשר בין **פאקסט** ועלייה בסיכון להתנהגות אובדנית ועיונית.

השימוש ב**פאקסט** או הנבדק בילדים מתחת לגיל 7 שנים.
אם אתה מדוכא ואו יש לך הפרעה בדיכאון או בהפרעת החרדה שלך (SSRI).
אופיואידים. תרופות הנקראות טריפטנים, כמו סומאטריפטן, המשמשות לטיפול בכאב ובדלקת.
טרמדול, בפרנורפין ופטידין, **מיסכני כאבים.**

נוגדי דיכאון אחרים לרבות SSRIs אחרים, טריפטופן ונוגדי דיכאון טריציקליים כמו קלומיפראמין, נורטריפטילין ודסיפראמין.
תוסף מזונה הנקרא טריפטופן.
חומרים ויטוריים מסוימים (משמשים בהדרמה),
תרופות כמו ליתיום, מינרפידון, פרפאזין, קלואפין, (הנקראות אנטי-פסיכוטיות) המשמשות לטיפול במצבים **פסיכיאטריים** מסוימים.
פנטניל, שימוש בהדרמה או רציטונין,
שילוב של פוסאפארנאבי ורציטונין, המשמש לטיפול ב**דיהום** (פגלסטיס **היפוסיו האנושי** (HIV))

היפריקום (St. John's wort), צומח מרפא לדיכאון.
פנובארביטל, סודיום, סודיום, סודיום ואלפרטאט או קארבאמאזאפין, המשמשות לטיפול **בהתקפים** או **באפילפסיה.**
אסטנוקסטין, המשמשות לטיפול בהפרעת **הריכח הפיראקטיבית** (ADHD).
פירוציקלידן, המשמשות להקלה על רעד במיוחד **במחלת הפרקניסון.**
וארפרין או תרופות אחרות (הנקראות נוגדי קרישה) המשמשות **לדילול הדם.**

• פרופאפנזון, פלקאייד ותרופות המשמשות לטיפול ב**דופק לא סדיר.**
• מטופרולול, חוסם בטא המשמש לטיפול ב**לחץ דם גבוה ובבעיות לב.**
• פראבאקסאטין, המשמשות לטיפול ב**כולסטרול גבוה.**
• ריפאמפיצטין, המשמשות לטיפול ב**שחפת (TB)** ו**בצורה.**
• לינולוליד, **אנטי-ביורטיק.**
• טמוקסיפן, אשר מומקשת לטיפול בסרטן שד או בבעיות פוריות.

תופעות לוואי חשובות שצפוע עם פאקסט
חלק מהמטופלים הלוכחים **פאקסט** מפתחים תופעה הנקראת אקתיזיה, ובה הם **מרגישים חסרי מנוחה ומרגישים כאילו אינם יכולים לשבת או לעמוד בשקט.** מטופלים אחרים מפתחים תופעה שנקראת **תסמונת סרוטונין** ונודות דיכאון מקבוצת SSRI ו-SNRI עלולות לגרום לתסמונת סרוטונין (דיר) "תופעות לוואי חשובות לוואי חשובות שצפוע עם **פאקסט** ופרק 4 – "תופעות לוואי".

התסמונת עלולה להתרחש בשכיחות גבוהה יותר אם הניך נוטל בו זמנית תרופות נוספות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (ראה לעיל). יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שהינך נוטל.

שימוש בתרופה ומזון

נטילת **פאקסט** בבוקר עם מזון תקטין את הסבירות לך שתרגיש בחילה.

שימוש בתרופה בצריכת אלכוהול
הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא שלך ימליץ לך **איזה מינון לקחת כאשר תתחיל לקחת פאקסט**, אך אתה תסמינים או חלק מהמרכיבים של התרופה הלוואי שלך.

תופעות לוואי חשובות שצפוע עם פאקסט
חלק מהמטופלים הלוכחים **פאקסט** מפתחים תופעה הנקראת אקתיזיה, ובה הם **מרגישים חסרי מנוחה ומרגישים כאילו אינם יכולים לשבת או לעמוד בשקט.** מטופלים אחרים מפתחים תופעה שנקראת **תסמונת סרוטונין** ונודות דיכאון מקבוצת SSRI ו-SNRI עלולות לגרום לתסמונת סרוטונין (דיר) "תופעות לוואי חשובות לוואי חשובות שצפוע עם **פאקסט** ופרק 4 – "תופעות לוואי".

התסמונת עלולה להתרחש בשכיחות גבוהה יותר אם הניך נוטל בו זמנית תרופות נוספות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (ראה לעיל). יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שהינך נוטל.

שימוש בתרופה ומזון

הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

תופעות לוואי חשובות שצפוע עם פאקסט
חלק מהמטופלים הלוכחים **פאקסט** מפתחים תופעה הנקראת אקתיזיה, ובה הם **מרגישים חסרי מנוחה ומרגישים כאילו אינם יכולים לשבת או לעמוד בשקט.** מטופלים אחרים מפתחים תופעה שנקראת **תסמונת סרוטונין** ונודות דיכאון מקבוצת SSRI ו-SNRI עלולות לגרום לתסמונת סרוטונין (דיר) "תופעות לוואי חשובות לוואי חשובות שצפוע עם **פאקסט** ופרק 4 – "תופעות לוואי".

התסמונת עלולה להתרחש בשכיחות גבוהה יותר אם הניך נוטל בו זמנית תרופות נוספות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (ראה לעיל). יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שהינך נוטל.

שימוש בתרופה ומזון

הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

לעיתים ייתכן שתצטרך לקחת יותר מטבליה אחת או לקחת חצי טבליה. הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.</