



نشرة للمستعمل بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

باكست 20، 30 أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من **باكست 20** على:

باروكستينين (مهيبروكلويد) 20 ملغ

يحتوي كل قرص من **باكست 30** على:

باروكستينين (مهيبروكلويد) 30 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر الرجاء أنظر الفقرة 2 – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 – "معلومات إضافية".

اقرأ هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب الصيدلي خاصتك.

وصف هذا الدواء لاجلك، لا تحمله للأخريين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

في الأدوية المضادة للإكتئاب والقلق، تزيد من خطورة للتصرف والأفكار الإنتحارية لدى المتعالجين حتى عمر 25 سنة. عند بدء العلاج بالدواء، يتوجب على المتعالجين وأقربائهم مراقبة التغييرات من تفاقم للإكتئاب، أفكار إنتحارية، عدوانية وما شابه. إذا طرأت مثل هذه التغييرات، يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الفصيلة العلاجية: مثبّط إينثايني لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRI).

التأثيرات الطبية: لعلاج أعراض الاكتئاب من كافة الأنواع، بما في ذلك إكتئاب يترافق بالقلق، ومنع عودة الإضطراب النفسية، علاج أعراض ومنع عودة الإضطراب الوسواسي القهري (OCD) (**معوية obsessive compulsive disorder** واضطراب القلق مع أو بدون رهاب الخلاء ولعلاج أعراض الرهاب الإجتماعي (social phobia).

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

● كنت حساساً (البرجي) لـ باروكستينين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية").

● كنت تتناول أدوية تُسمى مثبطات مونوأمين أوكسيدياز (MAOIs)، بما فيها موكلوبيميد وكلويد ميثيلينوليومين (أذرق الميثيلين)) أو إذا تناولتها بوقت ما خلال الأسبوعين الأخيرين. ينصح طبيبك عليك بتوجب عليك البدء بتناول **باكست** بمجرد التوقف عن تناول مثبطات مونوأمين أوكسيدياز.

● كنت تتناول دواءً **مضاداً للذهان** يسمى ثيوريدازين أو دواءً مضاداً للذهان يُسمى بيموزيد.

● في حال **إستعمالك الدواء**، **إحك الطبيب** بدون تناول **باكست**.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ باكست، إحك الطبيب إذا:

● كنت تتناول أية أدوية أخرى (أنظر الفقرة 2 – "التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية").

● كنت تتناول تاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي أو مشاكل الخصوية. قد يؤدي **باكست**

إلى إنخفاض نجاعة تاموكسيفين، حيث قد يوصيك طبيبك بتناول مضاد آخر للإكتئاب.

● إذا كنت متعالجاً بـ **باكست**، في الكبد أو في القلب.

- **وُجد** لديك بعد فحص التخطيط الكهربائي للقلب شذوذ في تسجيل الأداء الوظيفي لقلبك الذي يعرف بإبطالة مقطع QT.
- **وُجدت** لديك سابقة عائلية لإصابة QT، أمراض قلبية مثل قصور القلب، نظم قلب متخفّض أو إنخفاض نسب اليوتاسوم أو إنخفاض نسب المغنيزيوم.
- **وُجد** لديك صرع أو سابقة من النوبات أو الإختلاجات.
- **وُجد** لديك عدّة مَرَجَة نوبات الهوس (نشاط مفرد لتصرف والأفكار).
- **كنت** تتلقى علاجاً بالهكرباه (ECT).
- **وُجدت** لديك سابقة من الأنفزة أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تزيد من خطورة حدوث نرّف (تلك الأدوية المستعملة لتسميع الدم، مثل وارفارين، مضادات الّذهان مثل بيريفينازين أو كلوزابين، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، الأدوية المستعملة لعلاج الألم والإلتهاب التي تسمى أدوية مضادة للإلتهاب غير ستيرويديية (NSAIDs) مثل: حمض أسيتيل الساليسيليك، إيبيبروفين، سيليكوكسيب، إيتودولان، نيكوفيناك، ميلوكسيكام).
- **وُجد** لديك سكري.
- **كنت** تتبع نظاماً غذائياً قليل الصوديوم.
- **وُجد** لديك جلوكوما (ضغط داخل العين).
- **كنت** حاملاً أو تخططين للحمل (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة")
- **إذا** عمارك دون 18 سنة (أنظر في الفقرة "الأطفال والمرافقون دون عمر 18 سنة")

● **إن** **إلتحق** عليك **واحد** مما ذكر، ولم تستشر طبيبك بعد، **ارجع إلى طبيبك** **وأسأل** عما يجب عليك فعله بشأن تناول **باكست**.

الأطفال والمرافقون دون عمر 18 سنة

لا يجوز استعمال **باكست** لدى الأطفال والمرافقين دون عمر 18 سنة.

باكست غير مخصص ولا يجوز استعماله لعلاج الأطفال والمرافقين، نظراً لأنه وجدت الأبحاث السريرية بأنظمة بين **باكست** وزيادة الخطورة لسوء إنتحاري وعُدائية.

لم يتم فحص استعمال **باكست** لدى الأطفال دون عمر 7 سنوات.

أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب أو اضطراب القلق لدى

إذا كنت تعاني من الإكتئاب و/ أو من اضطرابات القلق فمن الجائز أن تراودك أحياناً أفكار لإيذاء نفسك أو الإنتحار. من شأن هذه الأفكار أن تكون متزايدة عند البدء بتناول مضادات الإكتئاب لأول مرة، لأن كل هذه الأدوية تستغرق وقتاً لأن تعمل، عادة حوالي أسبوعين وربما أطول في بعض الأحيان. قد تُفكر هكذا **بإحتمالية أكبر:**

- إذا كان لديك في السابق أفكار لإيذاء نفسك أو الإنتحار.
- إذا كنت شاباً صغيراً، أظهرت المعلومات من التجارب السريرية زيادة الخطورة لمسلك إنتحاري لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة لديهم حالات نفسية تم علاجها بمضادات الإكتئاب.
- إذا وُجدت لديك أفكار لإيذاء نفسك أو الإنتحار في أي وقت، **توجه إلى طبيبك أو اذهب** إلى المستشفى على الفور.

قد تجد أنه من الجدي أن تخبر أحد أفراد العائلة أو صديقاً مقرباً أنه لديك

إكتئاب أو اضطراب القلق، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم

إخبارك فيما إذا كانوا يعتقدون أن الإكتئاب أو الإكتئاب لديك يتفاقم، أو إذا كانوا قلقين بشأن التغييرات في سلوكك.

أعراض جانبية مهمة **لوحت** مع **باكست**

تطوّرت لدى قسم من المتعالجين الذين تناولوا **باكست** ظاهرة تُسمى تعذر الجلوس (*akathisia*)، حيث يشعرون بثقله **راحة** ويشعرون **واكئهم** لا يستطيعون الجلوس أو الوقوف بهيج. تطوّر لدى قسم متعالجون آخرون ظاهرة تُسمى **متلازمة الجولس** أو **الوقوف بهيج**. تطوّر لدى قسم متعالجون آخرون ظاهرة تُسمى **استسلازمة السيروتونين أو المتلازمة الخبيثة للدواء المضادة للذهان**، عندما يكون لديهم كل أو بعض الأعراض التالية: شعور قوي بالصعبية أو الهيجان، الشعور بالإرتباك، يبعرج التوقف عن تناول مثبطات مونوأمين أوكسيدياز.

● **كنت تتناول دواءً مضاداً للذهان** يسمى ثيوريدازين أو دواءً مضاداً للذهان يُسمى بيموزيد.

● **في حال إستعمالك الدواء**، **إحك الطبيب** بدون تناول **باكست**.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

● **كنت** تتناول أدوية أُخرى (أنظر الفقرة 2 – "التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية").

● **كنت** تتناول تاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي أو مشاكل الخصوية. قد يؤدي **باكست** إلى إنخفاض نجاعة تاموكسيفين، حيث قد يوصيك طبيبك بتناول مضاد آخر للإكتئاب.

● **إذا** كنت متعالجاً بـ **باكست**، في الكبد أو في القلب.

● **إذا** كنت متعالجاً بـ **باكست** (المسماة مثبطات إنتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين SSRIs) أعراضاً لـ "اضطراب في الأداء الوظيفي الجنسي" (أنظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية").

● **قد** تسبب الأدوية مثل **باكست** (المسماة مثبطات إنتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين SSRIs) أعراضاً لـ "اضطراب في الأداء الوظيفي الجنسي" (أنظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية").

● **في** بعض الحالات، استمرّرت هذه الأعراض بعد التوقف عن العلاج.

● **التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية**

يمكن أن تؤثر الأدوية معينة على طريقة عمل **باكست**، أو تزيد من إحتمالية حدوث أعراض جانبية لديك. قد يؤثر **باكست** أيضاً على طريقة عمل أدوية معينة.

● **إذا** كنت تستعمل، أو **إذا** استعملت مؤخراً، **أدوية أخرى** بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية **وأضافات غذائية، إلك** خلطوكس، **إحك الطبيب** عن ذلك، بالأخص إذا كنت تستعمل:

- **الأدوية المسماة مثبطات مونوأمين أوكسيدياز (MAOIs)**، بما في ذلك موكلوبيميد وكلويد الميثيلينوليونيم (أذرق الميثيلين)) - أنظر الفقرة 2 - "لا يجوز استعمال الدواء إذا"
- **أدوية** التي تعرف بأنها تزيد من خطورة حدوث تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب (مثلًا الأدوية المضادة للذهان ثيوريدازين أو بيموزيد) - أنظر الفقرة 2 - "لا يجوز استعمال الدواء إذا"
- حمض أسيتيل الساليسيليك (أسبيرين)، إيبيبروفين أو أدوية أخرى المسماة NSAIDs (الأدوية المضادة للإلتهاب غير الستيرويديية) مثل سيليكوكسيب، إيتودولان، نيكوفيناك وميلوكسيكام، المستعملة لعلاج **الألم والإلتهاب**.
- **ترامادول،** بوبرينورفين وبييتدين، **مستحكات** **الألام**.
- بوبرينورفين بمشارة نالكوسون، علاج بديل للإدمان **على المواد الأفيونية.**
- **أدوية** المسماة تريبتانات، مثل مسواترپيتان، المستعملة لعلاج **الصدفية** (ميجريتا)، **مضادات** **الإكتئاب** الأخرى بما في ذلك الـ SSRI الأخرى، تريبتوفان ومضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة مثل كلوميبرامين، نورترينيتلين وديسبرامين.
- **مكمل** **غذائي** يسمى تريبتوفان.
- ميثاكوربيوم وسوميكستونيم (يُستعملان في التخدير).
- أدوية مثل ليثيوم، ريسبيريدون، بيريفينازين، كلوزابين، (التي تسمى مضادات الّذهان) المستعملة لعلاج **حالات نفسية** معينة.
- مضبوطات في التنفس
- جلد مزرق أو ساخن أكثر مما ينبغي أو بارد أكثر مما ينبغي
- هشاش زرقاء
- تقيؤ أو صعوبات في الإطعام
- إرقاق مفرد، صعوبة في النوم أو بكاء بكثرة
- ضلّاب أو إرضخا العضلات
- ارتجاف، عصبية أو نوبات
- متعسكات مفردة
- إنخفاض نسبة سكر الدم
- إذا عانى رضيعك من أي من هذه الأعراض عند ولادته، أو إذا كنت قلقة بشأن صحة رضيعك، **توجهي إلى طبيبك للحصول على إستشارة.**

البشرية (HIV)

هيبيريكوم (St. John's Wort)، نبات شافوي للإكتئاب. فينوبوربول، حاجب بيتا المستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب. برافاستاتين، المستعمل لعلاج ارتفاع الكولسترول. ريفامبيسين، الذي يستعمل لعلاج السل (TB) والجذام.

- **أوموكستينين** يُستعمل لعلاج **إضطراب الإسهاف والتركيز وفرط النشاط (ADHD)**.
- **بروسكليندين،** المستعمل لتخفيف الارتجاف وخاصة في مرض **باركسنسون**.
- وارفارين أو أدوية أخرى (تسمى مضادات التخثر) المستعملة لتسميع الدم.
- بروپاييفنون، فلِكَالينيد وأدوية المستعمل لعلاج عدم إنتظام ضربات القلب.
- مينيوربول، حاجب بيتا المستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب.
- برفاستاتين، المستعمل لعلاج ارتفاع الكولسترول.
- ريفامبيسين، الذي يستعمل لعلاج السل (TB) والجذام.
- لينزوليدين، **مضاد حيوي**.
- تاموكسيفين، الذي يُستعمل لعلاج **سرطان الثدي** أو **مشاكل الخصوية.**

● **إذا** كنت تتناول أو تتناول مؤخراً **أياً** من **الأدوية** **المرجدة** **في** **هذه القائمة،** ولم تستشر طبيبك بعد بشأنها، **فارجع إلى طبيبك** **وأسأل** عما **يجب** عليك عمله. من الجائز أن تحتاج إلى تغيير المقدار الدوائي أو قد تحتاج إلى تناول دواء آخر.

● **تؤدي** الأدوية المضادة للإكتئاب من فصيلة **SSRI** وSNRI إلى حدوث متلازمة السيروتونين (نادرة) (أنظر الفقرة 2 - "الأعراض الجانبية").

● **باكست** (الأعراض الجانبية).

● **تحدث** المتلازمة بشيوع أكبر إذا كنت تتناول في نفس الوقت أدوية أخرى تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (أنظر أعلاه). يجب إبلاغ طبيبك عن أي دواء إضافي تتناوله.

استعمال الدواء والطعام

إن تناول **باكست** في الصباح مع الطعام سيقال من إحتمالية الشعور بغثيان.

● **يجب** استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

● المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

● **من** الجائز **أحياناً** أن تحتاج لتناول أكثر من قرص واحد أو تناول نصف القرص يوميك طبيبك أي مقدار دوائي يجب أن تتناوله عند بدء تناول **باكست** لأول مرة. يبدأ معظم الناس في الشعور بالتحسن بعد بض أسبوعين، إحك لطبيبك إذا لم تبدأ في

الشعور بالتحسن بعد هذه الفترة الزمنية. من الجائز أن يقرر زيادة المقدار الدوائي تدريجياً، **10** ملغ في كل مرة، حتى المقدار الدوائي اليومي الأعظمي.

● لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات

في عامة السكان، ولد حوالي 1 من **100** رضيع مع عيب في القلب. لدى الأمهات الحوامل، تناولوا **باكست** زادت النسبة إلى حتى **2** من **100** رضيع، من الجائز أن تقرري أنت وطبيبك أنه من الأفضل لك التغيير إلى علاج آخر أو التوقف تدريجياً عن تناول **باكست** أثناء الحمل. ومع ذلك، بناءً على طروفك، من الجائز أن يقترح طبيبك أنه من الأفضل لك الإستمرار في تناول **باكست**.

● **تأكد** من **أن طبيبك** **على** علم **بانك** **تتناولين باكست.** إذا كنت تتناولين **باكست** قريباً من نهاية فترة الحمل لديك، فمن الجائز أن تكوني معرضة لخطورة زائدة لحدوث نرّف مهبلي شديد بعد فترة قصيرة من الولادة، خاصة إذا وجدت لديك سابقة لإضطرابات في النرّف. على طبيبك أو القبالة أن تقرر إذا علم بانك تتناولين **باكست** لكي يتمكنا من تقديم الإستشارة لك.

● عندما يتم تناول أدوية مثل **باكست** أثناء الحمل، وخاصة في المراحل المتقدمة من الحمل، فهي قد تزيد من خطورة حدوث حالة طبية خطيرة عند الرضع، تسمى ارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر للولود (PPHN)، في PPHN يكون ضغط الدم في الأوعية الدموية بين قلب الرضيع ورئتيه مرتفعاً أكثر مما ينبغي. إذا كنت تتناولين **باكست** خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل، فقد يعاني طفلك أيضاً من حالات طبية أخرى، والتي تبدأ غالباً خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة. تشمل الأعراض:

- صعوبات في التنفس
- جلد مزرق أو ساخن أكثر مما ينبغي أو بارد أكثر مما ينبغي
- هشاش زرقاء
- تقيؤ أو صعوبات في الإطعام
- إرقاق مفرد، صعوبة في النوم أو بكاء بكثرة
- ضلّاب أو إرضخا العضلات
- ارتجاف، عصبية أو نوبات
- متعسكات مفردة
- إنخفاض نسبة سكر الدم
- إذا عانى رضيعك من أي من هذه الأعراض عند ولادته، أو إذا كنت قلقة بشأن صحة رضيعك، **توجهي إلى طبيبك للحصول على إستشارة.**

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان **بالقرص** **الفلج** **الاستعماري** **الفوري.** لا تتوفر معلومات في الموضوع

● **تعال** **الحاجة** بإلمكان