

**Информационный листок для пациента в соответствии с Правилами фармацевтики  
(лекарственные препараты) - 1986**

Безрецептурный лекарственный препарат

**Фунгидерм  
Крем**

**Действующее вещество:** миконазол нитрат 2% (miconazole nitrate).

Список неактивных компонентов приведен в пункте 6. Смотрите также раздел "Важная информация о некоторых компонентах препарата" в пункте 2.

**Перед применением препарата внимательно прочтите этот листок до конца.**

В этом информационном листке изложена краткая информация о лекарственном препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат может использоваться для детей в возрасте до двух лет только по предписанию врача.

Этим препаратом следует пользоваться надлежащим образом. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

Если через 4 недели состояние не улучшится, или если у вас появятся признаки (симптомы) обострения, следует обратиться к врачу.

**1. Для чего предназначен этот препарат?**

Этот крем предназначен для лечения грибковых инфекций на коже и на ногтях.

**Группа препаратов:** противогрибковые.

**2. Перед использованием препарата**

**Не следует использовать данный препарат в следующих случаях:**

Не пользуйтесь этим препаратом, если у вас есть чувствительность (аллергия) к действующему веществу (миконазол), к другим веществам из группы имидазола (imidazole) и их производным, или к любым другим дополнительным компонентам крема (список пассивных компонентов приведен в пункте 6).

**Особые меры предосторожности, связанные с использованием препарата:**

- Перед первым использованием препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать ненужного применения.
- Не следует применять препарат часто или в течение длительного времени, не посоветовавшись с врачом.
- При наличии аллергии к каким-либо пищевым продуктам или лекарствам перед началом лечения следует сообщить об этом врачу.
- При появлении раздражения, зуда или любой чувствительности (включая аллергию) к этому крему следует немедленно прекратить пользоваться им.

**Если вы принимаете или недавно принимали любое другое лекарство, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, то расскажите об этом врачу или фармацевту.** Особенно важно сообщить врачу или фармацевту о пероральном приеме противотромбозных препаратов, разжижающих кровь, например, варфарина. Если вы не знаете точно, принимаете ли вы эти препараты, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**Беременность и грудное вскармливание:**

Не следует пользоваться этим препаратом, предварительно не проконсультировавшись с врачом, если вы беременны, подозреваете беременность, планируете забеременеть или кормите грудью. Врач решит, можете ли вы использовать этот препарат в ходе беременности или кормления грудью.

**Применение у детей:** этот препарат не предназначен для детей в возрасте до двух лет без указания врача.

**Вождение транспортных средств и управление механизмами:** крем не влияет на способность управлять транспортными средствами и/или механизмами.

**Важная информация о некоторых компонентах препарата:**

Некоторые из компонентов данного препарата могут вызывать кожные и аллергические реакции у определенных людей (список неактивных компонентов приведен в пункте 6).

**3. Как следует пользоваться препаратом?**

- **Обратите внимание!** Не допускайте проглатывания препарата! Препарат предназначен исключительно для наружного применения.
- Избегайте контакта с областью глаз.

**Стандартная принятая дозировка:**

- Препарат следует наносить на пораженный участок кожи два раза в день. Продолжайте лечение в течение семи дней после исчезновения всех симптомов, чтобы избежать их повторного появления.
- Продолжительность лечения может меняться от 2 до 6 недель, в зависимости от локализации и степени серьезности поражения.
- **Не следует превышать рекомендуемую дозу.**
- Если вы не уверены в отношении дозировки и способа применения препарата, то следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
- Если через 4 недели состояние не улучшится, или в случае обострения следует обратиться к врачу.

**Как наносить крем?**

- Вымойте и тщательно просушите пораженный участок.
- Нанесите крем на пораженный участок и на кожу вокруг него.
- После нанесения крема тщательно вымойте руки (если пораженный грибком участок кожи не находится на руках), чтобы грибковая инфекция не распространилась на другие участки тела, и чтобы не заразить других людей.
- Поскольку многие очаги поражения являются заразными, во избежание заражения вам следует использовать личное полотенце и салфетку для умывания.
- Кроме этого, следует часто менять и стирать одежду, которая находилась в контакте с пораженными участками кожи, например, носки.

**Если вы по ошибке применили более высокую дозу:** чрезмерное использование может привести к раздражению кожи, которое обычно исчезает после прекращения лечения. Если кто-либо по ошибке проглотил крем, то следует немедленно обратиться к врачу или в приемный покой больницы и взять с собой упаковку от препарата.

**Если вы забыли применить препарат:** если вы пропустили одну дозу, нанесите крем в следующий раз, как обычно. **Не следует** наносить двойную дозу.

**Как вы можете способствовать успеху лечения?**

- Влага стимулирует рост грибков, поэтому пораженные участки всегда должны оставаться сухими. Перед каждым нанесением крема пораженный участок следует вымыть и тщательно высушить своим личным полотенцем.
- При лечении грибковых поражений ног очень важно тщательно мыть и высушивать стопы, особенно область между пальцами. Рекомендуется носить хлопчатобумажные носки, не содержащие шерсти или синтетических материалов. В теплый сезон желательно носить сандалии без носков.
- Не накладывайте на пораженные участки повязку без предписания врача.
- Не следует использовать или принимать лекарства в темноте! Проверяйте этикетку и дозу при каждом применении препарата. Если вам нужны очки, то наденьте их.

- Если у вас есть дополнительные вопросы в отношении использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

#### **4. Побочные явления**

"Фунгидерм", как и любой другой лекарственный препарат, может вызывать побочные явления у некоторых пациентов. Если эти побочные явления не проходят, или если они беспокоят вас или обостряются, следует проконсультироваться с врачом. Не пугайтесь приведенного ниже списка побочных явлений, возможно, у вас не появится ни одного из них.

**При появлении следующих побочных явлений прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу** (смотрите также особые предупреждения в пункте 2):

*Нераспространенные побочные явления (у 1 - 10 пациентов из 1000):*

Чувство жжения на коже, воспаление кожи, местные реакции в области нанесения крема (например, раздражение, жжение, жар, зуд), изменение цвета кожи (включая гипопигментацию).  
*Побочные явления, распространенность которых неизвестна (явления, частота которых еще не установлена):*

- Острая аллергическая реакция, анафилактическая реакция или ангионевротический отек. Эти симптомы, в частности, могут включать опухание лица, губ, языка или горла.
- Другие аллергические реакции, например, крапивница (уртикария), контактный дерматит (contact dermatitis), раздражение кожи, сыпь, покраснение, зуд.

#### **Побочные явления и взаимодействие с другими препаратами у детей:**

Родители должны сообщать лечащему врачу обо всех побочных явлениях и обо всех других лекарственных препаратах, которые принимает их ребенок. Обратите внимание на описанные выше побочные явления и взаимодействие препаратов.

Если у вас появится или обострится одно из вышеперечисленных побочных явлений, или если у вас возникнет побочное явление, которое не описано в этом информационном листке, вы должны проконсультироваться с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство здравоохранения, пройдя по ссылке "Сообщить о побочном явлении в результате медикаментозного лечения" на домашней странице сайта Министерства здравоохранения в интернете ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)). При этом вы будете направлены на компьютерный бланк сообщения о побочных явлениях. Вы также можете ввести следующий адрес: <https://sideeffects.health.gov.il/>

#### **5. Как следует хранить препарат?**

- Избегайте отравлений! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, не доступном и не видимом для детей и/или младенцев. Это поможет вам избежать отравления. Не следует вызывать рвоту без четкого указания врача.
- Не следует использовать препарат после истечения срока годности (exp. date), который указан на упаковке. Указанная дата относится к последнему дню месяца.
- Условия хранения: хранить при температуре ниже 25°C.

После открытия тюбика можно использовать крем в течение 3-х месяцев, но не позднее даты истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### **6. Дополнительная информация**

**Кроме действующего вещества в состав этого крема входят также следующие неактивные компоненты:**

Stearoyl macrogol glycerides, propylene glycol, isopropyl myristate, cetyl alcohol, polysorbate 80, mixture of parabens (methyl, ethyl, butyl, isobutyl and propylparaben in 2-phenoxyethanol), sorbitan sesquioleate, carbomer, monoethanolamine, disodium edetate, water.

**Как выглядит препарат и что находится в упаковке?**

Белый крем в алюминиевом тюбике.

**Производитель и владелец регистрации:** "Маабодот Рафа Лтд.", Иерусалим 9100301, п. я. 405.

Эксклюзивный распространитель: "Супер-фарм (Израиль) Лтд.", Герцлия 4672516, п.я. 2171

**Номер лицензии препарата в Государственном реестре лекарственных препаратов в Министерстве здравоохранения: 131-36-31024.**

Листок составлен в июле 2023 года согласно инструкциям Министерства здравоохранения.

Для простоты и удобства чтения текст листка сформулирован в мужском роде, но препарат предназначен для обоих полов.