

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פנליפס®
קרם

1 גרם קרם מכיל:
פנציקלוביר 10 מ"ג, 1% W/W
Penciclovir 10mg, 1% W/W
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה, אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 4 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?
פנליפס מיועדת לטיפול מקומי בפצעי קור (הרפס השפתיים).

קבוצה תרפויטית: אנטי-ויראלי לשימוש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פנציקלוביר (penciclovir), לפמציקלוביר (famciclovir) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

שוחח עם הרופא או הרוקח לפני תחילת השימוש בפנליפס.

- אין להשתמש בקרם בתוך הפה, בתוך העיניים או בסמוך לעיניים, באף או באזור איברי המין. יש להימנע ממריחת הקרם בסמוך לעיניים.

לפני הטיפול בפנליפס, ספר לרופא אם:

- אינך בטוח האם הפצע שלך הוא פצע קור.
- יש לך מערכת חיסונית מוחלשת או שאתה מקבל טיפול שמחליש את המערכת החיסונית שלך (כלומר האופן בו גופך נלחם בזיהום), לדוגמה, זיהום ב-HIV, השתלת מח עצם או טיפול בסרטן.
- אתה צריך לטפל בכיבים או בשלפוחיות המופיעים סביב העיניים או באזור איברי המין שלך.

פנה לרופא שלך אם פצע הקור שלך מחמיר או שהינו חמור.

אזהרות נוספות

על מנת למנוע העברת הזיהום (הדבקה) או החמרתו, אל תיגע בפצע הקור שלך (ראה גם סעיף 3 "באילו אמצעי זהירות כלליים עליך לנקוט כאשר הינך סובל מפצע קור?").

ילדים ומתבגרים

פנליפס אינה מומלצת לטיפול בילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אינטראקציות/תגובות ביןתרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
אין תגובות בין תרופתיות ידועות בין פנליפס לבין תרופות אחרות. עם זאת, ספר לרופא או לרוקח אם הינך לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כלשהן.

הריון, הנקה ופוריות

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת להיכנס להריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.
אין מידע זמין בנוגע לפוריות.

נהיגה ושימוש במכונות

לא נצפתה השפעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הקרום מכיל:

- צטוסטאריל אלכוהול (cetostearyl alcohol) שעלול לגרום לתגובות מקומיות בעור (כגון דלקת עור ממגע).
- פרופילן גליקול (propylene glycol) שעלול לגרום לגירוי בעור.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. חשוב להתחיל בטיפול מוקדם ככל האפשר עם הופעת סימנים מקדימים כגון: עקצוץ, אדמומיות וגירוי באזור השפתיים.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים:

בעזרת אצבע נקיה יש למרוח פנליפס קרם על האזורים הנגועים כל שעתיים לערך במהלך היום (כ-8 פעמים ביום).

גם אם הטיפול בפנליפס החל לאחר הופעת הפצע, התרופה מאיצה את תהליך ההחלמה, מקלה על הכאב ומצמצמת את התפשטות הוירוס.
משך הטיפול הינו 4 ימים. אם לאחר ארבעה ימי טיפול המצב מחמיר או הפצע אינו מחלים, יש לפנות לרופא.

חשוב להתמיד בטיפול במשך 4 ימים (גם אם חל שיפור לפני כן) שכן אם הטיפול אינו נמשך פרק זמן ארוך מספיק או שהוא מופסק לפני הזמן הדרוש, הפצע עלול להתפרץ מחדש.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לשטוף ידיים לפני ואחרי כל שימוש בקרם.

אין לבלוע את התרופה. תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם מרחת כמות גדולה יותר של קרם פנליפס ממה שנדרש

לא צפויות תופעות מזיקות במידה ומרחת כמות גדולה של קרם על העור שלך בבת אחת, למרות שייתכן שיופיע גירוי מסוים בעור.

אם שכחת למרוח קרם פנליפס, יש למרוח את המנה הבאה ברגע שאתה זוכר, ואז יש להמשיך בשימוש כפי שהיה לפני המנה שנשכחה. אין למרוח יותר קרם על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

אם בטעות בלעת קרם פנליפס, פנליפס אינה מזיקה במידה ונבלעה בטעות ואין צורך בטיפול, אך היא עלולה לגרום לגירוי בפה. יש ליצור קשר עם הרופא או הרוקח במידת הצורך.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

באילו אמצעי זהירות עליך לנקוט כאשר הינך סובל מפצע קור?

- זכור כי פצעי קור הינם מדבקים.
- על מנת למנוע מהנגיף להדביק חלקים אחרים בגוף, או העברת הנגיף לאנשים אחרים, חשוב שבזמן שיש לך פצע קור:
 - תימנע מלנשק, במיוחד ילדים.
 - תימנע מקיום יחסי מין אוראליים.
 - תשתמש במגבת ובמגבת פנים שלך בלבד ותימנע משימוש משותף בסכו"ם, ספלים, כוסות וכו'.
 - תימנע מלפוצץ את השלפוחיות או מלגעת בפצע, מאחר שזה עלול להאריך את תהליך ההחלמה.
 - תימנע ממגע עם העיניים מאחר והנגיף יכול לגרום למצב חמור במידה שתהיה הדבקה של העיניים.
- אין להעביר את התרופה לאחרים, גם אם התסמינים שלהם זהים לשלך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפנליפס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלוואי המופיעות כתוצאה משימוש בפנליפס הן בדרך כלל קלות.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעות תגובות של רגישות יתר (אלרגיה) כגון דלקת עור אלרגית (allergic dermatitis), פריחה, נפיחות בולטת ומגרדת או נפיחות של האזור בו נמרח הקרם.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (common), תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100: גרד, צריבה, עקצוץ או חוסר תחושה ראשוניים במקום המריחה.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והשפופרת. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-30°C. אין להקפיא. אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק את התרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Propylene glycol, purified water, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, paraffin liquid, cetomacrogol 1000, nitrogen.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פנליפס הינו קרם לבן חלק בשפופרת אלומיניום של 2 גרם.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 142-41-31798

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

Fenlips, פנליפס, Фенлипс and فنليپس are registered trademarks of Perrigo Pharma International DAC.

11/2023