

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

### لكروميتسين قطرات معقمة للعينين

المادة الفعالة وتركيزها:

جينتامييسين سولفات (Equivalent to 0.3% Gentamycin base) Gentamycin Sulfate

كل 1 مل يحتوي على: 3 ملغ جينتامييسين (كسولفات)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر انظر البند 6 – "معلومات إضافية" والبند 2 – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

#### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج تلوّثات العين الخارجية التي تسببها جراثيم حسّاسة للدواء. الفصيلة العلاجية: مضاد حيوي من مجموعة الجلوكوزيدات الأمينية.

#### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:  
إذا كنت حساساً (ألبرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحويها الدواء (انظر البند 6 – "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ لكروميتسين، أخبر الطبيب إذا:

- كنت حاملاً (الثالث الأول/الأخير) أو مرضعة.
- كنت تعاني أو عانيت من خلل في السمع أو خلل في وظيفة الكلى.
- كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

الاستعمال المطول قد يسبب تطور سلالات مقاومة بما في ذلك التلوّث الفطري.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي لكروميتسين على مادة حافظة كلوريد البنزلكونيوم، والتي يمكن أن تمتصها العدسات اللاصقة اللينة.

- لا يجوز استعمال هذا المستحضر عند وضع العدسات اللاصقة اللينة.
- يجب نزع العدسات قبل استعمال المستحضر، ويمكن إعادتها بعد 15 دقيقة على الأقل من تنقيط الدواء في العين.

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

#### طريقة الاستعمال:

1. لتجنب التلوث، لا تدع طرف القنينة يلمس أي سطح (بما في ذلك العين نفسها). يجب حفظ القنينة مغلقة بإحكام.
2. قد تكون قنينة القطرات غير ممتلئة؛ هذا الأمر معد للتحكم بشكل أفضل في وتيرة التنقيط.
3. كيفية استعمال القطرات: أولاً، اغسل يديك. قم بإمالة الرأس إلى الخلف. بواسطة إصبع السبابة، اسحب الجفن السفلي للأسفل لتشكيل ما يشبه "الجيب". يجب تنقيط الدواء في "الجيب" الذي تم تشكيله. أغمض عينيك بلطف. لا ترمش. ابق مغلقت العينين لمدة 1 حتى 2 دقيقة.
4. بالإضافة إلى التعليمات المذكورة أعلاه - فوراً بعد تنقيط القطرات في العين، اضغط بالإصبع الوسطى على الزاوية الداخلية للعين. يجب أن يستمر الضغط لمدة 1 حتى 2 دقيقة بعد التنقيط في العين. يساعد هذا الإجراء على تجنب امتصاص الدواء في الجسم وبالتالي يساعد على منع الأعراض الجانبية.
5. بعد استعمال الدواء، اغسل يديك جيداً لتنظيفهما من بقايا الدواء.
6. لتجنب انتشار التلوث، لا يجوز استعمال نفس وعاء الدواء لأكثر من شخص واحد.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال عدة أيام يجب مراجعة الطبيب. يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة حسب إرشادات الطبيب المعالج.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً: إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء توجه حالاً لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد تناول المقدار الدوائي حال تذكرك ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدارين دوائيين في نفس الوقت! يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب. لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن استعمال لكروميبتسين قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا ظهرت الأعراض التالية: وخز، احمرار وانتفاخ. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يدرج في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على علبة الكرتون والملصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. لا يجوز التجميد.
- خزّن في العلبة الأصلية. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من شهر بعد فتح القنينة للمرة الأولى.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Benzalkonium Chloride, Povidone, Purified Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Phosphate Monobasic.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

لكروميتسين هو مستحضر قطرات للعينين الذي يتوفر ضمن قنينة بلاستيكية مع قطارة يحتوي على 5 مل من محلول رائق وشفاف.

اسم المنتج، صاحب التسجيل وعنوانه: فيشر للصناعات الدوائية م.ض.، شارع بار يوحاي 9، بني براك 5155309 أو ص.ب. 39071، تل أبيب 6139001.

تم إعداد هذه النشرة في شباط 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 509624707

من أجل السهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

رمز التخزين التعريفي للنشرة 390752 رمز التخزين التعريفي المنتج الخام 30055