

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

מייבנקלאד 10 מ"ג

טבליות

החומר הפעיל:

כל טבלייה מכילה קלדריבין 10 מ"ג (cladribine 10 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתך דומה. בנוסף לעלון, לתכשיר מייבנקלאד קיימים מדריך לטיפול במייבנקלאד ומפעול על פיו. יש לעיון במדריך לטיפול ובעלון לצריכן לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול במייבנקלאד בטיחותי חשוב שעלייך לדעת בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמר את המדריך לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה

מייבנקלאד מיועד לטיפול במוגרים עם טרשת נפוצה התקפית פעילה מאוד. קבוצה **טרופיתית (טיפולית)**: מדכא סלקטיבי של מערכת החיסון.

טרשת נפוצה היא מחלת שבבה דלקת הורסת את המערכת המגן מסביב לעצבים. מייבנקלאד מכיל את החומר הפעיל קלדריבין, חומר ציטוטוקסי (הורג תאים) הפועל בעיקר על לימפוציטים (תאים של מערכת החיסון המעורבים בדלקת).

טיפול עם מייבנקלאד הראה הפחתה בהתקלחויות של תסמים והאטיה בהתקדמות הנכות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל קלדריבין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6)
- אתה נשא HIV, ככלומר אתה נגע בנגיף הכתול החיסוני האנושי (HIV)
- יש לך שחפת פעילה או דלקת כבד (הפטיטיס)
- יש לך מערכת חיסון מוחלשת כתוצאה ממצב רפואי או בגלל **נטילת תרופות אחרות המחלישות את מערכת החיסון** או מפחיתה את ייצור תאי הדם במח העצם כולל:
 - ציקלוספורין, ציקלופוספאמיז ואזאתיאופרין (המשמשים לדיכוי מערכת החיסון, למשל לאחר השתלת איברים)
 - מתוטרקסאט (המשמש לטיפול במצבים כמו פסורייזיס או דלקת מפרקים שגרונית)
 - קוורטיקוסטרואידים ארוכי טווח (המשמשים להפחחת דלקת, למשל באסתמה)
 ראה גם סעיף "tagobot בין תרופתיות"
- יש לך סרטן פעל
- יש לך בעיות מתונות או חמורות כליניות
- **את בהירין או מניקה (ראי גם סעיף "הירון והנקה")**

אם אין לך אחד מהן'ל חל עלייך, אל תיטול מייבנקלאד ונסה לרופא או לרופחת.

اذירות ואמצעי זהירות מיוחדים הנוגעים לשימוש בתרופה

ziehominim

אתה תיבדק לראות אם יש לך זיהומים כלשהם לפני התחלת טיפול עם מייבנקלאד. חשוב לדבר עם הרופא אם אתה חושב שיש לך זיהום. תסmini זיהום יכולים לכלול חום, כאב, כאב שרירים, כאב ראש, הרגשה כללית לא טובת או הצהבה של העיניים. הרופא עשוי לדוחות את הטיפול או להפסיקו עד שהזיהום יחולף.

אם נדרש, אתה תחוסף כנגד שלבket חוגרת לפני התחלת הטיפול. יהיה עליך לבחות בין 4 ל-6 שבועות עד שהחיסון יתחל לפועל. **ספר לרופא מייד אם יש לך תס敏ים של שלבket חוגרת, סיבור נפוץ של מייבנקלאד** (ראה סעיף 4), אשר עשוי להזכיר טיפול ספציפי.

דלקת מוח נגיפית - PML (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

אם אתה חושב שחליה החמורה בטרשת הנפוצה או אם אתה מבחין בתס敏ים חדשים כלשהם, לדוגמה שניינ' במצבי הרוח או בהתנהגות, בעיות בזיכרון, קשיי דיבור או תקשורת, דבר עם הרופא בהקדם האפשרי. אלו עלולים להיות תס敏ים של הפרעה נדירה במוח הנגרמת על ידי זיהום ונקראת דלקת מוח נגיפית (PML). דלקת מוח נגיפית היא מצב חמור העולם להוביל לנכונות חמורה או מוות.

למרות שלדקה מוח נגיפית לא נצפתה עם מייבנקלאד, כאמור זיהירות, **יתכן שתצטרך MRI ראש** (דימות באמצעות תהודה מגנטית) לפני התחלת הטיפול.

سرطان

airyועים בודדים של סרטן נצפו במטופלים אשר קיבלו קלדריבין במחקריהם קליניים. דבר עם הרופא אם היה לך בעבר סרטן. הרופא יחליט מהי אפשרות הטיפול הטובה ביותרabhängig. כאמור זיהירות, עליך לעקוב אחר המלצות הסטנדרטיות לאיתור סרטן, כפי שהומלץ על ידי הרופא.

בעיות בכבד

מייבנקלאד עשוי לגרום לביעיות בכבד. **ספר לרופא לפני נטילה של מייבנקלאד אם יש לך או היי לך בעבר בעיות בכבד.** ספר לרופא שלך באופן מיידי אם אתה מפתח אחד או יותר מהתס敏ים הבאים: תחושת בחילה, הקאות, כאבי בטן, עייפות, אובדן תיאבון, עור או עיניים צהובות (צחבות) או שתן כהה. אלה יכולים להיות תס敏ים של בעיות כבד חמורות.

אמצעי מניעה

על גברים ונשים להשתמש באמצעי מניעה ייעילים במהלך הטיפול ולמשך לפחות 6 חודשים לאחר המנה האחורה. זה חשוב מאחר שמייבנקלאד עשוי להזיק לתינוק באופן קבוע. ראה גם סעיף "הירון והנקה".

עירויי דם

אם אתהzekק לעירוי דם, ספר לרופא שאתה נוטל מייבנקלאד. **יתכן שתצטרך לקבל דם שעבר הקRNA על מנת למנוע סיבוכים.**

שינויי בטיפול

אם אתה מחייב טיפול אחר לטרשת נפוצה במייבנקלאד, הרופא יבודק שספירת תא הדם (ליימפוציטים) תקינה לפני תחילת הטיפול.

אם אתה מחייב מייבנקלאד בטיפול אחר לטרשת נפוצה, דבר עם הרופא. יכול להיות שתהיה חפיפה בהשפעה על מערכת החיסון.

ילדים ומתבגרים

השימוש במייבנקלאד אינו מיועד למטופלים מתחת לגיל 18. התרופה לא נבדקה בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

יהיה עליך לבצע בדיקות דם לפני תחילת הטיפול על מנת לבדוק שאתה יכול ליטול מייבנקלאד. הרופא יבצע בדיקות דם גם במהלך ולאחר הטיפול כדי לבדוק שאתה יכול להמשיך ליטול מייבנקלאד, ושאתה לא מפתח סיבוכים כלשהם כתוצאה מהטיפול.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אל תתחיל להשתמש במייבנקלאד יחד עם תרופות המחלישות את מערכת החיסון או מפחיתות את הייצור של תא דם על ידי מה העצם. זה כולל:

- ציקלוספורין, ציקלופוספאמיד ואזטאיופרין (המשמשים לדיכוי מערכת החיסון, למשל לאחר השתלת איברים)

- מתוטרקסאט (המשמש לטיפול במצבים כמו פסורייזיס או דלקת מפרקים שగורונית)

- קורטיקוסטרואידים ארוכי טווח (המשמשים להפחחת דלקת, למשל באסתמה). ניתן לשימוש בקורטיקוסטרואידים קצר טווח אם הומלץ על ידי הרופא.

אל תשמש במיאבנקלאד יחד עם תרופות אחרות לטרשת נפוצה, אלא אם הומלץ מפורשות על ידי הרופא.

אל **טיפול מייבנקלאד באותו זמן יחד עם תרופות אחרות**. השאר רוח של **פחות 3 שעות** בין נטילת מייבנקלאד ותרופות אחרות דרך הפה. מייבנקלאד מכיל hydroxypropylbetadex אשר עלול ליצור אינטראקציה עם תרופות אחרות בקיבה.

ספר לרופא אם אתה מטופל או טיפול בעבר עם:

- תרופות העוללות להשפעה על תא הדם (לדוגמת קארבאמאזפין, המשמש לטיפול באפילפסיה). יכול להיות שהרופא יctrar לבצע מעקב צמוד יותר.
- **סוגים מסוימים של חיסונים** (חיסונים חיים או חיים מוחלשים). אם חוסנת במהלך 4-6 השבועות האחרונים, יש לדחות את הטיפול במיאבנקלאד. אין לקבל חיסונים כאלו במהלך הטיפול במיאבנקלאד. על המערכת החיסונית להתואוש לפנוי שתוכל להתחסן, זה יבדק על ידי בדיקות דם.
- **דלקות נימודיפין, נימודיפין, צילוטאטזול או סולינידק** (המשמשים לטיפול לבב, לחץ דם גבוה, מחלות או דלקות בכלי הדם) או אלטרומבופאג (המשמש לטיפול במצבים הקשורים בדימומיים). הרופא יאמר לך מה לעשות אם אתה צריך לטפל תרופות אלו.
- **ריפאמפיצין** (המשמש לטיפול בסוג זיהום מסוימים), היפריקום (סנט ג'ונס וורט) (המשמש לטיפול בדיכאון) או קורטיקוסטרואידים (המשמשים לדיכוי דלקות). הרופא יאמר לך מה לעשות אם אתה צריך לטול תרופות אלו.

הירון והנקה
אין טיפול מייבנקלאד אם אתה בהירון או מנסה להיכנס להירון. זה חשוב מאחר שמייבנקלאד עלול להזיק לתינוק באופן חמוץ.

עליך לשימוש **באמצעי מניעהיעילים** על מנת להימנע מכניסה להירון במהלך הטיפול במיאבנקלאד ובמשך 6 חודשים לאחר נטילת המנה האחורה. אם את נכנסת להירון יותר מ-6 חודשים לאחר המנה האחורה בשנה הראשונה, לא צפוי סיכון בטיחותי אך לא תוכל לקבל טיפול עם מייבנקלאד בזמן ההירון.

גברים חיבטים לשימוש **באמצעי מנעהיעילים** על מנת למנוע כניסה להירון של בת הזוג, בזמן הטיפול עם מייבנקלאד ולמשך 6 חודשים לאחר המנה האחורה.
הרופא ייעץ לך בונגע **לאמצעי מנעה מתאים**.

אין טיפול מייבנקלאד אם את מניקה. אם הרופא סבור כי מייבנקלאד הוא חיוני עבורך, הרופא ייעץ לך להפסיק להניק במהלך הטיפול ולפחות שבוע לאחר המנה האחורה.

נהיגה ושימוש במכונות
מייבנקלאד לא צפוי להשפעה על יכולת הנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה 64 מ"ג סורביטול בכל TABLET.

3. כיצד תשמש בתרופה
תמיד יש לשימוש בתכשיר זה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק זאת עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בונגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל מפורט להלן.

מחזורי הטיפול

אתה תקבל מייבנקלאד בשני **מחזורי טיפול** במשך **שנתיים**.

כל מחזור טיפול כולל טיפול של **שני שבועות**, בהפרש של חודש בתחילת כל שנה טיפולית.

שבוע טיפול כולל **4 או 5 ימים** שבהם **תקבל 1 או 2 TABLETS** **כל יום** (ראה TABLE 1).

לדוגמא: אם אתה מתחילה את הטיפול באמצעות אפריל, עליך ליטול את התרופות כפי שמופיע להלן:

טבלה 1

שנה 2		שנה 1	
שבוע ראשון של הטיפול	שבוע שני של הטivol	שבוע ראשון של הטivol	שבוע שני של הטivol
טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע אפריל	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע מאי	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע אפריל	טבלייה 1 או 2 כל יום לפחות 4 או 5 ימים, אמצע מאי

לפני התחלת מחזור טיפול, הרופא יבצע בדיקות דם לבדוק שרמות הלימפוציטים (סוג של תא דם לבנים) הם בטוחה המקביל. אם זה אינו המצב, הטיפול ידחה.
ברגע שהשלמת שני מחזורי טיפול במשך שנתיים, הרופא ימשיך לעקב אחר מצב בריאותך במשך שנתיים נוספות, שבהן אתה לא צריך ליטול את התרפיה.

מינון

1. מספר הtablיות הנכון עבור כל שבוע טיפול יירשם לך, בהתאם על משקל גופך כפי שמוצג בטבלה 2.
2. אתה תצטרך אריזה אחת או יותר על מנת לספק את מספר הtablיות הנכון.
3. כאשר אתה מקבל את התרפיה, בדוק שיש לך את מספר הtablיות הנכון.
4. מצא את השורה שמתאימה למשקל גופך (בק"ג) בעמודה הימנית בטבלה 2, ולאחר מכן בדוק את מספר הtablיות שצריכות להיות באריזה/ות עבור שבוע הטיפול שאתה מתהיל.
5. אם מספר הtablיות באריזה/ות שקיבלת שונה מהמספר המוצג בטבלה עבור המשקל שלך, דבר עם הרופא.
6. שים לב שעבור טוויחי משקל מסוימים, מספר הtablיות עשוי להשתנות משנה שבוע טיפול אחד לשני.

לדוגמה: אם אתה שוקל 85 ק"ג ואתה עומד להתחילה את שבוע הטיפול הראשון, ינתנו לך 8tablיות.

טבלה 2

מספר הtablיות שעלייך ליטול				משקל שלך	
מחזור טיפול שנה 1		מחזור טיפול שנה 2			
שבוע טיפול 1	שבוע טיפול 2	שבוע טיפול 1	שבוע טיפול 2		
הרופא יאמר לך כמה מספר הtablיות שעלייך ליטול					
4	4	4	4	40 ק"ג עד פחות מ-50 ק"ג	
5	5	5	5	50 ק"ג עד פחות מ-60 ק"ג	
6	6	6	6	60 ק"ג עד פחות מ-70 ק"ג	
7	7	7	7	70 ק"ג עד פחות מ-80 ק"ג	
7	8	7	8	80 ק"ג עד פחות מ-90 ק"ג	
8	9	8	9	90 ק"ג עד פחות מ-100 ק"ג	
9	10	9	10	100 ק"ג עד פחות מ-110 ק"ג	
10	10	10	10	110 ק"ג ומעלה	

אין לעבור על המונה המומלצת.

כיצד ליטול את התרפיה

יש ליטול את הטבליה/ות בערך באותו שעה בכל יום. יש לבלווט אותן עם מים, בלי ללעוס. אין צורך לקחת את הטבליות בזמן הארוחה. ניתן ליטול אותן עם הארוחות או בין הארוחות.

קרא את המדריך לנטילת טבליות מייבנקלאד 10 מ"ג בסוף עلون זה בנוגע לאופן הטיפול באריזות קשות פתיחה לילדים ואופן נטילת הטבליות הנמצאות באריזה.

חשיבות

- וודא כי ידיך יבשות לפני שאתה מרים את הטבליה/ות.
- דחוף את הטבליה/ות דרך הבליסטר ובלע מיד.
- אין להשאיר את הטבליה/ות חשופה/ות על משטחים, למשל על שולחן, ואין להתעסק עם הטבליות זמן ארוך מהדרוש.
- אם טבליה הושארה על משטח או אם טבליה נשברה וחלקים منها נפלו מהבליסטר, יש לשטוף את האזור ביסודות.
- יש לשטוף את ידיך ביסודות לאחר נטילת התרופה.
- אם אתה מאבד טבליה, הייעוץ ברופא.

משך הטיפול

בהתאם למספר הטבליות הכולל שנרשמו לך, עליך ליטול אותן במשך 4 או 5 ימים, בכל שבוע טיפול טבלה 3مرة ככמה טבליות (1 או 2 טבליות) עליך ליטול בכל יום. אם המינון היומי שלך הוא 2 טבליות, תול אונז באתו הזמן.

לדוגמה: אם עליך ליטול 8 טבליות, עליך לקחת **2 טבליות ביום 1, ביום 2, ביום 3, וטבליה אחת ביום 4 וביום 5.**

טבלה 3

מספר כולל של טבליות בכל שבוע טיפול	יום 1	יום 2	יום 3	יום 4	יום 5
4	1	1	1	1	0
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	2
7	1	1	1	2	2
8	1	1	2	2	2
9	1	2	2	2	2
10	2	2	2	2	2

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא מייד. הרופא יחליט אם עליך להפסיק את הטיפול או לא.

יש ניסיון מוגבל עם מינון יתר של מייבנקלאד. ידוע כי ככל שנוטלים יותר מהתרופה, מספר הלימפוציטים בגוף עלול לרדת, דבר שוביל לליימפופניה (ראה סעיף 4).

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעליל מתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול מייבנקלאד

אם שכחת מנה ונזכרת באותו היום שבו הייתה אמרור ליטול אותה	אם שכחת מנה ונזכרת רק ביום למועדת
אל תיטול את המנה שנשכח יחד עם המנה הבאה המתווכנתה. יש לחת את המנה שנשכח ביום שלモחרת ולהאריך את מספר הימים בשבוע הטיפול הנוכחי.	קח את המנה שנשכח באותו יום

לדוגמה: אם שכחת ליטול את המנה ביום 3 ולא נזכرت בכרע עד יום 4, יש לחת את המנה של יום 3 ביום 4, ולהאריך את מספר ימי הטיפול הכלול בשבוע הטיפול ביום אחד. אם שכחת 2 מנות עוקבות (למשל גם ביום 3 וגם ביום 4), יש לחת את המנות שנשכו בימיים הבאים, ולהאריך את שבוע הטיפול ביוםיים.

יש להתמיד בטיפול כפי שהמליץ הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שאתה לווי תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זוקן להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במיבנקלאד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשות תופעות הלואאי, יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

תופעות לוואי מסוימות עלולות להיות חמורות או להפוך לחמורות

לימפופניה ושלבתת חוגרת (עלולה להשפיע על יותר מ-1 מכל 10 מטופלים) תופעת הלואאי החשובה ביותר היא ירידת במספר תאי הדם הלבנים הנקראים למופ齊יטים (**לימפופניה**). תופעה זו שכיחה מאד ועלולה להיות חמורה. לימפופניה עלולה להגביר את הסיכון להידבקות בזיהומיים. זההום אשר נראה לעיתים קרובות עם מיבנקלאד הוא **שלבתת חוגרת**.

ספר לרופא מיד אם יש לך **טסמים של שלבתת חוגרת** כגון "פס" של כאב חמוץ ופריחה של שלפוחיות, בדרך כלל בעוד אחד של פלב הגוף העליון או הפנים. טסמים אחרים יכולים להיות כאב ראש, תחושת צריבה, עקצוץ, חסור תחושה או גרד בעור באזורי הפגיעה, תחושה כללית לא טוביה או חום בשלבים המוקדמים של הזיהום.

יהיה צריך לטפל בשלבתת החוגרת, ויתכן שהיא צריכה כורך בהפסקת הטיפול עם מיבנקלאד עד שהזיהום יחלוף.

בעיות כבד (תופעות לוואי לא שכיחות- עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 מטופלים):
ספר לרופא שלר באופן מיידי אם יש לך **טסמים**, **לדוגמה תחושת בחילה, הקאות, כאב בטן, עינייפות, אובדן תיאבון, עור או עיניים צהובות (צחבת)** או שtan כהה. יתכן שהיא צריכה למנוע מהטיפול באופן זמני או להפסיק את הטיפול במיבנקלאד.

תופעות לוואי אפשריות אחרות

תופעות לוואי שכיחות- עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 מטופלים:

- פצעי קור (הרופס אוראלי)
- פריחה
- נשירת שיער
- ירידת לבנים מסוימים (נויטרופילים)
- תגובה אלרגית, כולל גרד, סרפת, פריחה ונפיחות של השפטים, הלשון או הפנים

טיפול לווואי נדירה מאוד – עלולה להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 מטופלים:

- שחפת

אם הופעה טיפול לווואי, אם אחת מתופעות הלווואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לווואי

ניתן לדוח על תופעות לווואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לווואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקון לדיווח על תופעות לווואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. אורך לאחסן את התרכופה

- מנע הרעליה! תרכופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה.
- אין לגרום להקאה ללא הוואה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בתרכופה אחריך תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסון מתחת ל- 25°C . אחסון את התרכופה באזירה המקורית על מנת להגן מפני לחות.
- אין להשליך תרוכות למערכת הביוב או אשפה הביתה. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרוכות שאין בשימוש, זאת כדי לשמר על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכיל מייבנקלאד

נוסך על המרכיב הפעיל התרכופה מכילה גם:

hydroxypropylbetadex, sorbitol and magnesium stearate.

כיצד נראה מייבנקלאד ומה תוכן האזיות

טבליות מייבנקלאד הן לבנות, עגולות, קמורות משני צידיהן, "C" מוטבע על צידן האחד ו-"10" על הצד השני. כל אריזה מכילה 1, 4, 5, 6, 7 או 8 טבליות בבליסטר, חתומים בונרטיק קריטון הנמצא באזירת קרטון קשת פתוחה לילדים. יתכן שלא כל גודל האריזה ישוווקו.

שם בעל הרישום והיבואן: מרק סרונו בע"מ, רח' הקישון 18, יבנה 81220

שם הייצור וכתובתו: מרק אירופה V.V., אמסטרדם, הולנד


עלון זה נערך פברואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרכופה בפנקס התרכופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00 35306 78 159


לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרכופה מיועדת לבני שני המינים.

מדריך לנטילת טבליות מייבנקלאד 10 מ"ג


מייבנקלאד ארכז באריזת קרטון קשת פתיחה לילדים שנייתן לסגור אותה מחדש יש לשמור אותה הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים. ראה מטה מדריך בונגע לאופן הטיפול באריזה ואופן נטילת טבליות מייבנקלאד. ודא כי אתה יודע כמה טבליות יש באריזה. ראה הנחיות בעלון.




1. הcn כו מים וודא Ci ידך נקיות ויבשות לפני נטילת הטעביה/ות.




2. הרם את הקרטון כאשר ההנחיות פונות כלפי מעלה.




3. (1) פתח את הפהה בקצה השמאלי של הקרטון.
- (2) דחוף את הלשוניות המסומנות בצד' הקרטון בו-זמןית בעזרת האצבע המורה והאגודל, והשאר את הלשוניות לחוץות.
- (3) משור את המגש עד שהוא נוצר. **זהירות:** אל תסיר את המגש מהקרטון.



4. הוציא את העلون מהמגש. ודא כי קראת את כל העلون כולל המדריך לניטילת טבליות מייבנקלאד 10 מ"ג ושמור אותו במקום בטוח.




5. הרם את אריזת הבליסטר על ידי דחיפת האצבע דרך החור במגש. הנח את ידך מתחת לאריזת הבליסטר ודחוף טבליה 1 או 2 טבליות לתוך ידך, על פי המינון שנרשם לך.



6. בלע את הטבליות/ות עם מים. יש לבלוע את הטעבליות בשלמותן מבל' ללווע או לאפשר להן להתמוסס בפי'. יש להגביל את המגע עם העור. הימנע מגיעה באף, עיניים וחלקים אחרים בגוף.



7. שטוף את ידך ביסודות עם סבון ומים.



8. דחוף את המgas בחזרה לקרטון. אחסן מתחת ל- -25°C באריזה המקורית על מנת להגן מפני לחות. שמור את הטעבליות בבליסטר עד לנטיילת המנה הבאה. אין להוציא את הטעבליות מהבליסטר. אין לאחסן את הטעבליות במקל אחר.