

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

תרופה זו משוקת על פי מרשם רפואי בלבד

רוזובסטטין טבָע חַדְשָׁה 10 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 10 מ"ג (כרוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 10 mg (as rosuvastatin calcium)

רוזובסטטין טבָע חַדְשָׁה 5 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 5 מ"ג (כרוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 5 mg (as rosuvastatin calcium)

רוזובסטטין טבָע חַדְשָׁה 40 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 40 מ"ג (כרוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 40 mg (as rosuvastatin calcium)

רוזובסטטין טבָע חַדְשָׁה 20 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 20 מ"ג (כרוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 20 mg (as rosuvastatin calcium)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העalon עד סוף בטרם תשתחש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

רוזובסטטין טבָע חַדְשָׁה אִינּוֹ מִיעּוד לִילְדִים וּלְמַתְבָּגָרִים מֵתְחַת לְגַיל 18 שָׁנָה.

1. למה מיועדת התרופה?

רוזובסטטין טבָע חַדְשָׁה מִיעּוד לְטִיפּוֹל בְּמַבּוֹגִירִים:

- בהיפרcoleסטרולמייה ראשונית (מסוג II) כולל היפרcoleסטרולמייה משפחתית הטרוזיגוטית (מצבים בהם יש רמתコレsterol גבוהה בدم) או דיסליפידמייה מעורבת מסוג II (הפרעה ברמות השומנים השונות בדם). התרופה ניתנת כתוספת לדיאטה במצבים בהם התגובה לדיאטה ולטיפולים שאינם תרופתיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת.
- בהיפרcoleסטרולמייה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמתコレsterol גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם (כגון סילוק שומנים - LDL apheresis) או במקרים בהם טיפולים אלו אינם מתאימים.

קבוצה תרפואיתית

HMG-CoA reductase inhibitor.

רוזובסטטין טבָע חדש שירק בקבוצת תרופות הנקראט סטטינים, הפועלת להורדת רמת השומנים בדם, הנפוץ ביוטר נקראコレsterol. ישנו מספר סוגコレsterol בדם, "コレsterol רע"- "コレsterol טוב". רוזובסטטין טבָע חדש פועל ומסייע לגוף לחסום את "צורה ה"コレsterol הרע" ובfineio מהגוף ומסייע להעלות את רמות ה"コレsterol הטוב".

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- את בהירין או מניקה. אם נכנסת להירין תוך כדי שימוש ברוזובסטטין טבָע חדש **הפסיקי ליטול רוזובסטטין**.
- טבָע חדש מידית וידע את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להירין על-ידי שימוש באמצעות מנעה מתאים.
- יש לך מחלת כבד.
- אתה סובל מבעיות כליה חמורות.
- אתה סובל ממיוחשים או מכabi שיררים חזירים או בלתי מוסברים.
- אתה נוטל שילוב תרופתי של סופוסוביר/ולפטסובייר/וקסילפריביר (המשמש לטיפול בziehom ויראלי של הכלב)

הנקרא הפטיטי C).

- אתה נוטל ציקלוספורין (למשל לאחר השתלת איברים).

•

18.

- أنا פנה לרופא שלך אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק).

בנוסף, אין להשתמש בטבליות של רוזובסטטן טבע חדש 40 מ"ג (המינון הגבואה ביותר) אם:

- אתה סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במקרה יש ספק, אני פנה לרופא).
 - אתה סובל מבעיות בעלות בלוטת התריס (תירואיד).
 - אתה סובל ממיחושים או מכבים חזורים או בלתי מוסברים בשירים, אם אתה בעל עבר אישי או משפחתי של בעיות בשירים או אם סבלת בעבר מבעיות בשירים בעקבות תרופות אחרות להורדתコレסטרול.
 - אתה צריך כמותית גדולה של אלכוהול באופן קבוע.
 - אתה מצוי אסיאטי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, יאטנמי, יפני).
 - אתה נוטל תרופות נוספות להורדתコレסטרול הנקראות פיברטים.
- אני פנה לרופא אם אחד מאלו נוגע לך (או אם יש לך ספק).

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בתפקיד הכבד, הכלאות או בלוטת התריס.

- אתה סובל מליקוי בתפקיד הכבד, הכלאות או בלוטת התריס.
- אתה סובל ממיחושים או מכבים חזרים או בלתי מוסברים בשירים או אם אתה סבלת או בן משפחתי סבל בעבר מבעיות בשירים או שיש לך עבר של בעיות בשירים בעקבות תרופות אחרות להורדתコレסטרול. יש לידע מיד את הרופא המטפל אם מופיעים ממיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשירים, במיוחד אם הם מלאים בהרגשה כללית לא טוביה או חום. יש לידע את הרופא גם במחלה ואתה סובל מחולשת שרירים מתחמכת.
- אתה סובל או סבלת בעבר ממאסתניה (מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית הכוללת במקרים מסוימים חולשה בשירים המעורבים בשימה) או ממאסתניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין), לאחר וسطיניות לעיתים עלולים להחריף את המחלת או לגרום להופעתה (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").
- אם אי פעם פיתחת פריחה חמורה בעור או קילוף בעור, שלפוחיות ו/או פצעים בפה לאחר נטילת רוזובסטטן או תרופות הקשורות אחרות.
- אתה צריך כמותית גבוהה של אלכוהול באופן קבוע.
- אתה נוטל תרופות נוספות לטיפול בהורדתコレסטרול הנקראות פיברטים, אני קרא לעון זה בעין אף אם השתמשת בתרופות להורדתコレסטרול בעבר.
- אתה נוטל תרופות המיעדרות לטיפול בזיהום של נגיף הכלש החיסוני האנושי (VH) (כגון: ריטונביר עם לופינביר ו/או אטזאנאבר). ראה בהמשך סעיף 2 - "תגובות בין-תרופתיות".
- אתה נוטל או נטלה אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית-ב-7 הימים האחרון (לטיפול בזיהום חיידקי בבלעה או בהזרקה). ההילוב של חומצה פוסידית רוזובסטטן עלול לגרום לביעות שריר חמורות (רבדומילוזיס). ראה בהמשך סעיף 2 - "תגובות בין-תרופתיות".
- אתה מעל לגיל 70 (הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטן טבע חדש המתאים לך).
- אתה סובל מכשל נשימתי חמוץ.
- אתה מצוי אסיאטי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, יאטנמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטן טבע חדש המתאים לך.

אם אחד המרכיבים הרשומים מעלה מתייחס אליך (או אם אין לך בטוח):

- אל תיטול רוזובסטטן טבע חדש 40 מ"ג (המינון הגבואה ביותר) ונבדק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש בכל מינון של רוזובסטטן טבע חדש.

תגובהות עור חמורות כולל תסמנות סטיבנס-ג'ונסון ותסמנות התגובה התורופתית עם אודינופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) דוחו בהקשר לטיפול ברוזובסטטן. הפסיק להשתמש ברוזובסטטן טבע חדש ואני לעזרה רפואי מידית אם אתה מבחין באחד מהתסמינים המתוארים בסעיף 4 - "תופעות לוואי".

במספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, ניתן להזחות השפעה זו בבדיקה דם פשוטה הבודקת עליה בرمמות אנדמי הכבד. אך, הרופא בדרך כלל יפנה אותך לבצע בדיקות דם של תפקיד כבד, לפני ובמהלך הטיפול בתרופה.

בזמן שאתה מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אם יש לך סוכרת או אם אתה בסיכון לפתח סוכרת. יתכן שאתה בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבואה של סוכרים וושומנים בדם, עודף משקל ולחץ דם גבוה.

**ילדיים ומתבגרים
רוזובסטטין טבע חדש אינו מיועד לילדיים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.**

תగובות ביון-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (בשימוש לאחר השתלת איברים)
- וורפרין, קלופידוגרל או טיקגרולור (או כל תרופה אחרת לדילול דם)
- פיבראטינים (כגון גמפיברזיל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להוורدة כולסטרול (כגון אזטימיב)
- תרופה לטיפול בקלקל קיבת (משמשות כסוגר חומצה בקיבת)
- אריתרומיצין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה בהמשך ועליל בסעיף "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")
- גלולות למניעת הירין
- רגורפניב (טיפול בסרטן)
- דרולוטומיד (טיפול בסרטן)
- קפומטיניב (טיפול בסרטן)
- טיפול הורמוני תחלפי
- פוסטומטיניב (טיפול במצב של ספירת טסיות נמוכה)
- פבקוסוציאט (טיפול ולמנוע של רמות גבוהות של חומצת שתן בدم)
- טריפלונומיד (טיפול בטרשת נפוצה)
- תרופה לטיפול בדיזוזמים וראלים, כולל בזיהום של נגיף הכלש החיסוני (VH) או בדלקת כבד (הפטיטיס) מסוג C, בלבד או בשילוב עם (ראה סעיף "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"): ריטוניביר, לופיניביר, אטאזאנאביר, סופיסובביר, וקסילפרבריר, אומבטספיר, פריטופרביר, דסבובייר, גראזופרביר, אלבסביר, גלקפרבריר, פיברנטסיבור.

ההשפעה של תרופות אלו עלולה להשנות כתוצאה שימושה בו זמןית עם רוזובסטטין טבע חדש או שהן עלולות לשנות את ההשפעה של רוזובסטטין טבע חדש.

חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה) – אם עלייך לטבול חומצה פוסידית במתן פומי לטיפול בזיהום חידקי, יהיה עלייך להפסיק באופן זמני את הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש. הרופא יאמר לך מתי ניתן להמשיך לטיפול רוזובסטטין טבע חדש. נטילת רוזובסטטין עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעתים נדירות לחולשה, לריגשות או לכאב בשירים (רבdomיוולזיס). ראה מידע נוספת לגבי רבdomיוולזיס בסעיף 4 – "תופעות לוואי".

**שימוש בתרופה ומazon
ניתן לטיפול רוזובסטטין טבע חדש עם או ללא אוכל.**

הירין והנקה
אין לטיפול רוזובסטטין טבע חדש אם אתה בהירין או מניקה. אם נכנסת להירין תוך כדי שימוש ברוזובסטטין טבע חדש הפסיכיקו לטיפול רוזובסטטין טבע חדש מיידית וידעו את הרופא שלך. יש להימנע מכינסה להירין בתקופת הטיפול בתרופה זו על-ידי שימוש באמצעות מנעה מתאימים. היועצץ ברופא או ברוקח שלך לפני נטילת תרופה כלשהי.

נהיגה ושימוש במכונות
הרבייה המטופלים יכולים לנוהג ברכב ולתפעל מכונות בזמן השימוש ברוזובסטטין טבע חדש – התרופה לא תפגום בכשיורותם לבצע פעולות אלו. אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחותה תוך כדי השימוש בתרופה. במידה ואתת חש סחרחותה עלייך לפנות לרופא לפני הפעלת מכונות או נהיגה ברכב.

מידע חשוב על חלק מהמרכבים של התרופה
התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך סבירות לסתורים מסוימים (לקטוז או סוכר חלב) היוויעץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.
התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל טבלייה ועל כן נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם איןך בטוח בנוגע

- למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- המינון המקובל בדרך כלל הוא:** הטיפול עם רוזובסטטין טבע חדש יתחל עם **טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג** פעמיים ביום, גם אם נטלה לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבדיקה במינון ההתחלתית תהיה מלאה ב:
- רמת הcolesterol.
 - רמת הסיכון שתלקה בהתקף לב או בשbez מוח.
 - מידת הסבירות כי תחיה רגיש יותר לתופעות לוואי אפשריות.
- אנא היועץ ברופא או ברוקח שילך לגבי המתאים ביותר עבורך.

- "תכן שהרופא יחליט לחתול לך את המינון הנמור ביותר - 5 מ"ג אם:
- אתה ממוצא אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
 - אתה בן **70 ומעלה**.
 - אתה סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה.
 - אתה בסיכון לסבול מכאבי שרירים (מיופתיה).

העלאת המינון ומינון יומי מרבי

"תכן שהרופא יחליט להעלות את המינון שאתה נוטל על מנת שיתאים עבורך. במידה והתחלה עם מינון של רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג, יתכן שהרופא יכפיל את המינון לרוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג, לאחר מכן 10-20 מ"ג ובמידת הצורך עלה ל-40 מ"ג. במידה והתחלה עם מינון של רוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג, יתכן שהרופא יכפיל את המינון ל-20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך עלה ל-40 מ"ג. יהיה מרווה של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.

המינון המקסימלי היומי הינו 40 מ"ג. הוא ניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד שלコレsterol וסביר גובה ללקות בהתקף לב או בשbez מוח, כאשר רמות הcolesterol אין יורדות מספיק עם 20 מ"ג.
אין לעבור על המנה המומלצת.

בדיקותコレsterol סדיות

יש לבדוק את רמות הcolesterol באופן קבוע, על מנת לוודא שהcolesterol שלך הגיע לרמה הרצוי ושרמה זו נשמרת. "תכן שהרופא יחליט להעלות את המינון על מנת שתיתול את כמות התרופה שמתאימה לך.

אופן השימוש

ניתן ליטול את התרופה בכל שעות היום עם או בלי אוכל. מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בשעה קבועה כך לאזכיר ללקחת את התרופה.

יש לבלווע התרופות עם מים.
אם נוטלים סוטרי חומצה מסווג מלחי אלומינום או מגנזיום, יש ליטול את רוזובסטטין טבע חדש לפחות שעתיים לפני נטילה של סוטרי חומצה מסווג מלחי אלומינום/מגןזיום.
ניתן לחצות את טבליות רוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג, 20 מ"ג ו-40 מ"ג בקו החציה.
אין לחצות את הטבליה של רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג.
אין מידע לגבי ריסוק וכתישת הטבליה.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה שנשכח וליטול את המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על מנת שנשכח.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הcolesterol שלך עשויות לעלות שוב.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית וה mana בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זוקן להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע ל שימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברוזובסטטין טבע חדש עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

יש להפסיק את הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש ולפנות מיד לקבالت טיפול רפואי אם:

- יש לך אחת מתכונות רגשות הרוֹר (אלרגיה) הבאות:
 - קושי נשימתך עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון /או בגרון.
 - נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון /או בגרון, שעשוים לגרום לך כאב בבלעה.
 - גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
 - כתמים אדמדמים שאינם מוגבהים, דמווי מטרה או מעגליים על הגוף, לעיתים עם שלפוחיות במרכז, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף או באזור המין ובעיניים. לרופחות עור חמורות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמיינים דמווי שפעת (تسمונת סטיבנס-ג'ונסון).
 - פריחה מפותחת, חום גבוה ובלוטות למפה מוגדלות (تسمונת DRESS או תסמונת רגשות הרוֹר לטרופה).
- בנוסף, יש להפסיק את הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש ולפנות מיד לרופא אם:
- יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא רגילים, אשר נמשכים זמן רב יותר מהצפוי. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מצומצם של מטופלים חוות השפעה לא נרימה בשירים, ועתים נדירות תופעה זו הופכת לנזק לשירים שעלול לסכן חיים והידוע רבדומיאוליזיס (rhabdomyolysis).
 - יש לך קרע בשיר.
 - יש לך **تسمונת דמוית זאבת** (ome-like disease syndrome) (eosinophilia-myalgia syndrome), כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תא הדם).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 100 משתמשים):

- כאבי ראש.
 - כאבי בטן.
 - עצירות.
 - הרגש חוליה.
 - כאב שרירים.
 - חולשה.
 - סחרחות.
- עליה בכמות החולבן בשתן - בדרך כלל חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התרופה (רק עבור רוזובסטטין טבע חדש 40 מ"ג).
- סוכרת. הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם יש לך רמות גבוהות של שומנים ווסוכר בדם, עודף משקל ולהזדמנות גבוהה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופה טיפול.

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-1 מטופלים מתוך 1,000 משתמשים):

- פריחה בעור.
 - גרד או תגובות עוריות אחרות.
- עליה בכמות החולבן בשתן - בדרך כלל חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התרופה (רק עבור רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג, 10 מ"ג ו- 20 מ"ג).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-10 מטופלים מתוך 10,000 משתמשים):

- תגובה אלרגית חמורה שסימנה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון /או הגרון, קושי בבלעה ובൺימה, גרד חריף בעור (עם שלפוחיות מורמות). אם אתה חושב שיש לך תגובה אלרגית, הפסיק לחתת רוזובסטטין טבע חדש ונונה מיד לעזרה רפואי.
- פגעה בשירם במוגרים - **ליתר ביטחון, הפסיק לחתת רוזובסטטין טבע חדש ודבר עם הרופא שלך מיד אם אתה חש במיחושים או בכABI שרירים לא רגילים הנמשכים יותר זמן מהצפוי.** כאב בטן חמוץ (דלקת בלבלב).
- עליה באנדמיים כבד בדם.
- דימום או נתיחה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.
- **تسمונת דמוית זאבת** (ome-like disease syndrome) (eosinophilia-myalgia syndrome), כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תא הדם).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות המופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים):

- צהבת (הצבתה העור והעיניים).
- דלקת בכבד (הפטיטיס).
- עקבות דם בשtan.
- נזק לעצבים בזרועות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול).
- כאבי פרקים.
- אובדן זיכרון.
- הגדלת החזה בגברים (gynecomastia).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- שלשול.
 - שיעול.
 - קוצר נשימה.
 - בקתק (נפיחות עקב הצטברות נוזלים).
 - הפרעה בשינה, כולל נדודי שינה וסיגוטים.
 - בעיות בתפקוד המין.
 - דיכאון.
 - בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד /או קוצר נשימה או חום.
 - פצעיה בגיד.
 - חולשת שרירים קבועה.
 - מיאסטניה גרכיס (Myasthenia gravis), מחלת הגורמת לחולשת שרירים כללית הכוללת במקרים מסוימים חולשה בשירים המעורבים (בנשימה).
 - מיאסטניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה בשירה העין).
- היוועץ ברופא שלך אם אתה חווה חולשה בזרועות או ברגליים אשר מחמירה לאחר תקופות של פעילות, ראייה כפולה או שמיטה של העפעפים, קושי בבליעה או קוצר נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה לעלן, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, Hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, Sodium hydrogen carbonate, hypromellose, titanium dioxide (E171), Triacetin.

רוזובסטטין טבעי חדש 5 מ"ג:

Iron oxide yellow (E172)

רוזובסטין טבָע חֲדֵש 10 מ"ג, 20 מ"ג ו-40 מ"ג:

Iron oxide red (E172)

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 5 מ"ג: טבלייה מצופה עגולה וקמורה משני צדדייה בצבע צהוב, הצד אחד של הטבלייה מוטבע "5" והצד השני חלק.
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 10 מ"ג: טבלייה מצופה עגולה וקמורה משני צדדייה בצבע ורוד, הצד אחד של הטבלייה יש קו חציה ובצד השני מוטבע "10".
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 20 מ"ג: טבלייה מצופה עגולה וקמורה משני צדדייה בצבע ורוד, הצד אחד של הטבלייה יש קו חציה ובצד השני מוטבע "20".
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 40 מ"ג: טבלייה מצופה בצורת אליפסה וקמורה משני צדדייה בצבע ורוד, הצד אחד של הטבלייה יש קו חציה ובצד השני מוטבע "40".

האריזה מכילה 30 טבליות באריזת בליסטר.

שם בעל הרישום והיצן וכתוותו:
טבָע יִשְׂרָאֵל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

מספר רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 5 מ"ג: 175.43.36936
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 10 מ"ג: 175.44.36937
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 20 מ"ג: 175.45.36938
רוזובסטין טבָע חֲדֵש 40 מ"ג: 175.46.36939

העלון נערך בפברואר 2024.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.