

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ליסדקסא אס. קיי. 20 מ"ג כמוסות

ליסדקסא אס. קיי. 30 מ"ג כמוסות

ליסדקסא אס. קיי. 40 מ"ג כמוסות

ליסדקסא אס. קיי. 50 מ"ג כמוסות

ליסדקסא אס. קיי. 60 מ"ג כמוסות

ליסדקסא אס. קיי. 70 מ"ג כמוסות

החומר הפעיל וכמותו:

כל כמוסה של ליסדקסא אס. קיי. 20 מכילה:

ליסדקסאמפטמין דימסילט - 20 מ"ג 20 mg Lisdexamfetamine Dimesylate

כל כמוסה של ליסדקסא אס. קיי. 30 מכילה:

ליסדקסאמפטמין דימסילט - 30 מ"ג 30 mg Lisdexamfetamine Dimesylate

כל כמוסה של ליסדקסא אס. קיי. 40 מכילה:

ליסדקסאמפטמין דימסילט - 40 מ"ג 40 mg Lisdexamfetamine Dimesylate

כל כמוסה של ליסדקסא אס. קיי. 50 מכילה:

ליסדקסאמפטמין דימסילט - 50 מ"ג 50 mg Lisdexamfetamine Dimesylate

כל כמוסה של ליסדקסא אס. קיי. 60 מכילה:

ליסדקסאמפטמין דימסילט - 60 מ"ג 60 mg Lisdexamfetamine Dimesylate

כל כמוסה של ליסדקסא אס. קיי. 70 מכילה:

ליסדקסאמפטמין דימסילט - 70 מ"ג 70 mg Lisdexamfetamine Dimesylate

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוסף". **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 עם ADHD או מטופלים מתחת לגיל 18 עם הפרעת אכילה כפייתית - BED.

1. למה מיועדת התרופה?

ליסדקסא אס. קיי. מיועד לטיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD).

ליסדקסא אס. קיי. יכול לשפר את הקשב, את הריכוז, ולהקטין אימפולסיביות והיפראקטיביות במטופלים ADHD.

עם ליסדקסא אס. קיי. מיועד לטיפול בהפרעת אכילה כפייתית מתונה עד חמורה. עשוי להפחית את מספר ימי האכילה הכפייתיים במטופלי BED.

ליסדקסא אס. קיי. אינו מיועד לירידה במשקל. לא ידוע אם ליסדקסא אס. קיי. בטוח ויעיל לטיפול בהשמנת יתר.
ליסדקסא אס. קיי. מיועד רק למטופלים מעל גיל 6 עם ADHD ומטופלים מעל גיל 18 עם BED.

קבוצה תרפויטית – מעורר מערכת העצבים המרכזית.
אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של ליסדקסא אס. קיי. בילדים מתחת לגיל 6, לטיפול ב ADHD או מטופלים עם BED מתחת לגיל 18.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה או ילדך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (Lisdexamfetamine dimesylate) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- אתה או ילדך נוטל או נטלת ב-14 הימים האחרונים תכשיר נגד דיכאון מקבוצת מדכאי מונואמינו אוקסידז (MAOI).
- אתה או ילדך רגיש, אלרגי או הייתה לך/לו תגובה אלרגית לתכשירים אחרים המעוררים את מערכת העצבים המרכזית.
- טופלת באנטיביוטיקה לינזוליד או במתילן כחול תוך ורידי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- **ליסדקסא אס. קיי.** הינו תכשיר המוגדר כסם כי הוא עלול לגרום לתלות או עלולים לעשות בו שימוש לרעה. יש לשמור את התכשיר במקום בטוח למניעת שימוש לרעה.
- שמור על ליסדקסא אס. קיי. במקום בטוח כדי להגן עליו מפני גניבה. מכירה או מסירת ליסדקסא אס. קיי. לאחרים עלולה לגרום לנזק ונוגדת את החוק.
- הודע לרופא המטפל אם אתה או ילדך השתמשתם לרעה או פיתחתם תלות באלכוהול, תכשירי מרשם או תרופות לא חוקיות.
- ליסדקסא אס. קיי. הינו תכשיר מעורר, שעלול לגרום לבעיות הבאות בחלק מהמשתמשים:

א. בעיות הקשורות ללב:

- מוות פתאומי במטופלים אשר סובלים מבעיות לב, מום בלב.
- מוות פתאומי, שבץ והתקף לב במבוגרים.
- עליה בלחץ דם וקצב לב.
- עליך ליידע את הרופא אם לך או לילדך יש בעיות לב, מום בלב, לחץ דם גבוה או היסטוריה משפחתית לאחת הבעיות הללו.
- לפני תחילת השימוש בליסדקסא אס. קיי., הרופא צריך לבדוק אותך או ילדך לבעיות לב. במהלך הטיפול עם ליסדקסא אס. קיי., על הרופא לבדוק באופן קבוע לך או לילדך לחץ דם וקצב לב. במהלך הטיפול עם ליסדקסא אס. קיי., יש ליידע את הרופא מיידית, אם אתה או ילדך מראים סימנים של בעיות לב כמו כאב בחזה, קוצר נשימה או התעלפות.
- ב. בעיות נפשיות (פסיכיאטריות) שכוללות:
 - הפרעות התנהגות חדשות או החמרה בהפרעות קיימות והפרעות חשיבה
 - הופעה או החמרה של מחלה דו קוטבית
 - תסמינים פסיכוטטיים חדשים
 - שמיעת קולות
 - להאמין לדברים שאינם נכונים
 - להיות חשדן תסמיני מאניה חדשים
 - עליך לדווח לרופא לגבי כל בעיה נפשית שלך או של ילדך או רקע משפחתי של התאבדות. מחלות דו קוטביות (ביפולריות) או דיכאון.
 - יש להתקשר מייד אל הרופא המטפל, אם במהלך הטיפול בליסדקסא אס. קיי. יש לך או לילדך תסמינים נפשיים
 - חדשים או החמרה בתסמינים הנפשיים הקיימים או בעיות כגון:
 - לראות או לשמוע דברים שאינם אמיתיים
 - להאמין לדברים שאינם אמיתיים
 - להיות חשדן.
 - ג. בעיות בזרימת הדם באצבעות הידיים והרגליים (מחלת כלי דם היקפיים הכוללת את תסמונת ריינו):
 - עלולה להיות תחושה של קרירות, כאב, חוסר תחושה באצבעות ידיים ורגליים
 - אצבעות ידיים ורגליים יכולות לשנות צבע מחיוור לכחול ולאדום

- יש ליידע את הרופא המטפל אם אתה או ילדך סובלים מחוסר תחושה, כאב, שינוי בצבע העור או רגישות לטמפרטורה באצבעות ידיים ורגליים.
- יש לפנות אל הרופא מייד אם לך או אצל ילדך מופיעים בזמן לקיחת ליסדקסא אס. קיי, סימנים של פצעים בלתי מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים.

לפני הטיפול בליסדקסא אס. קיי. ספר לרופא או לרוקח אם:

- יש לך, לילדך או במשפחה היסטוריה של:
 - בעיות לב, מומי לב, מחלת לב, לחץ דם גבוה
 - בעיות נפשיות כגון פסיכוזה, מאניה, מחלה דו-קוטבית או דיכאון - בעיות בזרימת הדם באצבעות הידיים והרגליים
 - בעיות בכליות. הרופא עשוי להפחית את המינון
 - תנועות או צלילים חוזרים (טיקים) או תסמונת טורט
- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
 - מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין (SSRI)
 - מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין ונוראפינפרין (SNRIs)
 - תרופות המשמשות לטיפול בכאבי ראש מיגרנוטיים, הנקראות טריפטנים
 - ליתיום
 - פנטניל
 - טרמדול
 - טריפטופן
 - בוספירון
 - סנט ג'ון וורט
 - תכשירים נגד דיכאון כולל ממשפחת מעכבי מונו אמינ אוקסידאז (MAOI) לדוגמא: סלג'לין, איזוקרבוקזיד, פאנלזין, טרניליספרומין (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם ")
 - ויטמין סי (חומצה אסקורבית)
 - סודה לשתייה (ביקרבוונט)
 - חומרים המעלים את בסיסיות השתן כגון אצטאזולאמיד, טיאזידים
 - חומרים המעלים את חומציות השתן כגון אמוניום כלוריד, נטרן חומצה פוספט, מלחי מתנאמין
- תרופות נגד דיכאון טריצקליות כגון דסיפראמין, פרוטריפטלין

ליסדקסא אס. קיי. יכול להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות והן יכולות להשפיע עליו, מה שיכול לגרום לתופעות לוואי חמורות. דע אילו תרופות אתה לוקח. יש לשמור את הרשימה שלהן כדי להראות לרופא ולרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את הכמוסה עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

לא מומלץ לשתות משקאות אלכוהוליים בזמן הטיפול בליסדקסא אס. קיי. אלכוהול עלול להחמיר תופעות לוואי המופיעות בזמן הטיפול בליסדקסא אס. קיי.

היריון והנקה

לא מומלץ להניק בזמן הטיפול בליסדקסא אס. קיי. אם הינך בהיריון או עשויה להיות בהיריון, יש להיוועץ ברופא לפני

התחלת השימוש בתרופה. אם הינך מניקה או מתכננת להניק, התרופה עוברת לחלב אם. יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונות

אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה עד שאתה יודע כיצד ליסדקסא אס. קיי. משפיע עליך.

בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול ייתכן ותופנה גם לבדיקות דם, בבדיקות לב ולחץ דם שוטפות. יש לבדוק לעיתים קרובות בילדים גובה ומשקל בזמן הטיפול בליסדקסא אס. קיי. הטיפול בליסדקסא אס. קיי. עלול להיפסק במידה שילדך לא גדל או מעלה במשקל. הרופא עשוי להפסיק את הטיפול בליסדקסא אס.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח לגבי אופן השימוש.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

יש ליטול מנה אחת של ליסדקסא אס. קיי. כל בוקר.

נטילת כמוסות ליסדקסא אס. קיי. :

- ניתן לבלוע את כמוסות הליסדקסא אס. קיי. בשלמותן
- אם יש לך קושי בבליעת הכמוסה, ניתן לפתוח אותה:
 - יש לערבב את האבקה עם יוגורט, מים או מיץ תפוזים.
 - השתמש בכל אבקת ליסדקסא אס. קיי. מהכמוסה כדי לקבל את מלוא התרופה.
 - השתמש בכפית על מנת להפריד את האבקה הדבוקה.
 - ערבב את האבקה עם מים/ יוגורט/ מיץ תפוזים עד שהם מעורבבים לחלוטין.
 - יש לשתות את כל תכולת הכוס מייד אחרי הערבוב. **אין לשמור את היוגורט, המים או מיץ התפוזים.**
 - סביר שאחרי ששתית את התרופה יישאר ציפוי דק על פנים הכוס.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. אל תיקח מנה כפולה יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בליסדקסא אס. קיי. עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מייד לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות:

- האטה בגדילה (גובה ומשקל) בילדים
- הפרעות בסיקולציה בכלי הדם באצבעות ובהונות כפות הרגליים (מחלת כלי דם היקפיים, לרבות מחלת רנו). התסמינים עלולים לכלול:
 - תחושת נימול, קור, כאב באצבעות או בהונות כף הרגל
 - שינוי צבע מחיוור לכחול, או אדום באצבעות או בהונות כף הרגל
 - ספר לרופא שלך אם לך או לילדך יש חוסר תחושה, כאב, שינוי בצבע העור או רגישות לטמפרטורה באצבעות או בהונות. התקשר לרופא שלך מייד אם יש לך או לילדך סימנים של פצעים בלתי מוסברים המופיעים באצבעות או בהונות במהלך הטיפול בליסדקסא אס. קיי.
- טיקים חדשים או החמרה בטיקים או בתסמונת טורט. ספר לרופא שלך אם אתה או ילדך סובלים מטיקים חדשים או החמרה בטיקים או מהחמרה של תסמונת טורט במהלך הטיפול בליסדקסא אס. קיי.
- תסמונת סרטונין - תסמונת שעלולה לסכן חיים ועשויה להתרחש כאשר ליסדקסא אס. קיי. נלקחת יחד עם תרופות מסוימות. הפסק ליטול ליסדקסא אס. קיי. והתקשר לרופא או פנה מייד לחדר המיון הקרוב אם אתה או ילדך מפתחים אחד מהתסמינים הבאים של תסמונת הסרטונין:
 - אי שקט
 - דופק מהיר
 - הסמקה

- פרכוסים
- תרדמת
- הזעה
- אובדן קואורדינציה
- בלבול
- סחרחורת
- רעד, שרירים נוקשים או עיוות שרירים
- הזיות (לראות או לשמוע דברים שאינם אמיתיים)
- שינויים בלחץ הדם
- טמפרטורת גוף גבוהה (היפרתרמיה)
- בחילות, הקאות, שלשולים

- **תופעות לוואי שכיחות מאוד** בילדים בגילאי 6 עד 17 ומבוגרים עם ADHD (תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מעשרה):
 - אובדן תיאבון (אנורקסיה)
 - ירידה בתאבון
 - שלשולים
 - חרדה
 - ירידה במשקל
 - סחרחורות
 - בחילה
 - הקאות
 - הפרעות שינה
 - יובש בפה
 - עצבנות
 - כאבי בטן עליונה
 - כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות של ליסדקסא אס. קיי. במטופלים עם ADHD, (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- חרדה
- בחילה
- הפחתת משקל
- שלשולים
- סחרחורת
- הקאות
- רעד
- פריחה
- שינוי במצב רוח
- חום
- ישנוניות או עייפות
- הרגשת עצבנות, חוסר מנוחה
- עלייה בלחץ דם
- הזעת יתר
- לא ניתן לקבל או לשמור על זקפה
- ירידה בחשק המיני
- פעלתנות יתר
- קצב לב מהיר
- קשיי נשימה
- טיקים
- אנורקסיה
- יובש בפה
- דפיקות לב חזקות
- תוצאות ECG שאינן תקינות המראות ventricular hypertrophy
- היפראקטיביות פסיכומוטורית

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסדקסא אס. קיי. במטופלים עם ADHD, (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1000):

- דיבור יתר
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי שכיחות מאוד של ליסדקסא אס. קיי. במטופלים עם BED, (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):

- יובש בפה
- נדודי שינה

תופעות לוואי שכיחות של ליסדקסא אס. קיי. במטופלים עם BED, (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10):

- ירידה בתאבון
- עליה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הזעת יתר
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיין
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עליונה
- אנרגיה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסדקסא אס. קיי. במטופלים עם BED, (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1000):

- עליה בקצב לב
- כאב ראש
- כאב בטן עליונה
- קשיי נשימה
- פריחה
- נדודי שינה
- תחושת רגישות יתר
- עצבנות
- חרדה

תופעות לוואי נוספות בשכיחות לא ידועה:

- דפיקות לב חזקות, קרדיומיפתיה
- מידריאזיס - הרחבת אישוני העיניים
- דיפלופיה - ראייה כפולה
- ראייה מטושטשת או קושי בלהתמקד בעצמים

- דלקת כבד אוזונופילית - פגיעה בכבד ממקור אלרגי עם אפשרות לצהבת בעיניים ו/או העור
- תגובה אלרגית חמורה המאפיינת בירידה חדה בלחץ דם, קושי בנשימה, סרפדת/גירוד
- רגישות יתר
- תנועות לא רצונית בלתי מבוקרות
- תחושת טעם רע בפה
- טיקים
- חריקת שיניים
- דיכאון
- גרד עור כפייתי
- נשירת שיער
- תוקפנות
- תסמונת סטיבן ג'ונסון
- כאבים בחזה
- אנגיודמה
- חרלת (אורטיקריה)
- פרכוסים
- שינוי בחשק המיני
- זקפה תכופה או מתמשכת
- עצירות
- תמס שריר (רבדומיוליזיס)
- איסכמיה במעיים

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
 - הגן על ליסדקסא אס. קיי. מאור.
 - אחסן באריזה המקורית.
- אין לזרוק תרופות כלשהן דרך שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם –
 Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate
 – הרכב הכמוסה הריקה –
 gelatin, purified water, titanium dioxide
 ליסדקסא אס. קיי. 30 מ"ג: FD&C Yellow #10, FD&C Red #3
 ליסדקסא אס. קיי. 40 מ"ג: FD&C Red #40, FD&C Blue #1
 ליסדקסא אס. קיי. 50 מ"ג: FD&C Blue #1
 ליסדקסא אס. קיי. 60 מ"ג: FD&C Red #3, FD&C Blue #1
 ליסדקסא אס. קיי. 70 מ"ג: FD&C Blue #1, FD&C Yellow #10, FD&C Red #3

הרכב הדין:

TekPrintTMSB-5002 Grey Ink1: Titanium Dioxide, Dehydrated Alcohol, Shellac, Butyl Alcohol, Isopropyl alcohol, Propylene Glycol, Strong Ammonia Solution, Black Iron Oxide
TekPrintTMSB-5002 Grey Ink:

כיכוד נראית התרופה ומה תוכן האריזה-

- 20 מ"ג: גוף לבן/ כובע לבן, מוטבע "ALV" על גבי הכובע ו- "563" על גבי הגוף. בקבוקים של 30 או 100 כמוסות.
- 30 מ"ג: גוף לבן/ כובע כתום, מוטבע "ALV" על גבי הכובע ו- "564" על גבי הגוף בקבוקים של 30 ו- 100 כמוסות
- 40 מ"ג: גוף לבן/ כובע תכלת, מוטבע "ALV" על גבי הכובע ו- "565" על גבי הגוף בקבוקים של 30 ו- 100 כמוסות
- 50 מ"ג: גוף לבן/ כובע כחול כהה, מוטבע "ALV" על גבי הכובע ו- "566" בקבוקים של 30 ו- 100 כמוסות
- 60 מ"ג: גוף כחול/ כובע כחול, מוטבע "ALV" על גבי הכובע ו- "567" בקבוקים של 30 ו- 100 כמוסות
- 70 מ"ג: גוף כחול/ כובע כתום, מוטבע "ALV" על גבי הכובע ו- "568" בקבוקים של 30 ו- 100 כמוסות

הכמוסות ארוזות בבקבוק פלסטיק עם פקק קשה פתיחה לילדים המכיל סופח לחות. אין לבלוע את סופח הלחות ויש להשאירו בבקבוק עד תום השימוש.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן וכתובתו:

Alvogen Malta (Out-Licensing) Ltd,
Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San Gwann SGN3000, Malta

בעל הרישום וכתובתו:

קיי.אס.קיים אינטרנשיונל (אס. קיי. פארמה) בע"מ, יגאל אלון 94, תל אביב-יפו. 6789139

עלון זה נערך בפברואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ליסדקסא אס. קיי. 20 מ"ג: 175-75-37947

ליסדקסא אס. קיי. 30 מ"ג: 175-76-37948

ליסדקסא אס. קיי. 40 מ"ג: 175-77-037949

ליסדקסא אס. קיי. 50 מ"ג: 175-78-37950

ליסדקסא אס. קיי. 60 מ"ג: 175-79-37951

ליסדקסא אס. קיי. 70 מ"ג: 175-80-37952

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלוני מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית סירקו את הקוד הבא

For further information about the medicinal product and for updated consumer leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code



Lisdexa 20 Lisdexa 30 Lisdexa 40 Lisdexa 50 Lisdexa 60 Lisema 70

ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני
03-6114543__ או בטלפון מספר report@sk-pharma.com

KS_LISDE_CAP_PIL_02_24_V01