

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

**לקромיצין
טיפול עיניים סטריליות**

החומר הפעיל ורכיביו:
גנטאמיצין סולפאט (Equivalent to 0.3% Gentamycin base)

כל 1 מ"ל מכיל: 3 מ"ג גנטאמיצין (סולפט)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 6 - "מידע נוספת" וסעיף 2 - "מידע חשוב"
על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בזיהומיים חיצוניים של העין הנגרמים ע"י חיידקים הרגיסטים לתרופה.
קבוצה טיפולית: אנטיביוטיקה מקבוצת האמיןוגליקוזידים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין לשתחש בתרופה אם:
אם אתה רגיש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוספת").

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפולblkромיצין, ספר לרופא אם:

- הינך בהריון (שליש ראשון/אחרון) או מניקה.
- הינך סובל או סבלת מליקוי שמיעה או ליקוי בתפקוד הכלליות.
- הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהו.

שימוש ממושך עלול לגרום להתקפות זנימים עמידים כולל זיהום פטריטי.

תגובה בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הירין והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה זו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

לקромיצין מכיל חומר משמר בנזילקוניאם קלוריד, העולול להיספג על-ידי עדשות מגע רכבות.

- אין לשתחש בתכשיר זה כאשר אתה מרכיב עדשות מגע רכבות.
- יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזין כעבור לא פחות מ- 15 דקות מהצלה התרופה לעין.

3. כיצד לשימוש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. אין לעבר על המנה המומלצת. אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

1. בכספי להימנע מזיהום, אין לתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמר על הבקבוק סגור היטב.
2. יתכן ובקבוק הטיפות אינו מלא; הדבר נועד לאפשר שליטה טובה יותר על קצב הטפטוף.
3. כיצד לשימוש בטיפות: ראשית, רחץ את ידך. הטה את הראש לאחר האצבע המורה, משוך כלפי מטה את העperf התחתון, ליצירת מעין "כיס". יש לטפטף את התרופה אל תוך ה"כיס" שנוצר. עצום עניין בעדינות. אין למצמצ. השאר בעיניים עצומות למשך 1 עד 2 דקות.
4. בנוסף להוראות שניתנו לעיל- מיד לאחר טפטוף הטיפות אל העין, לחץ באמצעות האצבע האמצעית על הפינה הפנימית של העין. יש להמשיך בלחץ 1 עד 2 דקות לאחר הטפטוף אל העין. פעולה זו עוזרת להימנע מספיגת התרופה אל תוך הגוף ובכך עוזרת למנוע תופעות לוואי.
5. לאחר השימוש בתרופה, שטוף היטב את ידך בכספי לנוקותן משאריות של תרופה.
6. בכספי להימנע מהפצצת זיהום, אין לשימוש באותו מיל של תרופה ליוטר מאדם אחד.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.
יש לשימוש בתרופה זו בזמןנים קבועים כפי שנקבע ע"י הרופא המטפל.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר: אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעליל'ן מן התרופה פנה מיד לחדר רפואי של בית-חולדים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה: אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קבוע יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה זו ללא התיעיצות עם הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעע שהינך נטול תרופה. הרכבת משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בלקромיצין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מ一封 אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם מתפתחות התופעות הבאות: עקצוץ, אדמומיות ונפיחות.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעתת הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)
המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי אריזת הקרטון והטווית. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C . לא להקפי.
- אחסון באזיה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
- אין להשתמש בתרופה זו יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Benzalkonium Chloride, Povidone, Purified Water, Sodium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Phosphate Monobasic.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה?

לקרומיצין הוא תכשיר טיפות עיניים המגיע בבקבוק פלסטי עם טפטפת המכיל 5 מ"ל של תמיסת צלולה ושקופה.

שם הייצור, בעל הרישום וכתובתו: פישר תעשיות פרמצטטיות בע"מ, רחוב בר יוחאי 9, בני ברק 5155309 או ת.ד. 39071, ת"א 6139001.

עלון זה נערך בפברואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 509624707
לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

מק"ט עלון 390752 מק"ט תוצ"ג 30055