

كساريلتو 15 ملغ

كساريلتو 20 ملغ

أقراص مطالية



يحتوي كل قرص على:

ريفاروكسابان 15 ملغ (Rivaroxaban 15 mg)
ريفاروكسابان 20 ملغ (Rivaroxaban 20 mg)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر كساريلتو بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ كساريلتو والتصرف وفقها.
 يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر.
 يجب حفظ البطاقة والنشرة لقراءتها بمعنون ثانية إذا دعت الحاجة.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

كساريلتو مخصص للأكيار في الحالات التالية:

- لممنع الخثرات الدموية في الدماغ (سكتة) وفي الأوعية الدموية الأخرى في الجسم، لدى المرضى الذين يعانون من نظم قلب غير منتظم المسمى الرغفان الأذيني غير الصمامي، ومن عامل خطرة واحد أو أكثر من العوامل التالية: قصور القلب، فرط ضغط الدم، العمر (75 سنة أو أكثر)، سكري، سكتة أو نوبة إقفارية عابرة في الماضي.

- لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة الأوردة الدموية للرئتين) وفي الأوعية الدموية للرئتين (إنصمام رئوي) ولممنع تكرار ظهور خثرات دموية في الأوعية الدموية في الرجلين وأو في الرئتين.

- لعلاج الخثرات الدموية ولمنع تكرار ظهور خثرات دموية في الأوردة أو في الأوعية الدموية في الرئتين، بعد علاج إبتدائي قدره 5 أيام على الأقل بواسطة أدوية لحقن تستعمل لعلاج الخثرات الدموية.

الفصيلة العلاجية: يتبعي كساريلتو إلى فصيلة أدوية تسمى مضادات التخثر ويعلم عن طريق تقليل تشكيل خثرات دموية وذلك بواسطة حصر العامل الذي يساهم في مسيرة التخثر (عامل 10a).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليجي) لـ ريفاروكسابان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".
- كنت تعاني من نزف متزايد.
- وُجد لديك مرض أو حالة في عضو بالجسم يزيدان من خطورة حدوث نزف جدي (مثلاً: قرحة في المعدة، رض أو نزف في الدماغ، إيجزت مؤخراً عملية جراحية في الدماغ أو في العينين).
- كنت تتناول أدوية لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبكسابان أو هيبارين)، عدا حالات الانتقال من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تُعطي هيبارين عن طريق قنطر وريدي أو شرياني لإيقائه مفتوحاً.
- كنت تعاني من مرض كبدى الذي يؤدى إلى زيادة الخطورة لحدث نزف.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

لاتتناول كساريلتو وإنك لطبيبك إذا كانت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه تتطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحديث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كساريلتو.

استعمال كساريلتو يتطلب الحذر الخاص. قبل العلاج بـ كساريلتو، إنك لطبيبك:

إذا كنت معرضاً خطير لدى الكبار ومتوسط حتى خطير لدى الأطفال والمرأهقين لأن الأداء الوظيفي للكل يؤثر على كمية الدواء التي تعمل في جسمك (انظر الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء" بخصوص الجرعة الدوائية الموصى بها في حالة المرض الكلوى).

- وُدت تتناول أدوية أخرى لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبكسابان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تُعطي هيبارين عن طريق قنطر وريدي أو شرياني لإيقائه مفتوحاً (انظر الفقرة 2 "إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى...").
- إضطرابات تنفسية.

ضغط دم مرتفع جدًا غير متوازن بواسطة علاج دوائي.

- مرض في المعدة أو في الأمعاء الذي قد يسبب نزف، مثل: إلتهاب الأمعاء أو المعدة، أو إلتهاب المريء الناتج، مثلاً، عن مرض الإنتراد المربيسي - المعدى (مرض ترتفع فيه الحموضة من المعدة أو إلى المريء) أو أورام تتموضع في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
- مشاكل في الأوعية الدموية لشبكة العين (retinopathy).

هـ مرض رئوي توسيع فيه القصبات الهوائية وتنتهي بآفات ذات قيحية (bronchiectasis) أو نزف رئوي سابق.

- إذا وجد لديك صمام قلب إصطناعي.
- إذا علمت بأنك تعاني من مرض يُسمى متلازمة أضداد الشحوم الفوسفورية (إضطراب في جهاز المناعة حيث يسبب زيادة خطورة حدوث خثرات دموية)، إنك لطبيبك وهو سيقرر إذا كانت هناك حاجة لتغيير العلاج.

- إذا حدد لطبيبك بأن ضغط دمك غير مستقرار أو مخطط لك علاج جراحي أو علاج آخر لإزالة الخثرة الدموية من الرئتين.
- إذا كان الطبيب قبل تناول الدواء، إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، سوف يقرر الطبيب فيما إذا كان يتوجب علاج بـ كساريلتو وإذا كنت تحتاج لتابعة مثيرة.
- إذا كان الطبيب يظن بأنك معرض لخطورة زائدة لظهور قرحة في المعدة أو في الأمعاء، فمن الجائز أن يعطيك أيضاً علاجاً لمنعها.

إذا خطط لك إجراء عملية جراحية أو إجراء إختراقي

- من المهم جداً تناول كساريلتو قبل وبعد العملية الجراحية أو الإجراء الإختراقي، بالضبط في الأوقات التي حددتها لك الطبيب.
- إذا كان هناك تدخل لقنطر أو لحقنة داخل العمود الفقري (مثلاً لتخدير فوق الجافية أو تخدير شوكى أو لتسكين الألم) في عملية الجراحية:

- من المهم جداً تناول كساريلتو قبل وبعد الحقنة أو إزالة القنطر، بالضبط في الأوقات التي حددتها لك الطبيب.
- و راجع الطبيب المعالج فوراً إذا كنت تعاني من خدر أو من ضعف في الرجلين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد زوال مفعول المخدر، لأن ذلك يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بأقراص كساريلتو للأطفال يزنون أقل من 30 كلغ. لا تتوفر معلومات كافية حول الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين فيما يتعلق بالإستجابات المخصصة للأكيار.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إنك لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

بالأشخاص إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، پوساكونازول)، عدا تلك المخصصة فقط للدهن على الجلد.

- أقراص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج - حالة يُفتح فيها الجسم فائض من الكورتيزول.

- أدوية معينة لعلاج التلوثات المجرثومية (مثل: كلاريتوميسين، إبريتوميسين).

- أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج تلوثات فيروس الإيدز (HIV) (مثل: ريتونافير).

- أدوية أخرى مضادة لللثاخ (مثل: إنوكسالپارين، كوليبيوجريل أو مضادات ثيماين ٤ مثل وارفارين وأسينوكارول).

- أدوية مضادة للالتهاب ومسكبة للألم (مثل: نابروكسين أو حمض أسيتيل ساليسيليك [أسيبرين]).

- دروندارون، دواء لعلاج التبضغ غير المنتظم.

- أدوية معينة لعلاج الإكتئاب (مثبتات إنقاضية لإعادة إمتصاص السيروتونين [SSRIs] أو مثبتات لإعادة إمتصاص السيروتونين ونوراپينفرين [SNRIs]).

إنك لطبيبك قبل تناول الدواء إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. هذه الأدوية قد تؤدي إلى زيادة تأثير كساريلتو. سوف يقرر طبيبك فيما إذا كان يتوجب علاجك بـ كساريلتو وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيثة.

ذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة لعلاج الصداع (epilepsy) (مثل: فينيتوئين، كاربامازيبين، فينوباربital).

- المستحضر النباتي لعلاج الإكتئاب سانت. جونس وورت (هيبيروكم).

- إنك لطبيبك قبل تناول الدواء إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. هذه الأدوية قد تسبب إنخفاضاً في تأثير كساريلتو.

سوف يقرر طبيبك فيما إذا كان يتوجب علاجك بـ كساريلتو وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيثة.

استعمال الدواء والطعام

من الواجب تناول الدواء مع الطعام والبلع مع الماء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تتناول كساريلتو إنك حاملاً أو مرضعة.

إذا كان هناك إحتتمالاً بأن تصبحي حاملاً، فعليك إستعمال وسيلة منع حمل موثقة أثناء تناول كساريلتو.

إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة تناول الدواء، توجهي فوراً للطبيب، الذي سيقدر بخصوص إستمرار العلاج.

السيادة وإستعمال الماكولات

قد يسبب كساريلتو دوار (عرض جانبي شائع) أو إغماء (عرض جانبي غير شائع) (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السيادة.

ركوب الدراجة، إستعمال المعدات أو تشغيل الماكولات أثناء إستعمال كساريلتو إذا كنت تتأثر من هذه الأعراض.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز وصوديوم.

إذا قيل لك من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل أن تبدأ بتناول كساريلتو.

يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) في كل قرص وبالتالي يعتبر "خالي من الصوديوم" بجوهره.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

- الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

• الكبار

هـ لممنع الخثرات الدموية في الدماغ (سكتة) وفي الأوعية الدموية الأخرى في الجسم فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي قرص واحد من عيار 20 ملغ مرة في اليوم.

من الجائز أن يتم خفض الجرعة الدوائية إلى قرص واحد من عيار 15 ملغ مرة في اليوم، وذلك إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى.

إذا توجب عليك إجتياز إجراء لعلاج إنسداد في الأوعية الدموية في القلب (إجراء يسمى: التدخل التاجي عن طريق الجلد - PCI) مع إدخال دعامة، توفر معلومات محدودة حول خفض الجرعة الدوائية إلى قرص واحد من كساريلتو 15 ملغ مرة واحدة في اليوم بالإضافة لدواء مثبط لصفائح الدم، مثل: كوليبيوجريل.

هـ لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين وفي الأوعية الدموية للرئتين ولهما خصائص مماثلة في المقدمة. عادة هي قرص واحد من عيار 20 ملغ من عيار 15 ملغ من عيار 15 ملغ مرة في اليوم لمدة الأسابيع الثلاثة الأولى، وفي سياق العلاج قرص واحد من عيار 20 ملغ مرة في اليوم. بعد إتمام 6 أشهر على الأقل من العلاج، من الجائز أن يقرر الطبيب مواصلة العلاج بقرص واحد في اليوم من كساريلتو 10 ملغ.

إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى وتتناول كساريلتو 20 ملغ مرتين يومياً، فمن الجائز أن يقرر الطبيب خفض الجرعة الدوائية بعد 3 أسابيع، إلى قرص واحد من عيار 15 ملغ مرة في اليوم، وذلك في حال أن الخطورة لحدث نزف أكبر من الخطورة لتناول خثرة دموية أخرى.

• الأطفال والمراهقون

تنتعلق الجرعة الدوائية من كساريلتو بوزن الجسم، ويتم حسابها من قبل الطبيب.

هـ الجرعة الدوائية الموصى بها للأطفال والمراهقين الذين يزنون ما بين 30 كلغ وأقل من 50 كلغ هي قرص واحد من كساريلتو 15 ملغ مرة في اليوم.

هـ الجرعة الدوائية الموصى بها للأطفال والمراهقين الذين يزنون 50 كلغ أو أكثر هي قرص واحد من كساريلتو 20 ملغ مرة في اليوم.

يجب تناول الجرعة الدوائية من كساريلتو مع مشروب (على سبيل المثال ماء أو عصير) خلال وجة الطعام. يجب تناول الأقراص كل يوم في ساعة محددة، الرجاء ادرس إستعمال ساعة منهاهة لتذكرك. للوالدين أو المعالجين: الرجاء تأمل الطفل خلال تناوله للأقراص كل من أنه تناول كأساريلتو وإنك لطبيبك.

بما أن الجرعة الدوائية من كساريلتو تعتمد على وزن الجسم، فمن المهم الحرص على الوصول للزيارات المخطط لها لدى الطبيب، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى ملء مقدمة الجرعة الدوائية كلما تغير وزن الجسم.

لا يجوز إطلاقاً ملء مقدمة الجرعة الدوائية من كساريلتو بنفسك. سوف يقوم الطبيب بملء مقدمة الجرعة الدوائية إذا دعت الحاجة.

لا يجوز شطر القرص في محاولة لإعطاء جزء من الجرعة الدوائية لغيرك. إذا نطلب الأمر جرعة دوائية منخفضة أكثر، إستعمل كساريلتو 1 ملغ/ مل حبيبات تحضير معلق للإعطاء عبر الفم، بالإمكان سحق القرص وخلطه مع الماء أو مهروس التفاح، إذا دعت الحاجة، سيعطيك طبيبك كساريلتو مهروس عبر أنبوب التغذية إلى المعدة.

مدة العلاج

يجب تناول كساريلتو كل يوم إلى أن يوصي الطبيب بالتوقف.

سوف يقرر طبيبك بخصوص مدة العلاج بالدواء.

طريقة التناول

من الواجب تناول الدواء مع الطعام وبوصى بسلع القرص مع الماء. إذا كنت تستصعب بلع القرص بأكمله، تحدث مع طبيبك حول طرق أخرى لتتناول كساريلتو.

بإمكانك سحق القرص وخلطه بالماء أو بمهروس التفاح، مباشرة بعد تناول الدواء المحسوسة.

إذا دعت الحاجة، سيعطيك طبيبك بإعطائك كساريلتو المحسوسة عن طريق أنبوب تغذية للمعدة.

لا تتوفر معلومات بخصوص الشطر/المضخ.

إن تناول الدواء في نفس الوقت من كل يوم، سيساعدك على تذكر تناوله.

إذا قمت ببعض الجرعة الدوائية أو تقيأت

• إذا إنقضت أقل من 30 دقيقة بعد تناول كساريلتو، فيجب تناول جرعة دوائية جديدة.

• إذا إنقضت أكثر من 30 دقيقة بعد تناول كساريلتو، فلا يجوز تناول جرعة دوائية جديدة. في هذه الحالة، يجب تناول الجرعة الدوائية التالية على كساريلتو في الموعد التالي المخطط له.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا بصفت الجرعة الدوائية أو تقيأت بعد تناول كساريلتو مراراً وتكراراً.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

عليك التوجه فوراً إلى الطبيب المعالج. إن تناول كساريلتو أكثر من اللازم يزيد الخطورة لحدوث نزف.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معلقاً.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب

• بالنسبة للجرعة الدوائية ذات قرص واحد من كساريلتو 15 ملغ أو كساريلتو 20 ملغ مرة في اليوم، يجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة دوائية مساعقة أو جرعتي دواء في نفس اليوم! يجب تناول الجرعة الدوائية القادمة في اليوم التالي وفي السياق مرة في اليوم كالمعتاد وإستشارة الطبيب.

الكتاب:

• بالنسبة للجرعة الدوائية ذات قرص واحد من عيار 15 ملغ في يوم واحد، بالإمكان تناول قرصين من عيار 15 ملغ معاً للحصول على جرعة دوائية حال تذكرك. لا يجوز تناول أكثر من قرصين من عيار 15 ملغ في يوم واحد. بالإمكان تناول قرصين من عيار 15 ملغ معاً للحصول على جرعة دوائية حال تذكرك.

اليوم الواحد. في اليوم التالي يجب الاستمرار بتناول قرص واحد من عيار 15 ملغ مرتين في اليوم.

يجب المواطنة على العلاج حسب طبيعة المرض.

حتى ولو طرأ تحسن على حالة المصحة، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب نظراً لأن كساريلتو يعالج ويبعد حدوث حالات خطيرة.

إذا توفرت عن تناول الدواء فإنه تضر بالقدرة العلاجية والوقائية للدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كساريلتو قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعافى أيام منها.

مثل الأدوية المشابهة الأخرى لتقليل تشكيل الخثارات الدموية، فإن كساريلتو قد يسبب حدوث نزف الذي قد يشكل خطرًا على الحياة. النزف الشديد قد يؤدي إلى إنخفاض مقاوم في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزف مستمراً.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تعاني أو كان الطفل يعاني من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

علامات لنزف: نزف دماغي أو داخل الجمجمة (الأعراض يمكن أن تشمل صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، إحتلاج، إنخفاض مستوى الوعي وتصلب الرقبة. هذه حالة طبية طارئة خطيرة، يجب البحث عن علاج طبي فوري!).

- نزف مطوري أو متزايد.

- ضعف غير عادي، إرهاق، شحوب، دوار، صداع، إنخفاض مجهول السبب، صيق تنفس، ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (angina pectoris).

علامات لردوه فعل تحسسية خطيرة:

- فطح شديد منتشر على الجلد، حوصلات أو جروح في النسيج المخاطي، مثلًا في الفم أو في العينين (Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis).

- رد فعل للدواء الذي يؤدي إلى حدوث طفح، سخونة، التهاب الأعضاء الداخلية، شذوذ في الدم وحدوث مرض جهازي (DRESS). إن وقوع هذه الأعراض الجانبية هي نادرة جداً (حتى مستعمل 1 من بين 10,000 مستعمل).

علامات لردوه فعل تحسسية خطيرة:

- إنفاس الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحجرة؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط مقاوم لضغط الدم.

إن توثر ردوه الفعل التحسسي الخطير هو نادر جداً (ردود فعل إستهدافية، بما في ذلك صدمة إستهدافية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10,000، وغير شائعة (وذمة وعائية ووذمة تحسسية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100).

أعراض جانبية إضافية يُبلغ عنها لدى الكبار، الأطفال والمهاترون:

• إنخفاض في خلايا الدم الحمراء الذي قد يؤدي إلى شحوب، ضعف أو إلى صيق في التنفس.

- نزف في المعدة أو في الأمعاء، نزف في الأعضاء التناسلية والبوليية (يشمل دم في البول ونزف مطوري متزايد)، رعاف، نزف في اللثة.

- نزف إلى داخل العين (يشمل نزف من بياض العين).

- نزف إلى داخل نسيج أو تجويف في الجسم (نزف دموي داخلي موضعي، رض).

- سعال دموي

- نزف من الجلد أو من تحت الجلد.

- نزف بعد عملية جراحية

- تسرب دم أو سائل من جرح العملية الجراحية

- إنفاس في الأطراف

- ألم في الأطراف

- خلل في وظيفة الكلي (يمكن الكشف عنه بواسطة الفحوص التي تجري من قبل الطبيب)

- سخونة

- ألم في البطن، صعوبات في الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال

- ضغط دم منخفض (أعراض ذلك يمكن أن تكون دوار أو إغماء عندما تنتقل إلى وضعية الوقوف)

- إنخفاض عام في القوة والحيوية (ضعف، إرهاق، صداع، دوار)

- طفح، حكة في الجلد

- حفوص الدم يمكن أن تشير إلى ارتفاع في إنzymات كبدية معينة

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100):

- نزف داخل الدماغ أو داخل الجمجمة (أنظر آنفًا، علامات لنزف)

- نزف إلى داخل مفصل الذي يسبب ألم وإنفاس

- قلة الصفائح الدموية (عدد منخفض للصفائح الدموية، حيث أنها خلايا التي تساعد على تخثر الدم)

- ردود فعل للأداء الوظيفي للكلب (يمكن الكشف عنه من خلال الفحوص التي تجري من قبل الطبيب)

- خلل في الأداء الوظيفي للكلب (يمكن الكشف عنه من خلال الفحوص التي تجري من قبل الطبيب)

- يمكن أن تشير حفوص الدم إلى حدوث زيادة في البيليروبين، في إنzymات معينة للبنكرياس أو الكبد أو في عدد الصفائح الدموية

- إغماء

- شعور عام غير جيد

- نبض متسرع

- جفاف في الفم

- شرى (urticaria)

5 كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روّية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

أعراض مهروسة

الأعراض المهزوزة تبقى ثابتة في الماء أو في مهروس التفاح حتى 4 ساعات.

• لا يجوز إلقاء أدوية في الماء أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال بعد. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6 معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا على:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose 5 cP, hypromellose 15 cP, magnesium stearate, sodium laurylsulfate, macrogol 3350, titanium dioxide, ferric oxide red.

يحتوي كل قرص من كساريلتو 15 ملغ على 25.4 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

يحتوي كل قرص من كساريلتو 20 ملغ على 22.9 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

كساريلتو 15 ملغ: أقراص مطبلية، مستديرة، بلون أحمر، محدبة من كلا الجانبين و معلمة "BAYER" من جانب واحد و "15" مع مثلث من الجانب الثاني.

كساريلتو 20 ملغ: أقراص مطبلية، مستديرة، بلونبني - أحمر، محدبة من كلا الجانبين و معلمة "BAYER" من جانب واحد و "20" مع مثلث من الجانب الثاني.

الأقراص متوفّرة ضمن لوحيات (بليستر) بعلب ذات 7، 14، 28، 42، 98 أو 100 قرص.

• صاحب الإمكانيات وعنوانه: باير إسرائيل. م.ض، شارع هاحاراش 36، هود هشارون 4527702.

• إسم المنتج وعنوانه: باير آي.جي، ليفركوزن، ألمانيا أو باير S.r.l. Healthcare Manufacturing S.r.l., ميلانو، إيطاليا.

تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

• أرقام سجل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

كساريلتو 15 ملغ: 147 44 33576 00 147 44 33576 01

147 44 33576 02 147 44 33576 03

147 45 33579 01 147 45 33579 00

147 45 33579 02 147 45 33579 04

147 45 33579 04 147 45 33579 02

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.