

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كيترودا 100 ملغ/4 مل

محلول مركز لتحضير محلول للتسرير
 داخل الوريد

كل قارورة تحتوي على:
بيمبروليزوماب 100 ملغ
Pembrolizumab 100 mg

لائحة المواد غير الفعالة انظر للبند 6.1 "على ماذا يحتوي كيترودا".

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن كيترودا. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى طبيبك أو إلى الصيدلي.
- هذا الدواء يُوصف للعلاج من أجلك. لا تعطه لأخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة الطبية، المستحضر كيترودا هناك بطاقة معلومات وقائية للمتعامل وكراسة معلومات للمتعامل. تحتوي البطاقة والكراسة على معلومات وقائية مهمة، عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج وأثناء العلاج بكيترودا، والعمل بموجها. يجب إمعان النظر ببطاقة المعلومات الوقائية للمتعامل، بكراسة المعلومات للمتعامل وبالنشرة الطبية للمستهلك قبل البدء باستعمال المستحضر. يجب الحفاظ على البطاقة والكراسة لمراجعة إضافية إذا لزم الأمر.

1. لأي غرض مخصص كيترودا؟

كيترودا هو دواء ملزم بوصفة طبيب المستعمل لعلاج:

- سرطان الجلد من نوع الورم الميلاني. يمكن استعمال كيترودا لدى البالغين والاطفال من جيل 12 سنة وما فوق:
 - عندما يكون قد انتشر ورماك الميلاني أو أنه لا يمكن إزالته عن طريق عملية جراحية (ورم ميلاني مُتقدّم)، أو مع ورم ميلاني في مرحلة IIIC أو مرحلة III، من أجل المساعدة في منع عودة الورم الميلاني بعد أن أزيل هو والغدد الليمفاوية التي احتوت على السرطان بعملية جراحية.
 - سرطان الرئتين من نوع سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC).
 - يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع أدوية العلاج الكيميائي بيميريكسيد وكاريوبلاتين كعلاجك الأول عندما يكون سرطان الرئة الخاص بك:

- قد انتشر NSCLC مُتقدّم) و،
 - هو من نوع سرطان الرئة الذي يُدعى "غير الحرشفى" ("nonsquamous") و
 - لا يوجد لورماك جين غير سليم من "ALK" أو "EGFR".
- يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع أدوية العلاج الكيميائي كاريوبلاتين وپاكليتاكسيل أو پاكليتاكسيل المرتبط بالبروتين كعلاجك الأول عندما يكون سرطان الرئة الخاص بك:
 - قد انتشر NSCLC مُتقدّم) و،
 - هو من النوع الذي يُدعى "حرشفى" ("squamous").
- يمكن استعمال كيترودا بمفرده عندما يكون سرطان الرئة الخاص بك:
 - قد انتشر NSCLC مُتقدّم) و،
 - هو إيجابي لـ "PD-L1" و "ALK" أو "EGFR".

ـ EGFR المتقدم لديك ولا يوجد لورماك جين غير سليم من "ALK" أو "EGFR" ، كعلاجك الأول إذا لم تلق علاج كيميائي لعلاج الـ NSCLC المتقدم لديك.

- عولجت بعلاج كيميائي الذي يحتوي على پلاتين لعلاج الـ NSCLC المتقدم لديك، وهو لم يُعمل أو أنه لم يُعد يُعمل، وإذا كان لورماك جين غير سليم من "ALK" أو "EGFR" ، تلقيت أيضًا علاجًا بدواء من نوع مُثبط EGFR أو ALK وهو لم يُعمل أو أنه لم يُعد يُعمل.
- سرطان الرأس والعنق من مصدر خلايا حرشفية (HNSCC):
 - يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع أدوية العلاج الكيميائي فلورويوراسييل وپلاتين كعلاجك الأول عندما يكون سرطان الرأس والعنق لديك قد انتشر أو عاد ولا يمكن إزالته عن طريق عملية جراحية.

- يمكن استعمال كيترودا بمفرده كعلاج الأول عندما يكون سرطان الرأس والعنق لديك:
 - قد انشر أو عاد ولا يمكن إزالته عن طريق عملية جراحية، و
 - هو إيجابي لـ "PD-L1"
 - يمكن استعمال كيترودا بمفرده عندما يكون سرطان الرأس والعنق لديك:
 - قد انشر أو عاد و
 - تلقيت علاج كيميائي الذي يحتوي على بلاتين، وهو لم ي عمل أو أنه لم يُعد يعمل.
 - سرطان من نوع لمفومة هودجكين الكلاسيكية (cHL):
 - لدى البالغين عندما:
 - الـ cHL الخاص بك قد عاد أو
 - تكون قد جربت علاجاً وهو لم ي عمل، أو
 - لدى الأطفال عندما:
 - تكون قد جربت علاجاً وهو لم ي العمل، أو
 - الـ cHL الخاص بك قد عاد بعد أن تلقيت 2 أو أكثر من أنواع العلاج.
 - سرطان من نوع لمفومة الخلية البائية المنصفية الأولى - primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBCL), لدى البالغين والأطفال عندما:
 - تكون قد جربت علاجاً وهو لم ي العمل، أو
 - الـ PMBCL الخاص بك قد عاد بعد أن تلقيت 2 أنواع أو أكثر من العلاج.
 - سرطان المثانة البولية والمسالك البولية (urothelial carcinoma).
 - يمكن استعمال كيترودا إذا ما ينتشر السرطان لديك إلى نسيج مجاور في المثانة البولية، ولكنه موجود باختصار مرتفع للانتشار (سرطان المثانة البولية الذي لا يخترق العضل [NMIBC] باختصار مرتفع) عندما:
 - يكون الورم لديك من نوع سرطانة (كارسينوما) لابدة ("carcinoma in situ") [CIS], وأيضاً
 - جربت العلاج به BCG (Bacillus Calmette-Guerin) الذي لم ي العمل، وأيضاً
 - أنت لست مؤهلاً أو أنت اخترت لا تخضع لعملية جراحية لاستئصال المثانة البولية خاصتك.
 - يمكن استعمال كيترودا عندما يكون سرطان المثانة البولية أو المسالك البولية لديك:
 - قد انشر أو أنه ليس هناك إمكانية لإزالته عن طريق عملية جراحية (سرطان متقدم للمسالك البولية) و
 - لا تستطيع تلقي علاج كيميائي الذي يحتوي على دواء يدعى سيسپلاتين، والورم إيجابي لـ "PD-L1", أو
 - لا تستطيع تلقي دواء الذي يدعى سيسپلاتين أو كاربوبيلاتين (بغض النظر عن "PD-L1"), أو
 - أن المرض قد تقدم خلال أو بعد أن تلقيت علاج كيميائي الذي يحتوي على بلاتين.
 - سرطان الذي أظهر عن طريق فحص مختبر بأنه ورم صلب من microsatellite instability-high (MSI-H) أو من mismatch repair deficient (dMMR).
 - يمكن استعمال كيترودا لدى البالغين والأطفال لعلاج سرطان قد انشر أو أنه ليس هناك إمكانية لإزالته عن طريق عملية جراحية (سرطان متقدم)، و
 - قد تقدم بعد إعطاء علاج جهازي، ولا توجد لديك إمكانيات علاج مرضية، أو
 - لديك سرطان القولون أو المستقيم (rectum), الذي قد تقدم بالرغم من العلاج الكيميائي بفلوروبيريميدين، أو كسالبيلاتين، وإيرينوتican.
 - من غير المعروف فيما إذا كان كيترودا أمّا وناجعاً لدى الأطفال مع سرطانات MSI-H الخاصة بالدماغ أو الحبل الشوكي (سرطانات الجهاز العصبي المركزي).
 - سرطان القولون أو المستقيم. يمكن استعمال كيترودا كعلاج أول عندما يكون السرطان لديك:
 - قد انشر أو أنه لا يمكن إزالته عن طريق عملية جراحية (سرطان قولون أو مستقيم متقدم)، و
 - أظهر عن طريق فحص مختبر بأنه mismatch repair deficient أو microsatellite instability-high (MSI-H) أو mismatch repair deficient (dMMR).
 - سرطان المعدة المسمى سرطانة غدية للمعدة أو للموصل المريئي (GEJ). يمكن استخدام كيترودا لدى البالغين بالدمج مع الدواء تراستوزوماب جنباً إلى جنب مع أدوية العلاج الكيميائي القائمة على الفلوروبيريميدين والبلياتين وكعلاج أول عندما يكون سرطان المعدة لديك:
 - إيجابي لـ HER2, والورم لديك إيجابي لـ "PD-L1", و
 - انتشر أو لا يمكن إزالته جراحياً (سرطان معدة متقدم).
 - سرطان المعدة من نوع سرطانة غدية للمعدة أو للموصل المريئي الذي هو إيجابي لـ "PD-L1", يمكن استعمال كيترودا لوحدة، عندما:
 - عاد السرطان أو انتشر (سرطان معدة متقدم)، و
 - تلقيت 2 أنواع أو أكثر من العلاج الكيميائي بما في ذلك فلوروبيريميدين، وعلاج كيميائي الذي يحتوي على بلاتين، و

- إذا كان لوزمك جين غير سليم من "HER2/neu", وتلقيت أيضًا دواء مُستهدف ل-HER2/neu.
 - سرطان المريء أو سرطانة (كارسينومه) للموصى المعيي المريئي (GEJ) من نوع معين. يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع أدوية العلاج الكيميائي التي تعتمد على البلاتين والفلوروبيريميدين، عندما:
 - يكون السرطان الخاص بك غير قابل للشفاء عن طريق عملية جراحية أو عن طريق علاج بتوليفة من العلاج الكيميائي والأشعة.
 - سرطان المريء الذي يسمى سرطانة (كارسينومه) من مصدر خلايا حرشفية. يمكن استعمال كيترودا عندما:
 - يكون السرطان الخاص بك قد عاد أو انتشر (سرطان مريء متقدم)، و
 - يكون الورم الخاصل بك إيجابي لـ "PD-L1" وقد تلقيت نوع واحد أو أكثر من العلاج وهو لم يعمل أو أنه لم يعد يعمل.
 - سرطان عنق الرحم والذي هو إيجابي لـ "PD-L1".
 - يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع أدوية العلاج الكيميائي، بتوليفة مع الدواء بيباسيزوماب أو بدونه، في حال أن سرطان عنق الرحم لديك لم يخفِ (عنيف)، عاد، أو انتشر (سرطان متقدم بعنق الرحم)
 - يمكن استعمال كيترودا لوحده عندما يكون سرطان عنق الرحم لديك:
 - قد عاد أو انتشر (سرطان متقدم لعنق الرحم)
 - تلقيت علاج كيميائي الذي لم يعمل أو أنه لم يُعد يعمل.
- سرطان جلد من نوع سرطانة (كارسينومه) خلايا ميركل (MCC) لدى الأطفال والبالغين. يمكن استعمال كيترودا لعلاج سرطان الجلد هذا الذي انتشر أو عاد.
- سرطان كلية الذي يُدعى سرطانة (كارسينومه) الخلايا الكلوية (RCC).
 - يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع الدواء إكيسيتنيب كعلاحك الأول عندما يكون سرطان الكلية لديك قد انتشر أو أنه لا توجد إمكانية لإزالته عن طريق عملية جراحية (RCC متقدم).
 - يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع الدواء لينفاتينيب كعلاحك الأول عندما يكون سرطان الكلية لديك قد انتشر أو أنه لا توجد إمكانية لإزالته عن طريق عملية جراحية (RCC متقدم).
 - يمكن استعمال كيترودا لوحده إذا كنت بإختصار متوسط-مرتفع أو مرتفع لانتكاس سرطان الكلية (RCC) لديك بعد عملية جراحية:
 - لإزالة كل أو جزء من كليةك، أو
 - لإزالة كل أو جزء من كليةك وكذلك عملية جراحية لإزالة سرطان الذي انتشر لمناطق أخرى في الجسم (آفات نفيلي).
 - سرطان الرحم من نوع سرطانة (كارسينومه) المتقدمة أو المتكررة لبطانة الرحم.
 - يمكن استعمال كيترودا بتوليفة مع الدواء لينفاتينيب:
 - عندما تلقيت علاجًا كيميانيًا الذي يحتوي على البلاتين، والذي لم يُعد يعمل، و
 - السرطان لديك غير قابل للشفاء بواسطة عملية جراحية جراحيه أو أشعة.
- سرطان الذي يظهر في الفحص بأنه ورم مع عبة طفري عالي (TMB-H). يمكن استعمال كيترودا لدى البالغين والأطفال لعلاج:
 - أورام صلبة التي قد انتشرت أو لا يمكن إزالتها عن طريق عملية جراحية (سرطان متقدم)، و
 - تلقيت علاجًا ضد السرطان، ولم يعمل أو أنه لم يُعد يعمل، و
 - لا توجد لديك إمكانيات علاج مرضية.
- من غير المعروف فيما إذا كان كيترودا آمنًا وناجحًا لدى الأطفال مع سرطانات H-TMB في الدماغ أو الحبل الشوكي (سرطانات الجهاز العصبي المركزي).
- سرطان جلد من نوع سرطانة (كارسينومه) جلدية للخلايا الحرشفية (SCC). يمكن استعمال كيترودا عندما يكون سرطان الجلد لديك:
 - قد عاد أو انتشر، و
 - لا يمكن شفاؤه عن طريق عملية جراحية أو أشعة.
- سرطان ثدي من نوع ثلاثي- السلبية (Triple-Negative Breast Cancer, TNBC).
- من الممكن استعمال كيترودا بدمجه مع أدوية العلاج الكيميائي كعلاج قبل الجراحة ثم المواصلة بكيترودا لوحده كعلاج بعد الجراحة عندما:
 - يوجد لديك سرطان ثدي في مرحلة متقدمة، و
 - كنت في إختصار مرتفع لعودة سرطان الثدي لديك.
- من الممكن استعمال كيترودا بدمجه مع أدوية العلاج الكيميائي عندما يكون سرطان الثدي لديك:
 - قد عاد وليس بالإمكان إزالته عن طريق عملية جراحية أو أنه قد انتشر، و
 - هو إيجابي لـ "PD-L1".

الفصيلة العلاجية: مضاد الورم، جسم مضاد أحادي التسلية مؤنسن.

**2. قبل استعمال كيترودا
لا يجوز استعمال كيترودا:**

إذا كنت حساساً (أرجيًّا) للمادة الفعالة (بيمبروليزوماب)، أو لأيٍ واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (لائمة المركبات الغير فعالة، انظر للبند 6).

2.1 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال كيترودا قبل بدء العلاج بكيترودا، أخبر طبيبك إذا:

- كانت لديك مشاكل في جهاز المناعة على سبيل المثال مرض كرون، التهاب القولون التقرحي، أو الذئبة
- خضعت لزرعأعضاء، على سبيل المثال كلية أو كبد
- خضعت أو أنك تخطط للخضوع لزرع خلايا جذعية من متبرع (حقيقي)
- كانت لديك مشاكل في الرئتين أو في التنفس
- كانت لديك مشاكل في الكبد
- تلقيت علاجاً إشعاعياً لمنطقة صدرك
- كانت لديك حالة طبية التي تؤثر على الجهاز العصبي الخاص بك، مثل وهن عضلي وبيل (myasthenia gravis) أو متلازمة غيلان-باريه (Guillain-Barré syndrome)
- كانت لديك أية مشاكل طبية أخرى
- كنت حاملاً أو تخططين للدخول في حمل (انظر للبند 2.5 "الحمل، الإرضاخ والخصوصية")

2.2 الأطفال والمرأهقون

كيترودا مُخصص للأطفال والمرأهقين تحت جيل 18 للورم الميلانيني، لمفومة الخلية البائية المنصفية الأولية (PMBCL)، سرطانة (كارسينومه) خلايا ميركل (MCC)، سرطان MSI-H أو dMMR، أو سرطان TMB-H، وذلك لأنه تم إثبات سلامة ونجاعة الاستعمال لدواعي الاستعمال هذه لدى الأطفال.

2.3 فحوصات ومتابعة

خلال العلاج بكيترودا، سوف يجري لك طبيبك فحوصات دم وذلك للتحقق فيما إذا كانت لديك أعراض جانبية.

2.4 التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

2.5 الحمل، الإرضاخ والخصوصية

• الحمل

قبل أن تلتقي كيترودا، أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للدخول في حمل.

○ كيترودا قد يضر بجنينك.

النساء القادرات على الحمل:

○ سوف يأمر طبيبك بإجراء فحص حمل قبل أن تبدأ العلاج بكيترودا.

○ عليك استعمال وسيلة منع حمل ناجحة لمنع الحمل خلال العلاج وخلال 4 شهور بعد الجرعة الأخيرة من كيترودا. تحدي مع طبيبك بشأن وسائل لمنع الحمل التي يمكنك استعمالها خلال هذا الوقت.

○ أخبر طبيبك فوراً إذا كنت تعقيني بأنك قد تكونين حاملاً أو إذا كنت قد دخلت في حمل خلال العلاج بكيترودا.

• الإرضاخ

قبل أن تلتقي كيترودا، أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاخ.

○ من غير المعروف فيما إذا كان كيترودا ينتقل إلى حليب الأم الخاص بك.

○ لا يجوز الإرضاخ خلال العلاج بكيترودا ولمدة 4 شهور بعد الجرعة الأخيرة من كيترودا.

3. كيف تستعمل كيترودا؟

يجب دائماً استعمال كيترودا وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة ومدة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط.

• سوف يعطي كيترودا لك داخل الوريد من قبل طبيبك، بواسطة أنبوب داخل الوريد لمدة 30 دقيقة.

• يعطى كيترودا بشكل عام كل 3 أسابيع.

• سوف يقرر طبيبك كم علاجاً تحتاج.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا نسيتأخذ كيترودا

إذا فوتت أي من المواعيد، تحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحديد موعد جديد لك.

إذا توقفت عن تناول كيترودا

قد يؤدي إيقاف علاجك إلى إيقاف فعالية الدواء. لا توقف علاجك بكيترودا إلا إذا استشرت طبيبك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية متعلقة باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كل أي دواء، قد يسبب استعمال كيترودا أعراضًا جانبيةً لدى جزء من المستخدمين.

لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعارى مع أي واحد منها.

كيترودا هو دواء الذي قد يعالج أنواع سرطان معينة عن طريق تفعيل جهازك المناعي.

قد يسبب كيترودا لجهازك المناعي بأن يهاجم أعضاء وأنسجة سليمة في كل منطقة في جسمك وأن يؤثر على طريقة عملها. قد تتحول هذه المشاكل أحياناً إلى وخيمة أو مهددة للحياة وقد تؤدي للموت. قد تختبر أكثر من مشكلة واحدة، من هذه المشاكل، في ذات الوقت. قد تحدث هذه المشاكل في أي وقت خلال العلاج أو حتى بعد أن انتهت علاجك.

تحدد أو التق بطبيبك فوراً، إذا كنت تطور أعراضًا أي كانت للمشاكل التالية أو أن هذه الأعراض تتفاقم:

- مشاكل في الرئة (**التهاب في نسيج الرئة**). أعراض الالتهاب في نسيج الرئة يمكن أن تشمل:
ضيق تنفس؛ ألم في الصدر؛ سعال.
- مشاكل في الأمعاء (**التهاب القولون**) التي قد تسبب تمزقات أو ثقوب في أمعائك. علامات وأعراض التهاب القولون يمكن أن تشمل:
إسهال (براز رخو أكثر من المعتاد) أو نشاط معوي أكثر توافقاً من المعتاد؛ براز بلون أسود، شبيه بالقطaran، ذيق، أو دموي أو مخاطي؛ ألم وخيم أو حساسية وخيمة في منطقة البطن.
- مشاكل في الكبد (**التهاب الكبد**). علامات وأعراض التهاب الكبد يمكن أن تشمل:
اصفرار جلدك أو الجزء الأبيض في العينين؛ غثيان وخمى أو تقيؤ؛ ألم في الجانب الأيمن من منطقة البطن؛ بول داكن (بلون الشاي)؛ شعور بالجوع أقل من المعتاد؛ تزيف أو ظهور كدمات بسهولة أكثر من المعتاد.
- مشاكل في الغدد الهرمونية (**خاصة الغدة الدرقية، الثيامية، الكظرية والبنكرياس**). العلامات والأعراض بأن غدتك الهرمونية لا تعمل بشكل صحيح يمكن أن تشمل:
نبض سريع؛ ارتفاع أو انخفاض في الوزن؛ تعرق مفرط؛ إرهاق شديد؛ شعور مفرط بالجوع أو بالعطش أكثر من المعتاد؛ تبول في أحيان أقرب من المعتاد؛ تساقط الشعر؛ شعور بالبرد؛ إمساك؛ تغاظل الصوت؛ آلام عضلات؛ شعور بالوهن الشديد؛ دوخة أو إغماء؛ آلام رأس التي لا تقتضي أو ألم رأس غير اعتيادي؛ حساسية للضوء في العين؛ مشاكل في العين؛ تغيرات في السلوك أو في المزاج، على سبيل المثال انخفاض بالرغبة الجنسية، سخط أو نسيان.
- سكري من نوع 1، بما في ذلك **الحمض الكيتوني** (حمض في الدم الذي ينتج في أعقاب السكري)، قد تشمل الأعراض شعور بالجوع بشكل متزايد أو العطش أكثر من المعتاد، أو الحاجة إلى التبول في فترات متقاربة أو فقدان الوزن، الشعور بالتعب أو شعور بالغثيان، ألم بطن، تنفس سريع وعميق، ارتباك، نعاس غير معتاد، رائحة حلوة لنفسك، طعم حلو أو معندي في فمك، أو رائحة مختلفة للبول أو العرق لديك.

مشكل في الكلية، بما في ذلك التهاب كلّي وفشل كلوي. علامات لمشاكل في الكلية يمكن أن تشمل:

تغير في كمية أو في لون بولك؛ انتفاخ الكاحلين لديك؛ فقدان الشهية.

مشاكل في الجلد. علامات لمشاكل في الجلد يمكن أن تشمل:

طفح؛ حكة؛ حويصلات، تقرّن أو جروح في الجلد؛ جروح أو تقرّن مؤلمة في فمك أو في الأنف، في الحلق أو في منطقة أعضائك التناسلية؛ حمى أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا؛ انتفاخ في العقد اللمفاوية.

قد تظهر أيضاً مشاكل في أعضاء أخرى وفي أنسيات أخرى. هذه ليست كل العلامات والأعراض لمشاكل في جهاز المناعة التي قد تظهر عقب استعمال كيترودا. توجه إلى طبيبك بشكل فوري في حال وجود عرض جديد أو عرض يتفاقم الذي يمكن أن يشمل:

- ضيق تنفس، نبض غير منتظم، شعور بالتعب، انتفاخ الكاحلين، أو ألم في الصدر (التهاب عضلة القلب)
- ارتباك، نعاس، حمى، وهن عضلات، مشاكل توازن، غثيان، تقيؤ، تبiss في العنق، تغيرات في السلوك أو في المزاج، مشاكل ذاكرة، أو اختلالات (**التهاب الدماغ**)، ألم، انتفاخ عضلات، خدر، وخز، أو اخدرار في اليدين أو الساقين، أو مشاكل في المثانة البولية أو في الأمعاء، بما في ذلك الحاجة للتبول في أحيان أكثر تكراراً، تسرب البول، صعوبة في التبول، أو الإمساك (**التهاب النخاع - myelitis**، عملية التهابية على طول الجبل الشوكي)،
- تغيرات في حدة البصر، تغيرات في الرؤية، ألم في العين (**Sarcoidosis** - ساركوبود)
- آلام وخيمة أو مستمرة في العضلات أو في المفاصل، وهن عضلات وخيم
- تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر دم)، ظهور كدمات
- انتفاخ في العقد اللمفاوية، طفح أو كتل حساسة في الجلد، سعال
- ردود فعل للتسرير (داخل الوريد)، التي قد تكون أحياناً وخيمة ومهددة للحياة. علامات وأعراض ردود الفعل للتسرير يمكن أن تشمل:
قشعريرة أو ارتجاف؛ ضيق تنفس أو أزيز؛ حكة أو طفح؛ تورّد؛ دوخة؛ حمى؛ شعور بالإغماء، ألم ظهر.

رفض الأعضاء المزروعة. قد يكون الأشخاص الذين خضعوا لزرع الأعضاء ذوي احتطار متزايد لرفض العضو المزروع. يجب على طبيبك القول لك عن أي علامات وأعراض عليك التبليغ، وهو سوف يقوم بالمتابعة، وفقاً لنوع زرع الأعضاء الذي كان لديك.

تعقيقات، بما في ذلك داء الطُّعْم حيال التُّوَي (GVHD). لدى الأشخاص الذين خضعوا لزرع نفی العظم (خلايا جذعية) من متبرع (ثيفي). قد تكون هذه التعقيقات وخيمة وتؤدي للموت. قد تحدث هذه التعقيمات إذا خضعت لزرع قبل أو بعد أن عولجت بكيرودا. سوف يقوم طبيبك بالمتابعة للتعرف على العلامات والأعراض التالية: طفح في الجلد، التهاب الكبد، ألم في منطقة البطن، وإسهال.

تجوّه فوري لتلقي علاج طبي قد يساهم في منع تفاقم هذه المشاكل.
سوف يفحصك طبيبك بخصوص هذه المشاكل أثناء العلاج بكيرودا. من المحتمل أن يعالجك طبيبك بأدوية كورتيكosteroides أو بدائل هرمونية. من المحتمل أن يؤجل طبيبك أو يوقف كلّا العلاج بكيرودا، إذا كانت لديك أعراضًا جانبيةً وخيمة.

الأعراض الجانبية الشائعة جداً لكيترودا عندما يعطى بمفرده تشمل:

(تم التبليغ عنها لدى أكثر من 10% من المُتعالجين)

عام: شعور بالتعب، حمى، وهن، انخفاض في الوزن، ألم، مرض شبيه بالإنفلونزا

الجلد والنسيج تحت الجلد: طفح، تغير لون الجلد، حكة، انتفاخ الذراعين أو الساقين، انتفاخ الوجه

الجهاز الهضمي: إمساك، إسهال، غثيان، ألم في منطقة المعدة (البطن)، ارتفاع في إنزيمات الكبد في الدم، تقيؤ، صعوبات في البلع

العضل-هيكل العظمي والنسيج الضام: ألم في المفصل، ألم ظهر، ألم في العضلات، في العظام أو في المفاصل

الجهاز التنفسـي، الصدر والمنتصف (mediastinum): سعال، ضيق تنفس

الأيض والتغذية: انخفاض الشهية، انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم

الجهاز الهرموني: مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية، مستويات مرتفعة من هرمون الغدة الدرقية

عدوى: عدوى في المسالك التنفسية العلوية، عدوى في المسالك البولية، عدوى (باستثناء العدوى في المسالك البولية)

الجهاز العصبي: ألم رأس، دوخة، التهاب الأعصاب الذي قد يسبب ألمًا، وهذا وشلل الذراعين والساقين

القلب: نظم قلب غير منتظم

جهاز البول والكلية: ارتفاع في مستوى الكرياتينين في الدم، دم في البول، مشاكل في الكلية

الدم والجهاز الليمفاوي: انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء

الأوعية الدموية: تزيف

الكبد والمرارة: مشاكل في الكبد

الأعراض الجانبية الشائعة لكيترودا عندما يعطى بمفرده تشمل:

(تم التبليغ عنها لدى 1% حتى 10% من المُتعالجين)

الأعراض المرتبطة بإعطاء الدواء بالتسريب (Infusion reactions), التهاب الرئتين، التهاب العينين، التهاب العضلات، التهاب غشاء

القلب، التهاب الغدة الدرقية، تراكم سائل حول القلب، التهاب مفاصل، تقرحات في الفم، ألم في العنق، أرق، إصابة كلوية فجائحة.

الأعراض الجانبية غير الشائعة لكيترودا عندما يعطى بمفرده تشمل:

(تم التبليغ عنها لدى أقل من 1% من المُتعالجين)

التهاب الحبل الشوكي والتهاب عضلة القلب.

الأعراض الجانبية لكيترودا عندما يعطى بمفرده والتي تكون أكثر شيوعاً لدى الأطفال مما هي عليه لدى البالغين تشمل:
حرقة، تقيؤ، ألم رأس، ألم في منطقة البطن وانخفاض في مستويات خلايا الدم البيضاء، الصفائح وخلايا الدم الحمراء (فقر دم).

الأعراض الجانبية الشائعة جداً لكيترودا عندما يعطى بتوليفة مع أدوية معينة للعلاج الكيميائي تشمل:

(تم التبليغ عنها لدى أكثر من 10% من المُتعالجين)

الجهاز الهضمي: غثيان، إمساك، تقيؤ، صعوبات في البلع، ألم في منطقة المعدة (البطن)

عام: شعور بالتعب، حمى، انخفاض في الوزن

الأيض والتغذية: انخفاض الشهية

الجهاز الهرموني: مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية

عدوى: عدوى في المسالك التنفسية العلوية

العضل-هيكل العظمي والنسيج الضام: ألم في العنق، ألم في المفصل وفي العضل

الجلد والنسيج تحت الجلد: طفح، تساقط الشعر، انتفاخ في الغشاء المخاطي للفم، الأنف، العينين، الحلق، المعي أو المهبل، وتقرحات في الفم

جهاز التنفسـي، الصدر والمنتصف (mediastinum): سعال، ضيق تنفس

الجهاز العصبي: التهاب الأعصاب الذي قد يؤدي إلى ألم، وهن وشلل الذراعين والساقين، ألم رأس، دوخة وأرق.

أعراض جانبية شائعة جداً لكيترودا عندما يعطى بتوليفة مع أدوية العلاج الكيميائي وبيفاسيزوماب تشمل:

(تم التبليغ عنها لدى أكثر من 20% من المُتعالجين)

الجهاز العصبي: وخز، أو قلة الإحساس في اليدين أو الرجلين

الجلد والنسيج تحت الجلد: تساقط الشعر، طفح جلدي
الدم والجهاز الليمفاوي: انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء، انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء، انخفاض في عدد الصفائح الدموية
عام: شعور بالتعب أو الضعف
الجهاز الهضمي: غثيان، إسهال، إمساك، تقيؤ
الأوعية الدموية: ضغط دم مرتفع
العضل-الهيكل العظمي والنسيج الضام: ألم في المفصل
عدوى: عدوى في المسالك البولية
الجهاز الهرموني: مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية
الأيض والتغذية: انخفاض الشهية

الأعراض الجانبية الشائعة جداً لكيترودا عندما يعطى بتناوله مع إكسينتنيب تشمل:
 (تم التبليغ عنها لدى أكثر من 20% من المُتعالجين)
الجهاز الهضمي: إسهال، غثيان، إمساك
عام: شعور بالتعب أو الوهن
الأوعية الدموية: ضغط دم مرتفع
الכבד والمرارة: مشاكل في الكبد
الجهاز الهرموني: مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية
الأيض والتغذية: انخفاض في الشهية
الجلد والنسيج تحت الجلد: حويصلات أو طفح في كفات يديك وقدميك، تقرحات في الفم أو انفاس في الغشاء المخاطي للفم، الأنف، العينين، الحلق، الأمعاء أو المهبل، طفح
الجهاز التنفسـي، الصدر والمنتصف (mediastinum): بحة، سعال

الأعراض الجانبية الشائعة جداً لكيترودا عندما يعطى بتناوله مع لينفـاتـينـيب تشمل:
 (تم التبليغ عنها لدى أكثر من 20% من المُتعالجين)
عام: الشعور بالتعب، انخفاض في الوزن
الجهاز الهضمي: إسهال، تقرحات في الفم، غثيان، ألم في منطقة المعدة (البطن)، تقيؤ، إمساك
العضل-الهيكل العظمي والنسيج الضام: ألم في المفصل وفي العضل
الجهاز الهرموني: مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية
الأوعية الدموية: ضغط دم مرتفع، تزيف
الأيض والتغذية: انخفاض الشهية
الجلد والنسيج تحت الجلد: طفح، حويصلات أو طفح في كفات يديك وقدميك
الجهاز التنفسـي، الصدر والمنتصف (mediastinum): بحة
الجهاز البولي والكلوي: زلال في بولك، مشاكل في الكلية
حالات عدوى: عدوى بالمسالك البولية
الכבד والمرارة: مشاكل في الكبد
الجهاز العصبي: ألم رأس

هذه ليست كل الأعراض الجانبية الممكنة لكيترودا. لمعلومات إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
 أخبر طبيبك إذا كان لديك أي عرض جانبي الذي يزعجك أو أنه لا ينتهي.
 إذا ظهر عرض جانبي، إذا ناقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعايني من عرض جانبي الذي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيبك.

التبليغ عن الأعراض الجانبية
 يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف تخزن كيترودا؟

- تحجب التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال كيترودا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المذكور على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- **شروط التخزين:**

- كيترودا 100 ملغ/4 مل محلول مركز للتسريب داخل الوريد: يجب تخزين القوارير بالتبريد في 2 حتى 8 درجات مئوية في الكرتونة الأصلية، وذلك للوقاية من الضوء. لا يجوز التجميد. لا يجوز الخضن.
- لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف تتخلص من الأدوية التي لا تستعمل بعد. هذه الوسائل سوف تساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

6.1 على ماذا يحتوي كيترودا المادة الفعالة: پيمبروليزوماب المركبات الغير فعالة:

كيترودا 100 ملغ/4 مل محلول مركز للتسريب داخل الوريد:

Water for injection, sucrose, L-histidine, polysorbate 80.

6.2 كيف يبدو كيترودا وما هو محتوى العبوة

كيترودا 100 ملغ/4 مل محلول مركز للتسريب داخل الوريد هو محلول صاف حتى براق بعض الشيء، عديم اللون حتى أصفر بعض الشيء.

كيترودا 100 ملغ/4 مل محلول مركز للتسريب داخل الوريد يُسوق بكرتونة التي تحتوي على قارورة واحدة من 100 ملغ/4 مل (25 ملغ/مل) للاستعمال لمرة واحدة.

6.3 صاحب التسجيل والمُستورد

شركة ميراك شاري ودوهم (إسرائيل – 1996) م.ض.، هشارون 34، هود-هشارون.

تم التنفيذ في شباط 2024 وفقاً لنتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 154.38.34448

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.