

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

فوريكونازول تيفع جديد

أقراص مطلية

تحتوي كل قرص مطلي على:

فوريكونازول 200 ملغ

Voriconazole 200 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الشرة انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه لأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بد ذلك ان حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

فوريكونازول تيفع عبارة عن دواء مضاد للفطريات، واسع الطيف ومصنص لعلاج:

- داء الرشاشيات الغزوي (تلوث تسببه فطريات من نوع الرشاشيات).
- تلوثات المبيضات (كانديدا) في الجهاز الدموي (وجود المبيضات في الدم) لدى المرضى غير المصابين بقلة العدلات.
- تلوثات المبيضات الغزوية المقاومة لفئوركونازول (دواء آخر مضاد للفطريات) بما في ذلك *C. Krusei*.
- التهلوثات الفطرية الخطيرة التي تسببها فطريات من النوعين *Fusarium* و *Scedosporium*.

فوريكونازول تيفع مخصص للمرضى المصابين بتلوثات فطرية خطيرة، بل ربما تشكل خطراً على الحياة.

فوريكونازول تيفع مخصص لمنع التلوثات الفطرية الغزوية لدى الأشخاص الذين خضعوا لزراعة النخاع العظمي والمعرضين

لخطر عالية:

الخطورة العلاجية:

مضاد الفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو إيقاف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب التلوثات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء، انظر البند 6.

لا يجوز استعمال هذا الدواء مع تيريفينادين (الأرجية)، الفينيتويل (الأرجية)، سيبرابريد (للمشاكل في المعدة)، بيوموزيد (للمشاكل النفسية)، كينيدين (للمشاكل في نظم القلب)، إيفبرادين (لعلاج قصور القلب المزمن)، ريفامبين (لعلاج الملء)، ريفامبيستين (لعلاج السل)، كاربامازيبين (لعلاج الاختلاجات)، فينوباربیتال (لعلاج الاختلاجات والأرق الشديد)، مشتقات الإبروجوت (إبروجتامين، مديبيدرو إبروجتامين، العلاج الصناع العصقي)، سيروليموس (لدى المرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)، إيفابيريزي بجرعة دوامية مقدارها 400 ملغ فما فوق تعطى مرة واحدة في اليوم (لعلاج HIV)، ريتونايفر بجرعة دوامية مقدارها 400 ملغ فما فوق في كل مرة تجرى مرتين في اليوم (لعلاج HIV)، نبتة العرن (St. John's Wort)، ميسكوجلول (لعلاج الإسهال الناتج تحديداً من استعمال مسكنات الألم من نوع الأفيونيات مثلًا مورفين، أوكسيكودون، فينتانيل، ترامادول، كودينين)، تولفايتان (لعلاج نكص الصوديوم في الدم (المستويات المنخفضة للصوديوم في الدم) أو يستعمل لإطعام التئني في وظيفة الكليتين لدى متلقي النخاع المصابين بداء الكلىة المتقدمة (الكبيبات)، لوراسيدون (لعلاج الاكتئاب)، فينيوتوكلاس (لعلاج متلقي العلاج المصابين بامبيضاض الدم البقولي المزمن-CLL).

قبل العلاج بفوريكونازول تيفع، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي على مستحضرات من فصيلة الأزولات.
- كنت تعاني من مرض في عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب)، نظم قلبي غير منتظم أو بطيء، أو من شذوذ في مخطط كهربية القلب (أي كي جي) يسمى "متلازمة QTc الطويلة".

كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من مرض في الكبد. سيرايق الطبيب وظائف الكبد عن طريق إجراء فحوص للدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يجب الانتعاع عن أي ضوء شمس وعن التعرّض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واقٍ ذي معامل وقاية (SPF) عالية، لأنه قد تزداد حساسية الجلد لإشعاع الشمس (UV). تتزايد هذه الحساسية بشكل أكبر عن طريق أدوية أخرى تزيد من الحساسية للضوء، مثل ميثوتريكسات. ينطبق هذا التحذير أيضاً على الأواد.

أثناء استعمال الدواء، أخبر الطبيب بشكل فوري إذا تطور لديك: حرق شمسي، طفح جلدي شديد أو حويصلات في الجلد، الألم في العظام.

- إذا ظهر أحد هذه الأعراض الجلدية، فقد يحيلك الطبيب إلى الطبيب الجلد. هناك احتمال ضئيل لتطور سرطان الجلد عند استعمال الدواء الأمد لفوريكونازول تيفع.
- إذا تطورت لديك علامات على "فشل الغدة الكظرية"، وهي حالة طبية لا تقوم الغدتان الكظريتان فيها بإنتاج كميات كافية من هرمونات ستيرويدية معينة مثل كورتيزول، مما قد يسبب أعراضاً مثل التعب المزمن أو المتواصل، ضعف العضلات، فقدان الشهية، نقصان الوزن، الأم البطن، فيرجى إخبار الطبيب.
- إذا تطورت لديك أعراض "متلازمة كوشينج" التي ينتج الجسم فيها فائضاً من هرمون الكورتيزول الذي قد يؤدي إلى أعراض مثل: ارتفاع ارتقاع الزرع، نسيج دهني بين الكليتين، وجه مستدير، إمتعاق الجلد في البطن، في الفخذين، في الذنابين وفي الذراعين، جلد رقيق، ميل إلى التكدس بسهولة، سكر مرتفع في الدم، فرط الشعر، فرط التعرق، فيرجى إخبار الطبيب.
- سيرايق الطبيب وظائف الكبد والكليتين عن طريق إجراء فحوص الدم خلال فترة العلاج بفوريكونازول تيفع.
- قبل البدء بالعلاج وخلاله يجب إجراء مراقبة للأضطرابات في مستويات الكهارل مثل المستويات المنخفضة للبيوتاسيوم، المغنيزيوم والكالسيوم.

الأواد والمرافقون

هذا الدواء غير مخصص للولاد والأطفال الرضع الذين عمرهم أقل من عامين.

الفحوص والمتابعة

بما أن فوريكونازول تيفع يؤثر على الكبد والكليتين، فسيرايق الطبيب وظيفة الكبد والكليتين عن طريق إجراء فحوص الدم. يرجى إخبار الطبيب إذا أحسست بالألم البطن أو إذا كان هناك تغير في قوام البراز.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فإخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصة إذا كنت تستعمل:

أدوية يجب الانتعاع قدر الإمكان عن استعمالها بالدمج مع فوريكونازول تيفع وذلك حاجة إلى ملامعة الجرعة الدوائية إذا تم إعطاؤها سوية معه:

- فيتونيتول (لعلاج الصرع). إذا كنت تستعمل هذا الدواء فيجب مراقبة مستوى فيتاميني في الدم.
- ريتونايفر (HIV) بجرعة دوامية منخفضة مقدارها 100 ملغ مرتين في اليوم. لا يمكن تناول جرعة دوامية معينة من ريتونايفر مع فوريكونازول تيفع. انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.
- جلاندسيبيب (لعلاج السرطان) - إذا تعين عليك استعمال الدواءين، فسيرايق الطبيب نظم القلب في أحيان أكثر تقاربًا.
- دمج فوريكونازول تيفع مع الأدوية التالية قد يتسبب ملامعة الجرعة الدوائية والمتابعة لتلك من الآن والأدوية و/أو فوريكونازول تيفع لا تزال ذات التأثير المرغوب به.
- ولفارين ومضادات التخثر الأخرى (مثل فينبروكومون، أسينوكومارول)
- سيكلوسبورين، تاكروليموس (للمرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- أدوية من نوع سولفونيل يوريا (مثل تولوتاميد، جليبيزيد وجليبوريد) (لعلاج السكري)
- ستيرويدات (مثل أتورفاستاتين، سيمفاستاتين، لوفاستاتين) (لخفض مستويات الكوليسترول)

- بينزوديازيبينات (مثل ميدازولام، الأليزولام وتريازولام) (لعلاج الأرق الشديد والتهندة)
- أوميبرازول (لعلاج قرحة المعدة)
- حويب منع الحمل (قد تنشأ أعراض جانبية مثل الغثيان والأضطرابات في الدورة الشهرية)
- مشتقات فينكا (مثل فينكريستين، فينبلاستين) (لعلاج السرطان)
- مئطبات تيروزين كيناز (مثل: أكسيتينيب، بوسوتينيب، كابوزاتينيب، سيريتينيب، كويميتينيب، دابرافينيب، دازاتينيب، نيلوتينيب، سونيتينيب، إيروتينيب، ريبوسيكليد) (لعلاج السرطان)
- تريبتونين (لعلاج امبيضاض الدم)
- إيندينايفر والمئطبات الأخرى للإزيم HIV بروتياز (لعلاج HIV)
- أدوية من فصيلة NNRTI لعلاج HIV (مثل ديلافيردين، فيغيفارابين، إيفابيريز) (لا يمكن تناول جرعات دوامية معينة من إيفابيريز مع فوريكونازول تيفع، انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند)
- مئدادون (لعلاج الإلحمان)
- الأفيونات القصيرة الأمد (مثل أفينتانيل، فينتانيل، سوفينتانيل) (مسكنات للألام في الإجراءات الجراحية)
- أوكسيكودون وهيدروكودون (لتسكين الآلام المتوسطة إلى الشديدة)

أدوية مضادة للالتهاب الستيرويدية (مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك) (لعلاج الألم والالتهاب)
فلوركونازول (لعلاج التلوثات الفطرية)
إيفيروليموس (لعلاج السرطان المتقدم في الكلية ومتلقي العلاج الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
ليتيرموفير (لمنع مرض يسببه الفيروس المضخم للخلايا (CMV) بعد زراعة النخاع العظمي)
إيفاكافتور (لعلاج التليف الكيسي (CF))
فلوكوكساسيبيلين (مضاد حيوي يستعمل لعلاج التلوثات الجرثومية)

للحصول على قائمة الأدوية التي لا يجوز استعمالها بالتزامن مع فوريكونازول تيفع، انظر رجاء "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، إلا إذا تلتقيت تعليمات صريحة من الطبيب. يجب على النساء في سن الخصوبة أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل أثناء استعمال الدواء. إذا حملت أثناء استعمال فوريكونازول تيفع فراجع الطبيب فوراً. إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فظنني أنك حامل أو تحططين للحمل، فاستشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

السيفاة واستعمال الماكنت

قد يسبب فوريكونازول تيفع توتشواً في الرؤية أو حساسية للضوء. إذا تأثرت من ذلك فلا يجوز السيفاة أو تشغيل الماكنت الخطرة. بالنسبة للولاد فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي القرص على اللاكتوز ولذلك إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل استعمال الدواء.

يحتوي القرص على أقل من 1 ميليول (23 ملغ) من الصوديوم، أي أنه يعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دوماً بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط. سيتم تحديد الجرعة الدوائية استنادًا إلى وزنك وإلى نوع التلوث. اعتمادًا على استجابتك للعلاج، قد يرفع الطبيب أو يخفض الجرعة الدوائية اليومية.

إذا كان لديك مرض في الكبد، فقد يقلل لك الطبيب الجرعة الدوائية.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!

إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل فوريكونازول تيفع لمنع التلوثات الفطرية، قد يوقف الطبيب العلاج إذا نشأت لديك أو لدى ولدك أعراض جانبية مرافقة للعلاج.

- يجب إعطاء الأقراص فقط إذا كان الولد قادرًا على بلع الأقراص.

يجب تناول القرص قبل وجبة الطعام بساعة أو بعدها بساعة على الأقل. يجب بلع القرص بأكمله مع القليل من الماء. عند عدم وجود خط للشطر - يمنع شطر القرص. لا تتوفر

معلومات بالنسبة للهرس الموضعي.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

قد تشعر بحساسية مزيادة للضوء نتيجة للتناول المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء

من المهم تناول الدواء كل يوم في نفس الساعة. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة المنسية. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

يجب الاستمرار في استعمال الدواء إلى أن يردشك الطبيب إلى التوقف عن ذلك. إذا توقفت عن استعمال الدواء في وقت مبكر، فقد يستمر التلوث أو قد يعود. قد يتسبب الأمر علاجًا طويل الأمد لمنع معاردة التلوث لدى متلقي العلاج ذوي الجهاز المناعي المضعف أو المصابين بتلوثات صعبة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال فوريكونازول تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تعلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية خطيرة - يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب في الحالات التالية:

- طفح جلدي
- يرقان؛ تغير في نتائج فحص وظائف الكبد في فحص الدم
- التهاب في البنكرياس (بانكريايتيس)
- أعراض جانبية أخرى**
- أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى أكثر من شخص 1 من بين 10 أشخاص):
- خلل في الرؤية (تغيرات في الرؤية، بما في ذلك: رؤية مشوشة، تغيرات في الألوان، حساسية مزيادة للضوء، عسى الألوان، خلل في العين، رؤية هالة ضوئية، عسى ليلى، اهتزازية في الرؤية، رؤية شرارات، رؤية أورة، انقراض في حدة الرؤية، إبهار ضوئي، تقلص مجال الرؤية، بقع/نقاط في مجال الرؤية)
- حصى مرتفعة
- طفح جلدي
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- انتفاخ في الأطراف
- الألم البطن
- صعوبات في التنفس
- ارتفاع في أنزيمات الكبد
- أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 10 أشخاص):
- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب في اللثة، شعيرية، ضعف مستوى منخض، يشمل المستوى المنخفض بشكل خطير، لجزء من خلايا الدم الحمراء و/أو البياض (أحيانًا مصحوب بالحمى)، مستوى منخفض للمفصالح الدموية التي تساعد على تحثّر الدم
- مستوى منخفض للسكر في الدم، مستوى منخفض للبيوتاسيوم في الدم، مستوى منخفض للصوديوم في الدم
- قلق، تملل، اكتئاب، ارتباك، صعوبات في النوم، هلوسات
- اختلاجات، ارتعاج أو حركات لا إرادية في العضلات، إحصاس بالوخز أو أحاسيس جلدية غير عادية، ارتفاع في التوتر العصبي، ميل إلى النوم، دوام
- نزيف دموي في العين
- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك النبض السريع/البيطيء جدًا، إعماه
- ضغط دم منخفض، التهاب الأوردة (الالتهاب الوريدي)

- صعوبات شديدة في التنفس، ألم في الصدر، انتفاخ في الوجه (الغم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين (إسماك، صعوبات في الهضم، التهاب في الشفتين
- يرقان، التهاب في الكبد (هيباتيتيس) وتضور الكبد
- طفوح جلدية قد تسبب تشوشًا خطيرًا في الجلد وحويصلات جلدية تتميز بمطقة حمراء ومسطحة في الجلد ومغطاة بنتوءات صغيرة متصلة ببعضها، احمرار الجلد
- حكة
- تساقط الشعر
- ألم في الظهر

قتل كلوي، دم في البول، تغيرات في فحوص وظيفة الكليتين حروق شمسية أو رد فعل جلدي خطير نتيجة للتعرض للضوء أو للشمس

سرطان الجلد

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص):

أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تيجح و التهاب في الجهاز الهضمي، التهاب في الجهاز الهضمي يسبب الإسهال، التهاب الأوعية الليمفاوية

التهاب في النسيج اللين الموجود في الجدار الداخلي للبطن والذي يعطي التجويف البطني

غدغ ليمفاوية متضخمة (أحيانًا مؤلمة)، فشل النخاع العظمي،

ارتفاع في مستوى اليوزينات في الدم

انخفاض في وظيفة الغدة الكظرية، قصور الغدة الدرقية

وظيفة غير سوية للدماغ، أعراض شبيهة بالباركينسون، تضمر عصبي يسبب الخدر، الألم، الوخز أو إحساس

بالاحتراق في الأطراف

مشكلة في التوازن أو في التنسيق الحركي

انتفاخ في الدماغ

رؤية مزدوجة، حالات خطيرة في العين تشمل: ألمًا والتهابًا في العينين والأفجان، حركية غير عادية للعين، ضررًا

للعصب البصري يسبب اضطرابًا في الرؤية، انتفاخًا في القرص البصري

انخفاض في الحساسية للمس

تغير في حاسة الذوق

اضطرابات في السمع، طنين في الأذنين، فيرتيجو (شعور بالدوار)

التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، انتفاخ و التهاب في البنوع

تضخم الكبد، فشل كبدي، حصى أو مرض في حويصلة المرارة

التهاب المفصل، التهاب الأوردة المصحوب بتكون خثرة دموية (خثار)

التهاب في الكلى، بروتين في البول، ضرر لكلىة

تضخم قلبي سرية غير جدًا أو إنقاص دقات - مصحوب أحيانًا بتضخم كيربالية تبي ثابثة

تغيرات في مخطط كهربية القلب

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ارتفاع في اليوريا في الدم

رود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحيانًا) بما في ذلك الحالات الجلدية التي تشكل خطرًا على الحياة وتسبب ظهور حويصلات مؤلمة، حروق/تآليل في الجلد والأغشية المخاطية، خاصة في الفم، التهاب الجلد، شرى، جلد محمّر ومتينج، بقع حمراء أو بنفسجية في الجلد في أعقاب انخفاض تعداد الصفائح

الدموية، إيكزما

رد فعل تحسسي أو رد فعل شاذ للجهاز المناعي

التهاب النسيج المحيط بالمعلم

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 1,000 شخص):

فرط نشاط الغدة الدرقية

تدهور الوظيفة الدماغية (من المضاعفات الخطيرة لمرض في الكبد)

ضرر شديد للعصب البصري، تعكر في القرنية، حركات لا إرادية للعينين

ظهور حويصلات نتيجة للحساسية/التعرض للضوء

اضطراب بهاجم فيه الجهاز المناعي في الجسم جزءًا من الجهاز العصبي المحيطي

مشاكل في نظم أو موصلية القلب (أحيانًا تشكل خطرًا على الحياة)

رد فعل تحسسي يشكل خطرًا على الحياة

اضطراب في نظام التخثر في الدم

رود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحيانًا) بما في ذلك الانتفاخ السريع (وذمة) في الجلد، بقع متيرة للحكة أو مؤلمة

من الجلد المصبوغ المحمّر مع الشفرة، حكة في الجلد والأغشية المخاطية - حالة جلدية تشكل خطرًا على الحياة وتسبب انفصال أجزاء واسعة من الأدمة (طبقة الجلد الخارجية) عن طبقات الجلد السفلية

بقع جلدية مسطرة، جافة وحرشفية، أحيانًا متغلطلة مع "قرون"

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوها بعد):

تمش وبقع تصنع

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوها بعد)، لكنها مهمة ويجب التبليغ عنها للطبيب المعالج بشكل فوري:

منافق حمراء ومتقرشة في الجلد أو كدمات في الجلد شكلها شبيهة بالحلقة وقد تكون عرضًا لمرض مناعي ذاتي يسمى الذئبة الحمامية الجلدية

تواجد تيلغيات عن تطور سرطان الجلد لدى متلقي العلاج الذين استعملوا فوريكونازول لفترة طويلة.

شود بعد عنق شمسي أو رد فعل جلدي خطير، نتيجةً للتعرض للضوء أو الشمس، نبشوح أكبر لدى الأولاد. إذا نشأت لديك العدوى وكذلك اضطرابات في الجلد، فقد تمت إحالتك/إحالتته من قبل الطبيب

المعالج إلى طبيب الجلد، والذي سيقرر بعد المشورة ما إذا كان من المهم أن تحضر/تحمضر وذلك للتابعة بشكل منظم. شوه أيضًا ارتفاع في أنزيمات الكبد بشيوح أكبر لدى الأولاد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Lactose monohydrate, pregelatinised maize starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي، أبيض، مطوّل، على أحد جانبيه مطبوع "V" وعلى الجانب الآخر "200"

يسوق الدواء في عبوة بلبستر (شرائط حويصلات) تحتوي على 14، 28 أو 30 قرصًا مطليًا.

لا تسوق جميع أحجام المعبّات. **اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه:**

شارع بقره هانيثيقه 124، تل أبيب 6944020

تم تسجيل النشرة في كانون الثاني/يناير 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 168-36179-68

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

VORICONAZOLE TABS PIL MW0124

teva