



מרץ 2024

Esbriet® 267 mg and 801 mg Tablets (pirfenidone) **Film coated tablets**

רופא/ה יקר/ה, רוקח/ת יקר/ה,

חברת רוש פרמצטיקה (ישראל) בע"מ מבקשת להודיעיכם על מספר עדכונים בעליון לרופא ובעלן לצרכן של התכשירים המצוינים מעלה. בהודעה זו מצוינים רק עדכונים מהותיים ועדכונים אשר מהווים החמרה.

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Esbriet is indicated in adults for the treatment of mild to moderate Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF).

הסביר:

טיקסט עם קו תחתית מצין טיקסט שהוסיף לעליון.

~~טיקסט עפ-קו-חוצה~~ מצין טיקסט שהוסר מן העליון.

למידע נוסף יש לעיין בעלונים כפי שנשלחו למשרד הבריאות.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרטום במאגר התרופות שבמשרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על-ידי פניה לבעל הרישום: רוש פרמצטיקה (ישראל) בע"מ, ת.ד 6391, הוד השרון טלפונ 09-9737777. כתובתנו באינטרנט: www.roche.co.il.
4524079

ב בר כה,

DocuSigned by:
lavi ami-ad

Signer Name: lavi ami-ad
Signing Reason: I approve this document
Signing Time: 26-Mar-2024 | 7:54:38 AM CET
FF28F20D4ADF4DF28979E571CABD78A7

לביא עמי-עד

רוקח ממונה

DocuSigned by:
Avital Weisbrot

Signer Name: Avital Weisbrot
Signing Reason: I approve this document
Signing Time: 25-Mar-2024 | 2:37:38 PM CET
1EB311AC73A14811A6C1DBA417B19607

אביטל ויסברוט

מחלקה רישום



מרץ 2024

עדכוניים מהותיים בעליון לרופא:

בסעיף 4.4 Special warnings and precautions for use עודכן המידע הבא:

[...]

Severe skin reactions

Stevens-Johnson syndrome (SJS) and, toxic epidermal necrolysis (TEN), and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS), which can be life-threatening or fatal, have been reported post-marketing in association with Esbriet treatment. If signs and symptoms suggestive of these reactions appear, Esbriet should be withdrawn immediately. If the patient has developed SJS, TEN or TEN DRESS with the use of Esbriet, treatment with Esbriet must not be restarted and should be permanently discontinued.

[...]

Sodium

Esbriet contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially 'sodium-free'.

בסעיף 4.8 Undesirable effects עודכן המידע הבא:

Table 1 Adverse reactions by SOC and MedDRA frequency

[...]

Skin and subcutaneous tissue disorders	
Very Common	Rash
Common	Photosensitivity reaction; pruritus; erythema; dry skin; rash erythematous; rash macular; rash pruritic
Not Known	Stevens-Johnson syndrome ¹ ; toxic epidermal necrolysis ¹ ; <u>drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)</u> ¹

1. Identified through post-marketing surveillance (see section 4.4)

עדכוניים מהותיים בעליון לצרcker:

בסעיף 2. לפני השימוש בתרופה עודכן המידע הבא:

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

[...]

- תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעלני (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס) ותגובה תרופהית עם אזוזינופיליה ותסמים מערכתיים (DRESS) דוחו בקשר עם טיפול באסבריט. אם אתה מבחין באחד מהתסמים הקשורים בתגובה העור החמורות המתוארות בסעיף 4, הפסיק להשתמש באסבריט ופנה מיד לטיפול רפואי.



בסעיף 4. תופעות לוואי עודכן המידע הבא:

כמו בכל תרופה, השימוש באסבריט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיתם תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

הפסק ליטול אסבריט ידעו את הרופא ונונה לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי אם אתה סובל מבחן מהתופעות הבאות בסימן או כסמן כלשהו מה הבאים:

- נפיחות בפנים, בשפטים /או בלשון, גרד, סרפדת, קשי נשימה או צפוצים, או תחושת עילפון, שהם סימנים לאנגיאדמיה, תגובה אלרגית חמורה או אנפיפילקטיים.
- הצהבה של העיניים או של העור, שטן כהה, שייתכן שילו גם בגין גירוד בעור, כאב בחלק העליון מצד ימין של הבطن, אובדן תיאבון, הופעת דימומים או חבורות בקלות יותר מעבר או תחושת עייפות. אלה עלולים להיות סימנים לתפקוד כבד לקוי ויכולים להעיד על פגיעה כיבידית אשר הנה תופעת לוואי שאינה שכיחה לאסבריט.
- כתמים אדמדמים לא מוגבלים או עגולים באזורי הגוף, לעיתים קרובות עם שלפוחיות במרכזם, קילוף העור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניהם. פריחות עור חמורות אלו עשויות להופיע לאחר חום וتسمיניהם דמיי שפעת-טימפיט-טפסיט או עשושם להציג עלי [تسمונת סטיבנס-ג'ונסון או נמק אפיידרמי רעלני (טוקסיק אפיידרמל נקרוליזיס)].
- פריחה מפותחת, טמפרטורת גוף גבוהה ובלוטות לימה מגדלות (تسمונת הנקראט DRESS או تسمונת רגישות יתר לתרופות).