

## **ديكاپيتيل ديبو 22.5 ملغ مسحوق ومذيب لتحضير معلق للحقن العضلي**

**المادة الفعالة**

كل قنينة من ديكاپيتيل ديبو 22.5 ملغ تحتوي على 22.5 ملغ تريپتوريلىن (ك إمبونات).  
**22.5 mg triptorelin (as embonate)**

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر الفصل 2، البند "معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لك لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

### **1. لم أعد هذا الدواء؟**

هذا الدواء معد:

- لعلاج سرطان البروستات المتقدم، المتعلق بالهرمونات كعلاج بديل، إذا كانت الجراحة لاستئصال الخصية أو إعطاء الإستروجينات غير مستطب بها أو ليسا ملائمين للمتعالج
- لعلاج البلوغ الجنسي المبكر لدى الأطفال فوق جيل سنتين مع بدء البلوغ الجنسي قبل جيل 8 سنوات لدى البنات، وقبل جيل 10 سنوات لدى الأولاد

**المجموعة العلاجية:** نظير طويل المدى للهرمون الذي يحرّر چونادوتروبينات (موجهات الغدد التناسلية) (GnRH - Gonadotropin releasing hormone)

### **2. قبل استعمال الدواء**

يُمنع استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (الرجي) لтриپتوريلىن إمبونات، هورمون الذي يحرّر چونادوتروبينات (GnRH)، نظائر أخرى للهormون الذي يحرّر چونادوتروبين (LHRH)، أو لأحد مركيبات الدواء (انظر الفصل 6).
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

#### **تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء**

قبل بدء العلاج بالدواء أخبر الطبيب:

- إذا كنت تعاني من مزاج مكتتب. كانت هنالك تقارير عن اكتئاب الذي يمكن أن يكون شديداً بين المرضى الذين يتناولون ديكاپيتيل ديبو. قد يرغّب الطبيب بمتابعة حالتك أثناء العلاج.
- إذا كنت تستعمل أدوية لمنع تخثر الدم، حيث يمكن ظهور كدمة في منطقة الحقن.

لدى الرجال

- لدى البالغين، قد يؤدي العلاج بديكاپيتيل ديبو إلى ضعف العظام (هشاشة العظام) وازدياد احتمال حصول الكسور، أخبر الطبيب إذا كان لديك أحد عوامل الخطورة المفضلة أدناه، وقد يصف لك الطبيب العلاج بالبيسيوفونات (أدوية لعلاج انخفاض كثافة العظام). عوامل الخطورة المحتملة:
- إذا كان لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك القريبة ضعف في العظام (هشاشة العظام)
- إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول وأتدخن بكثرة،

• إذا تناولت، على مدار فترة طويلة، أدوية تسبب انخفاض كثافة العظام، مثل أدوية مضادة للاختلاج أو السنيريوديات (مثل هيدروكورتيزون أو بريدينيزولون).

- إذا كنت تعاني من أي أمراض قلب أو أوعية دموية، بما في ذلك اضطرابات في نظم القلب (Arrhythmia) أو إذا كنت تتualaج بأدوية لهذه الأمراض. الخطر لحدوث اضطرابات نظم في القلب قد يزداد عند استعمال ديكاپيتيل ديبو.

• إذا كنت تعاني من السكري أو مشكلة قلب أو أوعية دموية.

- إذا خضعت لعملية خصي، تريپتوريلىن لن يؤدي إلى انخفاض إضافي في مستويات تستوستيرون، ولذلك لا تستعمله.

#### **خلال العلاج بالدواء**

- ردود فعل تحسسية: في حالات نادرة، وقت قصير بعد الحقن شوهدت ردود فعل تحسسية شديدة (انظر الفصل "أعراض جانبية"). في هذه الحالات، يجب التوجه فوراً للحصول على علاج طبي. في حالات نادرة من تنقل وصداع نصفي شديد يجب إيقاف العلاج إذا تكررت هذه الحالات أو إذا كانت شديدة.
- عند بدء العلاج سيحصل ارتفاع في كمية التستوستيرون في جسدك. هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم أعراض السرطان. توجه إلى الطبيب إذا حصل هذا الأمر. من المحتمل أن يعطيك الطبيب دواء (مضاد للأندروجين) حتى يمنع تفاقم الأعراض.

• خلال الأسابيع الأولى من العلاج، كما هو الأمر مع نظائر أخرى من GnRH، قد يُسبب ديكاپيتيل ديبو أعراضًا نتيجة للضغط على العمود الفقري (مثل ألم، احساس بالخذر أو ضعف في القدمين) أو انسداد الإحليل (أنيوب خروج البول من الجسم). إذا شعرت بوحد من هذه الأعراض، توجه فوراً إلى الطبيب، سيفحص الطبيب حالتك وسيعالج وفقاً لذلك.

- فحوصات عمل أداء الغدة النخامية أو الأعضاء التناسلية، التي يتم إجراؤها خلال العلاج أو بعد إيقاف العلاج بديكاپيتيل ديبو قد تكون مضللة.

• إذا كان لديك تضخم (تورم حميد) في الغدة النخامية الذي لم تكن تعلم بوجوده، يمكن أن يظهر خلال العلاج بديكاپيتيل ديبو. تشمل الأعراض حالات صداع فجائية، تقيّبات، مشاكل في الرؤية وشلل عضلات العينين. في هذه الحالات، يجب التوجه فوراً للحصول على علاج طبي.

- قد تسبب الأدوية التي تخفض التستوستيرون تغيرات في تخطيط كهربائية القلب ترتبط باضطراب نظم القلب (إطالة مقطع QT).

للاطفال:

- أخبر الطبيب إذا كان الطفل يعاني من ورم متقدم في الدماغ، فهذا قد يؤثر على قرار الطبيب بخصوص العلاج.

• فتيات مع بلوغ جنسي متقدم قد يعانيين من تزيف مهبلي في الشهر الأول من العلاج.

- إذا كان الطفل يعاني من صداع شديد أو متكرر، مشاكل في الرؤية، رنين أو طنين في الأذنين، اتصل بالطبيب على الفور (انظر الفصل 4).

• بعد انتهاء العلاج ستظهر لدى الطفل مميزات البلوغ الجنسي.

• لدى الفتيات، سيبدأ التزيف المهبلي بعد سنة واحدة من العلاج بالمعدل.

- يجب على الطبيب استبعاد الأمراض الأخرى بسبب للبلوغ الجنسي المبكر.

• تتحسن كمية المعادن في العظام أثناء العلاج، لكنها تعود إلى وضعها السليم بعد انتهاء العلاج.

- من الممكن حصول سيرورة مرضية في الورك (على الفخذ) بعد انتهاء العلاج (حالة طبية يطلق عليها اسم انزلاق مشاش رأس الفخذ). تسبب هذه الحالة تصela في الفخذ، عَرْجاً وألمًا شديداً في الإرثية (أصل الفخذ) يمتد إلى الفخذ. إذا حصل ذلك، يجب استشارة الطبيب.

#### **الفحوصات والمتابعة**

من المحتمل أن يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم خلال العلاج، من أجل متابعة ومراقبة نجاعة العلاج.

• إذا كنت تتناول أو تتناول موخرًا أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص إذا كنت تتناول:

- قد يُسبب ديكاپيتيل ديبو خلاً في عمل الأدوية المستعملة لعلاج اضطرابات نظم القلب، مثل: كينين (quinidine)، پروكابيناميد (procainamide)، أميدارون (amiodarone)، أو قد يؤدي إلى ارتفاع خطير حدوث اضطرابات في نظم القلب عند إعطاء مدموج مع أدوية أخرى (مثل ميثادون (methadone) الذي يستعمل كمسكن آلام ولعلاج حالات الإدمان، موكسيفلوكاسين (moxifloxacin) (مضاد حيوي)، أدوية مضادة للذهان لعلاج مشاكل نفسية وخيمة).

• إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لأن تحمل، استشيري الطبيب قبل تناول أدوية.

- يُمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

• فتيات مع بلوغ جنسي متقدم قد يعانيين من تزيف مهبلي في الشهر الأول من العلاج.

- إذا كان الطفل يعاني من صداع شديد أو متكرر، مشاكل في الرؤية، رنين أو طنين في الأذنين، اتصل بالطبيب على الفور (انظر الفصل 4).

• بعد انتهاء العلاج ستظهر لدى الطفل مميزات البلوغ الجنسي.

• لدى الفتيات، سيبدأ التزيف المهبلي بعد سنة واحدة من العلاج بالمعدل.

- يجب على الطبيب استبعاد الأمراض الأخرى بسبب للبلوغ الجنسي المبكر.

• تتحسن كمية المعادن في العظام أثناء العلاج، لكنها تعود إلى وضعها السليم بعد انتهاء العلاج.

- من الممكن حصول سيرورة مرضية في الورك (على الفخذ) بعد انتهاء العلاج (حالة طبية يطلق عليها اسم انزلاق مشاش رأس الفخذ). تسبب هذه الحالة تصela في الفخذ، عَرْجاً وألمًا شديداً في الإرثية (أصل الفخذ) يمتد إلى الفخذ. إذا حصل ذلك، يجب استشارة الطبيب.

#### **4. الأعراض الجانبية**

جميع الأدوية، قد يُسبب استعمال ديكاپيتيل ديبو 22.5 ملغ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدّم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل إلا تعاني من أي منها.

يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كنت تعاني من صعوبات في البلع أو التنفس، انتفاخ في الشفتين، في الوجه، في البلعوم أو في اللسان، طفح جلدي. هذه قد تكون أعراض لرد فعل تحسسي أو ونمـة وعائية (ونمة) التي تم التبليغ عنها في حالات نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص).

#### **أعراض جانبية إضافية:**

لدى الرجال

- كما هو الحال في علاجات أخرى بأدوية من مجموعة GnRH agonists أو بعد عملية خصي، الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً نتيجة العلاج بـ триپتوريلىن هي نتاج نشاط دوائي متوقع للدواء.

تشمل هذه الأعراض هبات حرارة وانخفاض في الرغبة الجنسية.

- تم التبليغ عن ارتفاع في تعداد الخلايا الليمفاوية (خلايا دم بيضاء) بين المرضى الذين تم علاجهم

• إذا كنت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

### **3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحدّدهما الطبيب، فقط.

الجرعة المتبعة عادة، هي حقنة واحدة كل ستة أشهر.

سيقوم الطبيب أو الممرضة بحقن الدواء بواسطة إعطاء داخل العضل.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا حققت عن طريق الخطأ جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضار علبة الدواء معك.

إذا نسيتأخذ الحقنة في الوقت المحدد (كل ستة أشهر)، تشاور مع الطبيب المعالج حتى إذا طرأ تحسّن على حالتك الصحية يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول أدوية في الظلام! تتحقق من الملصق ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

### **4. السيادة والإرضاـع**

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحدّدهما الطبيب، فقط.

الجرعة المتبعة عادة، هي حقنة واحدة كل ستة أشهر.

سيقوم الطبيب أو الممرضة بحقن الدواء بواسطة إعطاء داخل العضل.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا حققت عن طريق الخطأ جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضار علبة الدواء معك.

إذا نسيتأخذ الحقنة في الوقت المحدد (كل ستة أشهر)، تشاور مع الطبيب المعالج حتى إذا طرأ تحسّن على حالتك الصحية يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول أدوية في الظلام! تتحقق من الملصق ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

## بنظير GnRH.

باستثناء ردود الفعل المناعية - التحسسية وردود فعل في موقع الحقن، جميع الأعراض الجانبية معروفة كمرتبطة بالتغييرات في مستوى التستوستيرون.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

- هبات حرارة
- ضعف
- فرط في التعرق
- ألم ظهر
- إحساس بالوخز في الساقين
- انخفاض الرغبة الجنسية
- عجز جنسي

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- غثيان، جفاف في الفم
- ألم، كدمات، احمرار وانتفاخ في موقع الحقن، ألم عضلات وعظام، ألم في اليدين والساقيين، وذمة (تراكم سوائل في أنسجة الجسم)، ألم في أسفل البطن
- ضغط دم مرتفع
- ردود فعل تحسسية
- ارتفاع في الوزن
- دوران، صداع
- فقدان الرغبة الجنسية، اكتئاب، تقلبات في المزاج

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- ارتفاع في تعداد صفائح الدم
- إحساس بخفقان القلب
- طنين في الأذنين، دوران (vertigo)، تشوش الرؤية
- ألم بطن، إمساك، تقيؤ
- تشوش، ارتجاف قوي المصحوب بتعرق وسخونة، نعاس، ألم
- تغيير في فحوصات الدم (يشمل ارتفاع في إنزيمات الكبد)، ارتفاع في ضغط الدم
- انخفاض في الوزن
- فقدان الشهية، ازدياد الشهية، نقرس (ألم قوي وانتفاخ في المفاصل عادة في الإبهام)، سكري، فائض الدهون في الدم
- ألام مفاصل، تشنجمات عضلية، ضعف عضلي، ألم عضلي، انتفاخ وحساسية، ألم في العظام
- شعور بالوخز أو التเคลّل
- عدم المقدرة على النوم، عصبية
- تضخم الثديين لدى الرجال، ألم في الثديين، تقلص الخصيتين، ألم في الخصيتين
- صعوبات تنفس
- حب الشباب، تساقط الشعر، حكة، طفح جلدي، احمرار الجلد، شرى
- تبول ليلي، اضطرابات في التبول
- نزيف من الأنف

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000

- بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد
- إحساس غير سليم في العين، اضطرابات أو تشوش الرؤية
- إحساس بالامتلاء في البطن، غازات، اضطرابات في حاسة الذوق
- ألم في الصدر
- صعوبة في الوقوف
- متلازمة شبيهة بالإإنفلونزا، سخونة
- التهاب في الأنف/الحلق
- ارتفاع في حرارة الجسم
- تصلب وانتفاخ المفاصل، تصلب العضلات، التهاب مفاصل تتكسي (osteoarthritis)
- فقدان الذاكرة
- إحساس بالارتباك، انخفاض في النشاط، شعور بالبهجة وشعور جيد
- ضيق تنفس أثناء الاستقاء
- حويصلات
- ضغط دم منخفض

أعراض جانبية نسبة شيوها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد تواترها بعد)

• تغيرات في فحص كهربائية القلب E.C.G (إطالة مقطع QT)

• إحساس بعدم الراحة العامة

• قلق

• سلس البول

• في حالة وجود ورم في الغدة النخامية، ارتفاع في خطر حدوث نزيف في هذه المنطقة

لدى الأطفال

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

• نزيف مهبلي الذي يمكن أن يحدث لدى الفتيات خلال الشهر الأول من العلاج

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- ألم بطن
- ألم
- احمرار وانتفاخ في موقع الحقن
- صداع
- هبات حرارة
- ارتفاع في الوزن
- حب الشباب
- فرط حساسية

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- تشوش الرؤية

• تقيؤات، حالات غثيان

• إمساك

• شعور بعدم الراحة بشكل عام

• ازدياد الوزن

• ألام في الرقبة

• تغييرات في المزاج

• ألم في الثديين

• نزيف من الأنف

• حكة

• طفح جلدي

أعراض جانبية نسبة شيوها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد تواترها بعد)

• ضغط دم مرتفع

• اضطرابات في الرؤية

• ردود فعل تحسسية خطيرة التي تؤدي إلى صعوبات في البلع، صعوبات تنفس، انتفاخ في الشفتين، في الوجه، في البلعوم أو في اللسان، شرى

• تغييرات في فحوصات الدم، بما في ذلك مستويات الهرمونات

• تكون سريع للشري نتائج انتفاخ في الجلد أو في الأنسجة المخاطية

• ألام عضلي

• اضطرابات في المزاج

• اكتئاب

• عصبية

• ارتفاع الضغط مجھول السبب داخل الجمجمة (ارتفاع الضغط داخل الجمجمة حول الدماغ يتميز

بالصداع، الرؤية المزدوجة وأعراض بصيرية أخرى، ورنين أو طنين في الأذنين).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

## التبلیغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبلیغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبلیغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (il. www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارنة عبر الإنترنټ للتبلیغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي

ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء

الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب الحفظ في درجة حرارة تحت الـ 25°C، يجب استعمال المعلق المعاد

تجهيزه فوراً بعد تحضيره.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي المسحوق أيضاً على:

poly (d,L-lactide-co-glycolide) 72/25 cooh, poly (dl-lactide-co-glycolide) 85/15 lauryl ester, mannitol, carmelloose sodium, polysorbate 80.

تركيب المذيب: ماء للحقن.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

المستحضر هو مسحوق ومذيب لصنع معلق لإطلاق معدّل لغرض الحقن. المسحوق بلون أبيض

حتى كريمي، والمذيب هو محلول شفاف.

تحتوي عبوة الدواء على قفيضة واحدة من المسحوق، أمبولة واحدة من المذيب، بالإضافة إلى ذلك تحتوي العبوة على محقنة وإبرتين.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

فرینچ فارما ماسوتیکالزس م.ض.، شارع هشیطا 8، پارک هنوسیا، قیساریا 3088900

اسم المنتج وعنوانه:

Debiopharm Research & Manufacturing S.A., Switzerland

تم تحریر هذه النشرة في شباط 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 154-61-34193

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.