

- انخفاض الشهية
- تقيؤ
- انخفاض الوزن
- تساقط الشعر
- التهاب الفم (التهاب الأغشية المخاطية في الفم، بما في ذلك جروح فموية، قلاع (aphtha) وقرح فموية)
- عسر الهضم
- التهاب الأغشية المخاطية
- وذمة محيطية
- حرارة مرتفعة
- جفاف الأغشية المخاطية (يشتمل على جفاف الفم، جفاف المهبل والفرج)
- اضطرابات في حاسة التذوق (بما في ذلك فقدان حاسة التذوق وانخفاض الحساسية تجاه الأطعمة)
- صداع
- حكة
- جلد جاف
- ألم في البطن

- تغييرات في بعض فحوصات الدم:

- مستويات مرتفعة من الإنزيمات التالية في الدم: ناقلة الببتيد جاما جلوتاميل، ناقلة أمين الألانين، ليبار
- مستوى كرياتينين مرتفع في الدم
- مستوى منخفض في الدم من المغاويات، الصفائح الدموية، الجلوكوز، الهيموجلوبين و/أو الألبومين في الدم
- ارتفاع زمن الثرومبلاستين الجزئي (activated partial thromboplastin time - مؤشر لأداء تخثر الدم)
- انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم
- انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم
- انخفاض مستوى المغنسيوم في الدم

توجه إلى الطبيب على الفور إذا كنت تختبر تغييرات في رؤيتك، ألم في العين، حساسية للضوء، إذا كانت تبدو عينك مختلفة.

أعراض جانبية شائعة (common) (قد تحدث لدى 1-10 مستعملين من بين 100 مستعمل):

- التهاب في المسالك البولية

إذا ظهر أعراض جانبية، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة أعلى من 30°C، يجب حمايته من الرطوبة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

نواة القرص:

Microcrystalline cellulose, mannitol, sodium starch glycolate, hypromellose, magnesium stearate
مادة الطلاء:

Hypromellose, iron oxide black, iron oxide red, titanium dioxide, macrogol 4000, talc

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

بيكريبي 50 ملغ أقراص مطليّة هي أقراص مستديرة لونها قرنفلي فاتح، وعليها الطباعة "L7" في جانب واحد و - "NVR" في الجانب الآخر.

بيكريبي 150 ملغ أقراص مطليّة هي أقراص بيضوية لونها أحمر فاتح، وعليها الطباعة "UL7" في جانب واحد و - "NVR" في الجانب الآخر.

بيكريبي 200 ملغ أقراص مطليّة هي أقراص بيضوية لونها أحمر فاتح، وعليها الطباعة "YL7" في جانب واحد و - "NVR" في الجانب الآخر.

يسوق بيكريبي كأقراص مطليّة في لويحات. بيكريبي متوفر في الأحجام التالية:

• عبوات مدمجة تحتوي على أقراص مطليّة 50 ملغ و- 200 ملغ (للمعالجين الذين يتناولون جرعة يومية مقدارها 250 ملغ):
عبوات تحتوي على كمية تكفي لمدة 28 يوماً: 56 قرصاً مطلياً (28 قرصاً مقدارها 50 ملغ و- 28 قرصاً مقدارها 200 ملغ).

• عبوات تحتوي على أقراص مطليّة 150 ملغ (للمعالجين الذين يتناولون جرعة يومية مقدارها 300 ملغ):
عبوات تحتوي على كمية تكفي لمدة 28 يوماً: 56 قرصاً مطلياً.

• عبوات تحتوي على أقراص مطليّة 200 ملغ (للمعالجين الذين يتناولون جرعة يومية مقدارها 200 ملغ):
عبوات تحتوي على كمية تكفي لمدة 28 يوماً: 28 قرصاً مطلياً.

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

بيكريبي 50 ملغ: 166-20-36150

بيكريبي 150 ملغ: 166-18-36148

بيكريبي 200 ملغ: 166-19-36149

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسجيلها ورد النص بصيغة المنكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

تم تحريرها في شباط 2024.