

التروكسين أقراص 50 مكغ

التروكسين أقراص 100 مكغ

التروكسين أقراص 50 مكغ

يحتوي كل قرص على المادة الفعالة ليفوثيروكسين صوديوم (Levothyroxine sodium) 50 مكغ (ميكروغرام).

التروكسين أقراص 100 مكغ

يحتوي كل قرص على المادة الفعالة ليفوثيروكسين صوديوم (Levothyroxine sodium) 100 مكغ (ميكروغرام).

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 " معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء " والفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وَصِفَ هذا الدواء من أجلي. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة قصور الغدة الدرقية (thyroid): علاج نقص هورمونات الغدة الدرقية الذي يسبب القامة لدى الرضع والمعالجة الزمنة المخاطية (myxoedema) لدى الأطفال.

الفصيلة العلاجية: من هورمونات الغدة الدرقية.

2) قبل استعمال الدواء

لضمان مواصلة العلاج بالمستحضرات الحاوية على ليفوثيروكسين صوديوم، فإن إستبدال مستحضر معين الحاوي على ليفوثيروكسين صوديوم بمستحضر آخر يتم فقط بإستشارة طبية شخصية ومراقبة عن كثب للمتعالج.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة ليفوثيروكسين صوديوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 من هذه النشرة).
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يُنتج كميات زائدة من التيروكسين (انسمام درقي = thyrotoxicosis)، غير المُعالج.
- وُجد لديك مرض يؤثر على الغدة الكظرية (إفحص الأمر مع طبيبك إذا لم تكن واثقاً) وغير المُعالج.
- كنت تعاني من قلة نشاط الغدد الكظرية (قصور الغدة الكظرية) ولا تتلقى علاجاً بدلاً ملامناً.
- وُجد لديك ضغط دم مرتفع ولا تتلقى علاجاً لذلك.
- وُجد لديك مرض يؤثر على الغدة الخامية وغير المُعالج.
- وُجدت لديك مشكلة في القلب (مثلاً إحتشاء عضلة القلب أو التهاب حاد بعضلة القلب).
- أثناء الحمل، لا يجوز تناول التروكسين في نفس الوقت مع أدوية لفرط نشاط الغدة الدرقية (أدوية تثبط نشاط الغدة الدرقية).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول التروكسين.
- إن زيادة عدد الأقراص المتناولة بشكل سريع قد يسبب أعراضاً جانبية (تُذكر في الفقرة 4). إحدك لطبيبك إذا كنت تعاني من أعراض جانبية.
- لا يجوز استعمال التروكسين لمعالجة البهانة أو لإنقاص الوزن. إن هورمونات الغدة الدرقية ليست ملائمة لإنقاص الوزن. لا يؤدي تناول هورمونات الغدة الدرقية إلى إنخفاض الوزن إذا كانت نسب هورمون الغدة الدرقية لديك ضمن المجال الطبيعي. يمكن أن تحدث أعراض جانبية شديدة أو حتى تشكل خطراً على الحياة إذا قمت بزيادة المقادير الدوائية دون إستشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى لإنقاص الوزن في نفس الوقت. إحدك لطبيبك إذا كنت تتناول دواء لإنقاص الوزن، مثل أوبوتستات.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحوص مخبرية لمراقبة نسب هورمون الغدة الدرقية، إحدك لطبيبك أو واطلم المختبر إنك تتناول أو تناولت مؤخراً بيوتين (يُسمى أيضاً فينيتامين H، فينيتامين B7 أو فينيتامين B8). قد يؤثر بيوتين على فحوصات المخبرية. كأم متعلق بالفحص، يمكن أن تكون النتائج مرتفعة بشكل خاطئ أو منخفضة بشكل خاطئ بسبب البيوتين. قد يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول بيوتين قبل إجراء الفحوص المخبرية. يجب أن تأخذ في الإعتبار أن المنتجات الأخرى التي تتناولها، مثل متعددة الفيتامينات أو المكملات الغذائية للشعر، اللجل، للأظفار قد تحتوي أيضاً على بيوتين وبالتالي تؤثر على نتائج الفحوص المخبرية. إحدك لطبيبك أو واطلم المختبر إذا كنت تتناول هذه الأدوية (يرجى الإنتباه إلى المعلومات في الفقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

قد تحدث اضطرابات الغدة الدرقية إذا كنت بحاجة إلى إستبدال دواء آخر يحتوي على ليفوثيروكسين. اتصل بطبيبك أو اختصاصي طبي آخر إذا توفرت لديك أسئلة حول تبديل أدويةك. هناك حاجة بمراقبة عن كثب (سريرية وبيولوجية) خلال الفترة الإنتقالية. إحدك لطبيبك إذا ظهرت لديك أية أعراض جانبية، فقد تكون هذه علامة على أنه يجب رفع أو خفض المقادير الخاص بك.

قبل العلاج بـ التروكسين إحدك لطبيبك إذا:

- تجاوزت عمر 50 سنة.
- وُجد لديك مرض في القلب.
- وُجد لديك سكري.
- كنت في فترة سن اليأس (menopause) وكنت معرضة لخطورة زائدة لمرض هشاشة العظام.
- وُجدت لديك الأعراض التالية: إرهاق، حساسية البرد، جلد جاف وسميك، تساقط الشعر، نظم قلب بطيء (أعراض لقصور الغدة الدرقية).
- وُجد لديك خلل في إستقلاب المواد كجزء من مرض هورموني آخر.

- وُجدت لديك وذمة مخاطية (myxoedema) - لون جلد مائل للابيض ووزمة رخوة في الجلد والأسجة تحت الجلد.
- وُجدت لديك متلازمة خلل الإمتصاص (malabsorption syndrome).
- كنت تعاني من قلة نشاط الغدة الكظرية (قصور الغدة الكظرية).
- كنت حاملاً.
- سوف يقوم طبيبك بفحص فيما إذا كنت تعاني من خلل في نشاط الغدة الكظرية، الغدة النخامية أو الغدة الدرقية مع إنتاج زائد وغير مراقب لهورمونات الغدة الدرقية (ذاتية الغدة الدرقية). لأنه يجب معالجة تلك الحالات بواسطة الأدوية قبل أن تبدأ بتناول التروكسين أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدك لطبيبك أو للصيدلي عن ذلك.

قد يُغير التروكسين من تأثير أدوية أخرى وأدوية أخرى يمكن أن تُغير من تأثير التروكسين. إذا كنت تتناول أو تناولت بيوتين مؤخراً، إحدك لطبيبك أو واطلم المختبر عندما تكون مدمماً على إجراء لفحوص مخبرية لمراقبة نسبة هورمون الغدة الدرقية. قد يؤثر بيوتين على نتائج الفحص (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

هذه الأدوية يمكن أن تؤثر على إمتصاص التروكسين:

- أدوية لمعالجة إرتفاع الكوليسترول (كوليستيرامين، كوليستيپول).
- أدوية مضادة للقرحة المعدية (مضادات الحموضة، سوكرفالات).
- أدوية تحتوي على الحديد وإضافات الحديد.
- إضافات الكالسيوم، المغنيزيوم، والألمونيوم.
- أدوية مستعملة لمعالجة إرتفاع نسب البوتاسيوم في الدم (كالسيوم، سفيلامر، لتانامون، وأدوية من فصيلة سلفونات البولستيرين - polystyrene sulfonates).
- أدوية من فصيلة ميثبات مضخة البروتونات (المستعملة لخفض كمية حموضة المعدة) ميثبات مضخة البروتونات (مثل، أوميپرازول، إيزوميپرازول، بانتوبيرازول، رابيبيرازول، ولانسوبرازول)، والتي تُستعمل لخفض كمية الحمض التي تنتجها المعدة، مما قد يقلل من إمتصاص الليوثيروكسين من الأمعاء وبالتالي يجعله أقل نجاعة. إذا كنت تتناول ليفوثيروكسين أثناء علاجك بميثبات مضخة البروتونات، فيجب على طبيبك مراقبة وظيفة الغدة الدرقية لديك، وقد يلزم الأمر ملاءمة المقادير الدوائية من التروكسين.
- أدوية لإنقاص الوزن، مثل أورليستات.

إترت فاصل ما أمكن بين المقادير الدوائية من التروكسين وبين الأدوية التي ذُكرت سابقاً، وذلك لمنع حدوث تفاعلات دوائية بين الأدوية في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة.

هذه الأدوية يمكن أن تؤثر على تأثير التروكسين:

- أدوية لمعالجة الصرع (كاربامازيبين، فينيتوين، باربيتورات)
- أدوية تحتوي على سالت جونز وورت (St. John's wort) (دواء على أساس نباتي)
- أدوية لمعالجة التلوثات (ريفامپيسين، سيرتوفلوكساسين)
- أدوية لمعالجة فرط ضغط الدم (حاجبات بيتا)
- أدوية لمعالجة قصور القلب (أميودارون)
- أدوية تحتوي على الليثيوم أو اليود
- مواد ظليلة تحتوي على اليود التي تستعمل لفحوص رنتجن
- أدوية مستعملة لمعالجة زيادة إستقلاب المواد (بروبيل ثيو أوراسيل)
- هورمونات الكظر المستعملة لمعالجة الإتهاب أو ردود الفعل الحساسية (كورتيزول، ديكساميثازون)
- أدوية لعلاج السرطان (تاموكسيفين، 5- فلورو أوراسيل، إيماتينيب، سونيتينيب)
- أدوية لمعالجة الإكتئاب (سيرترالين)
- إضافات هورمونية أو إذا كنت تتناولين أقراص لمنع الحمل (إستروجين)
- ميتادون
- أدوية لعلاج الملاريا (بروجوانيل، كلوروكوين)
- أدوية لمعالجة إرتفاع نسب الكوليسترول (كلوفيفرات، سيفمغاستاتين، لوفاستاتين)
- أدوية لمعالجة إحتباس السوائل وفرط ضغط الدم (فوروسيميد)
- ريتونايفير، إندينافير، لوبينايفير - التي تستعمل لمعالجة HIV والبرقان المزمن من نوع C
- العديد من الأدوية يمكنها أن تؤثر على نتائج الفحوص المخبرية أو على وظائف الغدة الدرقية.

تأثير الأدوية التالية قد يتأثر من التروكسين:

- أدوية لعلاج السكري (مثل الإنسولين). قد يُقلل التروكسين من تأثير الدواء المضاد للسكري الذي تتناوله. لذلك من الجائز أن تحتاج لفحوص إضافية لنسب السكر في الدم، خاصة في بداية العلاج بـ التروكسين. خلال فترة العلاج بـ التروكسين، فمن الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقادير الدوائية للدواء المضاد للسكري الذي تتناوله.
- أدوية لمنع الخثرات الدموية (مضادات الخثر) التي تستعمل لتسييح الدم ولمعالجة الخثرات الدموية: قد يزيد التروكسين من تأثير تلك الأدوية وينتج لذلك ذلك يزيد من خطورة حدوث نزف. لذلك من الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص منتظمة لقيم خثرتك معك في بداية العلاج بـ التروكسين وخلال. خلال العلاج بـ التروكسين، من الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقادير الدوائية من فصيلة كواربين التي تتناولها.
- نينيتوين (لمعالجة الصرع)
- بليكوزيدات القلب (مضادات قصور القلب)
- أدوية لمعالجة الإكتئاب (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة)
- أدوية مقلدة للجهاز الودي (أدوية منبهة للجهاز العصبي الودي)

إذا كنت تتناول الأدوية التالية فعليك مراجعة طبيبك، لأنها يمكن أن تؤثر على فحوص الدم أو على فحوص طبية معينة وقد تؤدي لنتائج خاطئة:

- إضافات هورمونية أو أدوية تحتوي على تستوستيرون (أندروجينات، ستيرويدات نباتية)
- مسكنات الألم (حمض أسيتيل ساليسيليك)

إستعمال الدواء والطعام:

منتجات الصويا والحمية الغنية بالألياف قد تقلل من إمتصاص التروكسين. إن ملاءمة المقادير الدوائية من التروكسين يمكن أن يكون ذا صلة خاصة في بداية وعند التوقف عن الحمية الغذائية.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعةً، فتعقدين بآبك حامل أو تخططين للحمل، يجب استشارة طبيبك قبل تناول الدواء، يجب مراقبة وظائف الغدة الدرقية خلال فترة الحمل بأوقات متكررة، وذلك لأن النسب المنخفضة جداً أو المرتفعة جداً لهورموناتها الغدة الدرقية قد تلحق الضرر بتطور ورفاهية الجنين. سوف يحدد طبيبك فيما إذا كان يتطلب الأمر ملاءمة المقادير الدوائية من التروكسين. لا يجوز تناول خلال فترة الحمل إذا كنت تتناولين أيضاً دواءً يبطئ نشاط الغدة الدرقية وذلك لمعالجة فرط نشاط الغدة الدرقية. تُجرع كمية قليلة من المادة الفعالة في كل بيتن الأم. يجب إعلام طبيبك إذا كنت مرضعة أو كنت تخططين للإرضاع.

لدى الخنق الذين ولدوا بوزن منخفض جداً، يتم فحص ضغط الدم بشكل روتيني بعد بدء العلاج بليوتروكسين، وذلك لأنه قد يحدث انخفاض سريع وحاد في ضغط الدم (يسمى انهيار الدورة الدموية circulatory collapse).

السياسة وإستعمال الماكينات:

لا يوجد لـ التروكسين تأثير على القدرة على إستعمال الماكينات أو القيادة.

معلومات هامة عن بعض مركات الدواء:

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم بكل قرص، أي، عملياً هو 'خال من الصوديوم'.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال الدواء دائماً بحسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط كأمر متعلق بنتائج فحوص دمك.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول:

يتوجب عليك بلع الأقراص مع كأس من الماء، يُفضّل قبل وجبة الفطور. عليك تناول الأقراص على معدة خاوية لا يجوز شطر أو سحق الأقراص! لا تتوفر معلومات حول المضغ.

الفحوص والمتابعة الطبية:

يجب إجراء فحوص دورية لهورموناتها الغدة الدرقية خلال فترة العلاج بالدواء.

لدى الكبار: من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي بعد عدة أسابيع وذلك بحسب إستجابتك للعلاج ومراقبة فحوص الدم.

لدى الأطفال دون عمر 12 سنة: يتطلب الأمر مراقبة طبية لضمان تلقي الطفل المقدار الدوائي الصحيح من أجله.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفلاً أو أي شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

قد تشعر بضررات القلب (عدم إنتظام نظم القلب)، قلق، عصبية، سخط، إرتباك، تعرق، إضطرابات بنظم القلب (عدم إنتظام نظم القلب أو تسرع نظم القلب)، قلة هدوء، حركات لا إرادية، توسع الحدقتين، نفس سريع جداً، سخونة، إختلاجات وصداغ.

تحدث حالة من أزمة لإسغام درقي (thyrotoxic crisis) في أوقات نادرة بعد تناول مقدار دوائي مفرط بشكل مزمن وتؤدي لعدم إنتظام نظم القلب، قصور القلب وسبات.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول المقدار الدوائي، تناول المقدار الدوائي لحظتها تذكرك. إذا حان موعد تناول المقدار الدوائي القادم حينها فوت المقدار الدوائي الممنسي. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ. فهذا قد يؤدي لعودة الأعراض الأساسية التي كانت لديك. يجب دائماً إستشارة طبيبك عندما تفكر بالتوقف عن تناول الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع الإنذارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توقفت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال التروكسين أقراص قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهر أي عرض جانبي من بين الأعراض الجانبية التالية:

علامات رد فعل تحسسي مثل:

- ضيق نفس، ردود فعل جلدية مثل: طفح وحكة.
- إحمراز، هبات الحر.

إذا كنت تقاسي من أعراض جانبية خطيرة، فعليك التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ.

أعراض جانبية خطيرة:

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

- ورم دماغي وهمي (pseudotumor cerebri) (إرتفاع الضغط داخل الجمجمة مع وئمة في العينين)، خاصة لدى الأطفال.
- أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

- ألم في الصدر (ذبحة صدرية)، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ.
- ضربات قلب (إنزعاج ينجم عن ضربات قلب سريعة أو قوية).
- إضطرابات بنظم القلب (عدم إنتظام نظم القلب). يمكن أن تكون خطيرة. توجه إلى طبيبك.
- قصور القلب.
- إحتشاء عضلة القلب.
- أعراض لفطرد المقدار الدوائي تنجم عن زيادة إنتاج هورمون الغدة الدرقية (في حال رفع المقدار الدوائي الإبتدائي بشكل سريع جداً). توجه إلى طبيبك.

- فرط المقدار الدوائي لدى الأطفال قد يسبب craniostosis (الإغلاق المبكر لمفاصل عظام الجمجمة قبل تطور المشامغ وأكماله) وإغلاق المشامغ المبكر، الذي قد يؤثر على الطول عند البلوغ.

قد تحدث أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

- نظم قلب سريع. قد يكون خطيراً. إذا وجد لديك نظم قلب سريع وغير منتظم أو إذا كنت تشعر بسوء أو بإيغاش، فعليك التوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ.
- إختلاجات (تقلصات عضلية، تشنجات).
- ألم مفاجئ في الظهر والميل لحدوث كسور في العظام جراء هشاشة العظام (انخفاض كثافة العظم). توجه إلى طبيبك.
- إرتفاع ضغط الدم. توجه إلى طبيبك. يتوجب معالجة ضغط الدم المرتفع. إن ضغط الدم المرتفع جداً هو خطير.
- صعوبات، تقلصات عضلية. قد أو يمكن أن تكون خطيرة. توجه إلى طبيبك.

- سخط.
- قلة هدوء، إرتجاف، صداع، قلة راحة، أرق (مشاكل في النوم).
- قلق، تغيرات في المزاج، عصبية.
- تعرق، تساقط الشعر.
- زيادة الشهية للطعام، آلم في البطن، غثيان، إسهال، تقيؤ.
- عدم إنتظام الدورة الشهرية، قلة الخصوبة.
- إرهاق (إنهاك)، عدم تحمل الحر، سخونة.
- إنخفاض شديد في الوزن.
- إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان أو في الحنجرة (إنتفاخ تحت الجلد - angioedema)، طفح، شرى.

زور الأعراس الجانبية في أوقات متقاربة عند خفض المقدار الدوائي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5 كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء والى دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين ما دون 25 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.
- بعد الفتح لأول مرة بالإمكان الإستعمال لفترة 114 يوماً، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنتقضاء الصلاحية. إحتفظ القنينة محكمة الإغلاق.

لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من الدواء. يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

6 معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
Microcrystalline cellulose, Pre-gelatinised starch (Maize starch 1500), Talc, Microcrystalline cellulose (in triturate), Silica colloidal anhydrous, Magnesium stearate.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
التروكسين 50 مكغ أقراص: أقراص مستديرة ذات لون أبيض إلى أوف - وايت (off-white)، محدية الجانبين عليها الطباعة "GS 11E" من جانب واحد و- "50" من الجانب الثاني، ضمن قنينة من البلاستيك ذات غطاء وسدادة أمان، تحتوي على 100 قرص.
- التروكسين 100 مكغ أقراص: أقراص مستديرة ذات لون أبيض إلى أوف - وايت (off-white)، محدية الجانبين عليها الطباعة "GS 21C" من جانب واحد و- "100" من الجانب الثاني، ضمن قنينة من البلاستيك ذات غطاء وسدادة أمان، تحتوي على 100 قرص.
- إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات باداجيس إسرائيل م.ح.ش. شارع راكفت 1، شوهام. إسم المنتج وعنوانه: أسين باد أولدسلو GmbH، باد أولدسلو، ألمانيا.
- تم إعدادها في كانون الثاني 2024.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
التروكسين أقراص 50 مكغ: 055-82-20571
التروكسين أقراص 100 مكغ: 027-92-22062
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.