

קיבלתי מרשם לזפוסיה פרטי קשר חשובים

הרופא שנתן את המרשם לזפוסיה:

שם: _____

מספר טלפון במרפאה: _____

כתובת: _____

2084-IL-2100046

כרטיס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות בתאריך 3 בינואר 2022

זפוסיה® (אוזנימוד) כרטיס תזכורת בנושא היריון (עבור נשים היכולות להרות)



2084-IL-2100046

כרטיס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות בתאריך 3 בינואר 2022

מידע למטופלת

אם נעשה שימוש במהלך היריון, זפוסיה® (אוזנימוד) עלולה לגרום נזק לעובר. הסיכונים האפשריים כוללים אובדן ההיריון ומומים מולדים.

- אל תשתמשי בזפוסיה אם את בהיריון, מניקה, או יכולה להרות ואינך משתמשת באמצעי מניעה יעילים.
- לפני תחילת הטיפול בזפוסיה:
 - 1.** הרופא יסביר את הסיכונים האפשריים לעובר אם תהרי בזמן נטילת זפוסיה, ויידע אותך בקביעות כיצד למזער את הסיכונים.
 - 2.** עלייך להשתמש באמצעים יעילים למניעת היריון בזמן נטילת זפוסיה ולמשך 3 חודשים לאחר שתפסיקי ליטול זפוסיה.
 - 3.** עלייך לקבל תשובה שלילית בבדיקת היריון, שתאמת על ידי הרופא, ולחזור על הבדיקה במרווחי זמן מתאימים.



- אם תהרי במהלך הטיפול, יש לעצור את הטיפול בזפוסיה. הרופא יידע אותך על ההשפעות המזיקות לתינוק הקשורות לטיפול בזפוסיה ויהיה צורך לערוך בדיקות אולטרסאונד.



- עלייך להפסיק ליטול זפוסיה 3 חודשים לפני תכנון היריון.



- אם תפסיקי ליטול זפוסיה, ספרי לרופא מייד במקרה שתסמיני המחלה שלך יחמירו, מכיוון שקיימת אפשרות שהמחלה תחזור.



- ספרי לרופא מייד אם את בהיריון או מיניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות.

גב כרטיס תזכורת זה מופיעים פרטים ליצירת קשר עם הרופא שנתן את המרשם. למידע נוסף על ההשפעות וכן על תופעות הלוואי של זפוסיה, יש לעיין בעלון לצרכן עבור זפוסיה. למידע נוסף אנא צור קשר עם הרופא המטפל או הרוקח ועיין בעלון המידע למטופל. ניתן לדווח על תופעות לוואי באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il) או על ידי כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il> על מנת לקבל עותקים נוספים מכרטיס זה אנא צור קשר עם חברת בריסטול מאיירס סקוויב בטלפון 03-5231021 או בפקס 03-9226896

טלפון:

טאקסט אופקח לסמט:

םה:

טיסופגך סהלטט גא למזה אפולט

סיכומט למיל יתלט
טיסופגך סהלטט יטכזיל

זפוסיה® (אוזנימוד)
כרטיס תזכורת בנושא היריון

(עבור נשים היכולות להרות)

 Bristol Myers Squibb™

מידע למטופלת

אם נעשה שימוש במהלך היריון, זפוסיה® (אוזנימוד) עלולה לגרום נזק לעובר. הסיכונים האפשריים כוללים אובדן ההיריון ומומים מולדים.

- אל תשתמשי בזפוסיה אם את בהיריון, מניקה, או יכולה להרות ואינך משתמשת באמצעי מניעה יעילים.

- לפני תחילת הטיפול בזפוסיה:

- 1.** הרופא יסביר את הסיכונים האפשריים לעובר אם תהרי בזמן נטילת זפוסיה, וידע אותך בקביעות כיצד למזער את הסיכונים.

- 2.** עלייך להשתמש באמצעים יעילים למניעת היריון בזמן נטילת זפוסיה ולמשך 3 חודשים לאחר שתפסיקי ליטול זפוסיה.

- 3.** עלייך לקבל תשובה שלילית בבדיקת היריון, שתאמת על ידי הרופא, ולחזור על הבדיקה במרווחי זמן מתאימים.



- אם תהרי במהלך הטיפול, יש לעצור את הטיפול בזפוסיה. הרופא יידע אותך על ההשפעות המזיקות לתינוק הקשורות לטיפול בזפוסיה ויהיה צורך לערוך בדיקות אולטרסאונד.



- עלייך להפסיק ליטול זפוסיה 3 חודשים לפני תכנון היריון.



- אם תפסיקי ליטול זפוסיה, ספרי לרופא מייד במקרה שתסמיני המחלה שלך יחמירו, מכיוון שקיימת אפשרות שהמחלה תחזור.



- ספרי לרופא מייד אם את בהיריון או מיניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות.

גב כרטיס תזכורת זה מופיעים פרטים ליצירת קשר עם הרופא שנתן את המרשם. למידע נוסף על ההשפעות וכן על תופעות הלוואי של זפוסיה, יש לעיין בעלון לצרכן עבור זפוסיה. למידע נוסף אנא צור קשר עם הרופא המטפל או הרוקח ועיין בעלון המידע למטופל. ניתן לדווח על תופעות לוואי באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il) או על ידי כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il> על מנת לקבל עותקים נוספים מכרטיס זה אנא צור קשר עם חברת בריסטול מאיירס סקוויב בטלפון 03-5231021 או בפקס 03-9226896