

## עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986

התרופה משוקחת על פי מרשם רופא בלבד

# **בוקולאם 2.5 מ"ג בוקולאם 5 מ"ג בוקולאם 7.5 מ"ג בוקולאם 10 מ"ג**

## **תמיישה למثان לחילוף הפה**

בוקולאם מכיל את החומר הפעיל: מידАЗולם.

- כל 2.5 מ"ג מזרק מוקן מראש מכיל 2.5 מ"ג מידАЗולם (כ-הידרוכולוריד) ב-0.5 מ"ל תמיישה.
- כל 5 מ"ג מזרק מוקן מראש מכיל 5 מ"ג מידАЗולם (כ-הידרוכולוריד) ב-1 מ"ל תמיישה.
- כל 7.5 מ"ג מזרק מוקן מראש מכיל 7.5 מ"ג מידАЗולם (כ-הידרוכולוריד) ב-1.5 מ"ל תמיישה.
- כל 10 מ"ג מזרק מוקן מראש מכיל 10 מ"ג מידАЗולם (כ-הידרוכולוריד) ב-2 מ"ל תמיישה.

הרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידיע נסוף".

קראו בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספפות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול בילד/מטופלך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואית דומה.

התרופה מיועדת לשימוש ילדים ומתבגרים בני 3 חודשים ומעלה, אך מתחת לגיל 18 שנים.

במידה והתקף אין מפסיק תוך 10 דקות לאחר מתן בוקולאם:

- יש להזמין אמבולנס באופן מיידי.
- יש לשמר את המזרק הריק ולתת אותו לצוות האmbולנס, על מנת שיידעו מה כמות הבוקולאם שניתנה למטופל.
- **אין לחתת למטופל מנה נוספת של בוקולאם!**

נטילת תרופה זו עם תרופות אחרות משפחחת האופיאידים או תרופות אחרות המדכאות מערכת עצביים מרכזיים (כולל סמים) או אלכוהול, עלולה לגרום לשינויות عمוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימת), תרדמת ומות.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול בהתקפים אפילפטיים ממושכים, חריפים המלווהים בעוויתות, אצל תינוקות, פעוטות, ילדים ומתבגרים (בגילאים החל מ- 3 חודשים ועד 18 שנים).

התרופה נועדה למתן רק ע"י הורים/מטפלים, כאשר הילד/מטופל אובחן כחולה אפילפסיה.

הטיפול בתינוקות מגיל 3 חודשים ועד 6 חודשים חייב להתבצע בתחום בית החולים, בו ניתן לעקוב אחר מצב התינוק ויישנה נגישות לציריך החיהה.

**קבוצה רפואיית:**

קבוצת הבנזודיאזפינים

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

- atica או ילזר רג'יסים (אלרגיים) לחומר הפעיל מידוזלים או לבנזודיאזפינים (כגון דיאזepam) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- המתופל סובל ממחלת השירים והעצבים, הגורמת לחולשת שרירים (מיאסטניה גראביס).
- המתופל סובל מחלת נשימה חמורים במצב מנוחה (בוקולאמ עלולה להחמיר את קשיי הנשימה).
- המתופל סובל ממחלת, הגורמת לעיתים קרובות להפסיקות נשימה במהלך השינה (תסמנות דום נשימה בשינה).
- מתופל יש בעיות כבד חמורות.

### ażhorot miyadot haengutot leshimush batrufah:

לפני טיפול בבוקולאם, ספר לרופא אם למתופל יש:

- בעיות בתפקוד הכל潦ות, הכבד או הלב.
- בעיות בתפקוד הריאות, הגורמות לקשיי נשימה באופן קבוע.

תרופה זו עלולה לגרום לאנשים לשוכח אירועים שקרו לאחר שניתנה להם. יש להשיג עלי המתופלים לאחר מתן התרופה. יש להימנע מתרופה זו בחולים עם היסטוריה רפואי של שימוש לרעה באלכוהול או בסמים.

מתופלים הסובלים מקשוי נשימה או בעיות לבביות נמצאים בסיכון גבוה יותר למורעות מסכני-חיים, במיוחד כאשר מתופלים במנות גבוהות של בוקולאם.

ילדיים מתחת לגיל 3 חודשים: אין לתת בוקולאם לילדים שגילם פחות מ- 3 חודשים, משום שאין מספיק מידע לגבי קבוצת גיל זו. במידה ואינו בטוח אם הכתוב לעיל חל על המתופל, דבר עם רופא או רוקח לפני מתן תרופה זאת.

### אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקחת, או אם לך תחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.** זה חשוב ביותר, היות ושימוש ביותר מתרופה אחת בו זמנית עלול做强. או להחליש את אפקט התרופות המעורבות.

במיוחד אם אתה לוקחת את הבאים:

השפעות בוקולאם עשויות להתגבר על ידי תרופות כגון:

- תרופות אנטי-איפילפטיות (לטיפול באפילפסיה), כגון פניטואין
- אנטי-בוטיקות, כגון אריתרומיצין, קלאריתרומיצין
- תרופות נגד פטריות, כגון קטוקונאזול, וריקונאזול, פלאקונאזול, איטראקונאזול, פוסאקונאזול
- תרופות נגד אלקלואיד (כיב), כגון סימטידין, ראנטידין, וראפאמייל
- תרופות לטיפול בחץ דם, כגון דיליטיאזם, וראפאמייל
- תרופות מסוימות לטיפול ב-HIV וב-AIDS, כגון סאקוינאביר, שילוב של לופינאביר/ריטונאביר
- משככי כאבים נרकוטיים (משככי כאבים חזקים מאוד), כגון פנטניל
- תרופות להורדת השומנים בدم, כגון אטורבסטאטין
- תרופות נגד בחילה, כגון נאבילוין
- תרופות הייפנוטיות (תרופות משרות שינוי)
- תרופות הרגעה נגד דיכאון (תרופות המשמשות לטיפול בדיכאון וגורמות לשינויו)
- תרופות הרגעה
- תרופות מאלחשות (להקלת כאב)
- תרופות אנטי-היסטמיניות (לטיפול באלהרים)

השפעות בוקולאם עשויות לפחותות על ידי תרופות כגון:

- ריפאמיצין (לטיפול בשחפת)
- קסנטינים (לטיפול באסתמה)
- פרע מחורר (St John's Wort) (תרופה צמחית), יש להימנע ממנו במתופלים הנוטלים בוקולאם.

בוקולאם עלול להגביר את האפקט של חלק מתרופות מרופות שרירים, כגון: באקלופן (הגורם לנמנום מוגבר). תרופה זו עשויה למנוע מכמה תרופות אחרות לפעול גם כן, כגון, לבודפה (לטיפול במחלת פרקינסון).

**שימוש בבוקולאם ומצוין אסור למתופל לשחות מיצ' אשכליות במהלך הטיפול בבוקולאם.** מיצ' אשכליות עלול להגביר את ההשפעה המרגיעה של התרופה ולגרום לשינויו יתר.

## **שימוש בבוקולאמ וצריכת אלכוהול**

אסור למתופל לשות אלכוהול במהלך הטיפול **בבוקולאמ**. אלכוהול עלול להגביר את ההשפעה המרגיעה של התרפיה ולגרום לשינויות יתר.

### **הרין והנקה הרין:**

יש להיעזר ברופא לפני נטילת התרפיה, במידה והמטופלת שהולכת לקבל את התרפיה הינה בהרין או מניקה, חושבת שהיא עלולה להיות בהרין או מתכוונת להכנס להרין.

מתן מינונים גבוהים של בוקולאם במהלך 3 החודשים האחרונים של ההרין, עלול לגרום לקצב לב בלתי תקין בעבר. תינוקות אשר נולדו לاميةות שטופלו בתרפיה במהלך הלידה, עלולים להראות יכולת יינקה ירודה, קשה נשימה וטונוס (מתה) שרירים נמוך בלבד.

הנקה:  
יש להודיע לרופא במידה והמטופלת מניקה. למרות שכמות מעטה של בוקולאם עלולה לעבור לחלב אם, יתרן ולא נדרש להפסיק את הנקה.  
הרופא ייעץ אם מומלץ למטופל להניך בזמן הטיפול בתרפיה.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

אין להנוג, לרכב על אופניים או להפעיל מכונות מסווגות בזמן השימוש בתרפיה עד להתקאות מוחלטת, לאחר ובוקולאם עלול לגרום לחריג ישנו, שכחן או להופיע על יכולת הריכוז והקוורדרינציה שלך. זה עלול להשפיע על ביצוע משימות כגון נהיגה, רכיבה על אופניים או שימוש במכונות.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או משחקים בקרבת הכביש וכדומה.  
דבר עם רופא או רוקח במידה ואינך בטוח אם זה בטיחותי לך לנוג בזמן השימוש בתרפיה זו.  
אנא התייעץ עם הרופא שלך במידה ותזדקק ליעוץ נוסף.

**בוקולאם מכל נתרן**  
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למזרק, ככלומר למשה "לא נתרן".

### **3. כיצד תשתמש בתרפיה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.  
עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול.

**מינון**  
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:  
בהתאם לגיל, ילך יקבל אחד מהמינונים הבאים, אריזה בעלת תווית עצובה:

- לגילאי 3 חודשים ועד פחתות מ-5 שנים: 2.5 מ"ג - אריזה בעלת תווית עצובה
- לגילאי שנה ועד פחתות מ-5 שנים: 5 מ"ג - אריזה בעלת תווית כחולה
- לגילאי 5 שנים ועד פחתות מ-10 שנים: 7.5 מ"ג - אריזה בעלת תווית סגולה
- לגילאי 10 שנים ועד פחתות מ-18 שנים: 10 מ"ג - אריזה בעלת תווית כתומה

המננה היא התכלה המלאה של מזרק אחד. אין לתת יותר ממנו אחת.

הטיפול בעוצות שגילם בין 3 חודשים ועד 6 חודשים חייב להתבצע בתחום בית חולים בלבד, בו ניתן לבצע ניתור וישנה גנטישות לצדדים.

אין לעبور על המנה המומלצת.

**הכנה לקרוואת מתן התרפיה**  
במידה והילד חווה התקף, אפשר לגופו לנوع בחופשיות, אל תנסה לרטן אותו. הzz אוטו רק אם הוא נמצא בסכנה, למשל, ממים عمוקים, אש או חפצים חדים.

תמן בראש ילך באמצעות משחו רך, כגון כרית או הברכיים שלך.

בדוק אם התרפיה במינון הנכון עברו ילך, בהתאם לגילו.

## אופן השימוש בתרופה

יש לבקש מרופא, רוקח או אחות להראות לך כיצד לנקה או לתת תרופה זו. תמיד תפנה אליהם במידה ואינך בטוח. המודיע כיצד לתת תרופה זאת מופיע גם בתווית על השפופרת.

**בוקולאם אסור להזרקה. אין לחבר מחת למזרק.**

### שלב 1



### שלב 2



### שלב 3





#### יש להזמין אמבולנס באופן מיידי במקרים הבאים:

- ההתקף אינו מפסיק תוך 10 דקות
- אין לך לרוקן את המזרק או שפכט חלק מתכולתו
- נשימה הילד מאטה או מפסיקת, למשל נשימה איטית או שטחית או הכלה של השפטים
- אתה מבחין בסימני התקף לב אשר עשויים לכלול כאב בחזה או כאב המתפשט לצוואר והכתפיים ויורד לזרוע השמאלית
- הילד מקיא והתקף אינו מפסיק תוך 10 דקות
- אתה נותן יותר מדי בוקולאמ ו**יש סימני מנת יתר**, הכוללים:
  - נמנום, עייפות, תשישות
  - בלבול או תחושת חוסר התמצאות
  - חוסר תגובה לציביטה או רפלקס הברך
  - קשיי נשימה (נשימה איטית או שטחית)
  - לחץ דם נמוך (סחרחות ורגשת חולשה)
  - תרדמת (קומה)

שמור את המזרק על מנת להראות אותו לצוות האmbולנס או לרופא.

#### **במקרה והמטופל מקייא:**

- אין לתת למטופל מנת נוספת ממנה נוספת של בוקולאמ.
- במידה והתקף אינו מפסיק תוך 10 דקות, הזמן אמבולנס.

אין לתת למטופל מנת תרופה הגבוההמצו שנקבעה ע"י הרופא. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה אליו.

**אין ליטול תרופות בחושרי בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהינך גוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**  
**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בבוקולאמ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אף אחת מהן.

#### **תופעות לוואי חמורות**

פנה מיד לייעוץ רפואי או הזמן אmbולנס אם המטופל סובל מהתופעות הבאות:

- קשיי נשימה חמורים כגון נשימה איטית או שטחית או הכלה של השפטים. במקרים נדירים מאוד תיתכן הפסקת נשימה.
- התקף לב. סימנים עלולים לכלול כאב בחזה אשר עלול להתפשט לצוואר הילד וכתפיו ויורד לזרועו השמאלית.
- התנפחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון אשר מקשה על בליעה או נשימה או עור חיור, דופק חלש ומהיר, או תחושת איבוד הכרה. יתכן אתה חווה תגבה אלרגית חמורה.

#### **תופעות לוואי נוספת**

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים):

- בחילוות והקאות.
- ישנוויות או איבוד ההכרה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים):

- פריחה, סרפה (פריחה גבושית), גירוד.

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 אנשים):

- אי שקט, חוסר מנוחה, עיינות, עצם או תוקפנות, התרגשות, בלבול, אופוריה (תוחשה מוגזמת של אישר או התרגשות או הדיזות (ראיה ויתכן שמיעה של דברים שאינם קיימים).
- התכווצויות שרירים ורעד שרירים (רעידות של שרירים שאינך יכול לשנות בהם).
- ירידה בערנות.
- כאב ראש.
- סחרחות.
- קושי בתיאום שרירים (התקפים).
- אובדן זמני של הזיכרון – משך האובדן תלוי בגודל מנת הבוקולאם אשר ניתן לחץ דם נמוך, קצב לב איטי, או אדמומיות בפנים ובצואר (הסכמה).
- עווית גרון (laryngospasm), התכווצות במיתרי הקול הגורמת לקושי ורעשים בנשימה).
- עצירות.
- יובש בפה.
- עייפות.
- שיהוק.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

בנוסף, ניתן לדוח באמצעות דוא"ל לחידת בטיחות המטופלים של בעל הרישום:

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראיתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריך תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי אריזת הקרטון, השופרת והמזרק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון:  
יש לאחסן מתחת ל- 25°C.  
אין לאחסן במקרר או במקפיא.  
יש לשמור את המזרק בתוך שופרת הפלסטייק המוגנה.  
אין להשליך תרופות לביב או לאשפה הביתיית. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

#### **6. מידע נוספת**

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sodium chloride, Water for injections, Hydrochloric acid and Sodium hydroxide (for pH adjustment).

#### **כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה:**

בוקולאמ תמייסה למtan לחילוף היפה הינה נוזל שקוף חסר צבע. היא משוכקת בתוך מזרק סגור בפקק מוקן מראש בצדע ענבר, המיועד לשימוש חד פעמי. כל מזרק אروع ב瓘רד שופרת פלסטייק מגנה. בוקולאמ קיימות באריזות קרטון המכילות 2-4 מזרקים מוקנים מראש/שפורה (מאותו המינון). יתכן ולא כל גגלי הארץזה משוווקים.

האריזות הקיימות הינן:

- לגלאי 3 חודשים ועד פחות משנה: 2.5 מ"ג - אריזה בעלת תווית צהובה
- לגלאי שנה ועד פחות מ-5 שנים: 5 מ"ג - אריזה בעלת תווית כחולה
- לגלאי 5 שנים ועד פחות מ-10 שנים: 7.5 מ"ג - אריזה בעלת תווית סגולה
- לגלאי 10 שנים ועד פחות מ-18 שנים: 10 מ"ג - אריזה בעלת תווית כתומה

שם בעל הרישום וכתובתו: ניאופרム קיור (2005) בע"מ, השילוח 6, פתח תקווה 49170.

שם הייצן וכתובתו: לבוטוריוס לסוי אס. אל., ברצלונה 69, 08970, סנט חואן דספִי, ברצלונה, ספרד.

מספר רישום התרכופה בפנקס התרכופות הממלכתי במשרד הבריאות:

בוקולאמ 2.5 מ"ג - 149 78 33743  
בוקולאם 5 מ"ג - 149 79 33744  
בוקולאם 7.5 מ"ג - 149 80 33745  
בוקולאם 10 מ"ג - 149 81 33746

נערך באפריל 2024.

לשם פשוטות והקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרכופה מיועדת לבני שני המינים.

Buccolam Oromucosal Sol PIL vr 01A

