



מרץ 2024

רופא/ה נכבד/ה,

רוקח/ת נכבד/ה,

חברת אי.אל.מדי-מרקט בע"מ מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לרופא של התכשיר:

CEFTRIAXONE MEDO 1 GR

צפטריאקסון מדו 1 גר'

חומר פעיל: CEFTRIAXONE (AS SODIUM) 1 G/VIAL

צורת מינון: POWDER FOR SOLUTION FOR INJ/INF

עדכונים בעלון לרופא

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Ceftriaxone is indicated for the treatment of the following infections in adults and children including term

neonates (from birth):

- ☐ Bacterial Meningitis
- ☐ Community acquired pneumonia
- ☐ Hospital acquired pneumonia
- ☐ Acute otitis media
- ☐ Intra-abdominal infections
- ☐ Complicated urinary tract infections (including pyelonephritis)
- ☐ Infections of bones and joints
- ☐ Complicated skin and soft tissue infections
- ☐ Gonorrhoea
- ☐ Syphilis
- ☐ Bacterial endocarditis

Ceftriaxone may be used:

- ☐ For treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in adults
- ☐ For treatment of disseminated Lyme borreliosis (early (stage II) and late (stage III) in adults and children including neonates from 15 days of age.
- ☐ For pre-operative prophylaxis of surgical site infections
- ☐ In the management of neutropenic patients with fever that is suspected to be due to a ceftriaxone – susceptible bacterial infection
- ☐ In the treatment of patients with bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with, any of the infections listed above

Ceftriaxone should be co-administered with other antibacterial agents whenever the possible range of causative bacteria would not fall within its spectrum.

Consideration should be given to official guidelines on the appropriate use of antibacterial agents.



ברצוננו להודיע שהעלון לרופא עודכן. בהודעה זו כלולים העדכונים המהותיים בלבד. החמרות מסומנות בצהוב, תוספת טקסט מסומנת בקו תחתון, מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

6.6 .Special precautions for disposal and other handling

...

Intravenous injection: Reconstitution uses Water for Injection; 1 g Ceftriaxone should be dissolved in 10 ml of water. ~~Administration is by slow intravenous injection over two to four minutes.~~ The injection should be administered over 5 minutes, directly into the vein.

...

העלון לרופא מצורף להודעה זו וכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <https://israel drugs.health.gov.il>.

ניתן לקבל את העלון מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת איי.אל.מדי-מרקט בע"מ.

