

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

فيفند™ 50 ملغ أقراص مطالية

فيفند™ 200 ملغ أقراص مطالية

فيفند™ 40 ملг/مл مسحوق لتحضير معلق للإعطاء عن طريق الفم

أقراص مطالية: فوريكونازول 50 ملغ، 200 ملغ voriconazole 50 mg, 200 mg يحتوي كل مل من المعلق الجاهز على: فوريكونازول 40 ملغ voriconazole 40 mg

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو كان يبدو لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

فيفند هو مستحضر مضاد لفطريات واسع الطيف مخصص لعلاج:

- داء الرشاشيات الغروي (عدوى ناجمة عن فطريات من صنف الرشاشية - Aspergillus)
 - حالات العدوى بالمبنيات (candida) في الجهاز الدموي (candidemia) في المرضى الذين ليس لديهم قلة العدوى
 - حالات العدوى الغروية بالمبنيات المقاومة للفلوكونازول (دواء مضاد للفطريات آخر) بما في ذلك C. krusei
 - حالات عدوى خطيرة ناجمة عن فطريات من صنف Fusarium - Scedosporium - .
- فيفند مخصص للمرضى لديهم حالات عدوى فطرية خطيرة، لا بل ربما تشكل خطرا على الحياة.
فيفند مخصص لمنع حالات عدوى فطرية غروية لدى من لديهم زرع نخاع العظم الذين في احتatar مرتفع.

الفصيلة العلاجية:

مضاد لفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو وقف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب حالات العدوى.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) لل المادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (أنظر البند 6).
- يمنع تناول هذا الدواء مع ترفيدين (الحساسية)، أستيميزول (الحساسية)، سيسابيريد (المشاكل في المعدة)، بيموزيد (المشاكل النفسية)، كينيدين (المشاكل في نظم القلب)، إپقبرادين (العلاج قصور القلب المزمن)، ريفابوتين (العلاج السل)، ريبامبيسين (العلاج السل)، ريفامبيسين (العلاج السل)، كاربامازيبين (العلاج الاختلاجات)، فينوباربิตال (العلاج الاختلاجات والأرق الشديد)، مشتقفات الإرغون (إرغوتامين، ثائي هيدروإرغوتامين؛ لعلاج الشقيقة)، سيروليموس (في المرضى الذين خضعوا لزراعة أعضاء)، إيفاخيرينز الذي يعطى بجرعة مقدارها 400 ملغ وما فوق مرة واحدة يومياً (العلاج -HIV)، ريتونافير في جرعات تعطى مرتين في اليوم، بمقدار 400 ملغ وما فوق في كل مرة (العلاج -HIV)، نيتة هيبيريكوم (St. John's Wort)، نالوكسيچول (العلاج الإمساك الناجم خاصة عن استعمال مسكنات الآلام الأفيونية (مثل المورفين، أو كسيكودون، فنتانيل، ترامadol، كوداين)، توغلپاتان (العلاج نقص صوديوم الدم) (hyponatremia) أو لإبطاء الإنفراخ في وظائف الكلى في المتعالجين الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسيات)، لوراسيدون (العلاج الاكتئاب)، فينتوكلاكس (العلاج متعالجين لديهم ابيضاض الدم المماوبي المزمن CLL).

قبل العلاج بـ فيفند، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من تفاعل تحسسي لمستحضرات من فصيلة الأزوارات.
- كنت تعاني من اعتلال عضلة القلب (cardiomyopathy)، نظم قلب غير منتظم أو بطيء أو شاذ في مخطط كهربائية القلب (ECG) الملقب بـ 'متلازمة QTc المطولة'.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض كبد. سوف يراقب الطبيب وظائف الكبد من خلال إجراء فحوصات دم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- يجب تجنب أي ضوء شمس والتعرض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واقي مع عامل حماية عالي (SPF)، حيث قد تكون هناك زيادة في حساسية الجلد لأشعة الشمس (UV). قد يزداد هذا بصورة أكبر بسبب أدوية أخرى تزيد الحساسية للضوء، مثل ميلوتريكسات. ينطبق هذا التحذير أيضاً على الأطفال.
- أثناء استعمال الدوا، أخبر الطبيب على الفور إذا كنت تطور حرق شمسي أو طفح جلدي شديد أو بثور في الجلد أو ألم في العظام. إذا ظهر أي من هذه الأعراض الجلدية، فمن المرجح أن يوجهك الطبيب إلى طبيب أمراض جلدية. هناك احتمال ضئيل لتتطور سرطان جلد عند استعمال فيفند على المدى الطويل.
- إذا كنت تطور علامات فشل الغدة الكظرية، حالة طيبة لا تنتج فيها الغدد الكظرية كميّات كافية من بعض هرمونات الستيرويد مثل الكورتيزول، الذي قد يسبب أعراضًا مثل التعب المزمن أو المستمر، ضعف العضلات، فقدان الشهية، فقدان الوزن، آلام البطن، يرجى منك إخبار الطبيب.
- إذا كنت تطور أعراض "متلازمة كوشينغ" التي ينتج فيها الجسم فائضاً من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل زيادة الوزن، نسيج دهني بين الكتفين، استدارة الوجه، اسمرار الجلد في البطن، في الفخذين، في الثديين والذراعين، جلد رقيق، الميل إلى الکدمات بسهولة، ارتفاع السكر في الدم، فرط الشعرانية، فرط التعرق، يرجى منك إخبار الطبيب.
- سيقوم الطبيب بمراقبة وظائف الكبد والكلوي عن طريق إجراء فحوصات دم أثناء العلاج بـ فيفند.
- قبل بدء العلاج وخالله يجب إجراء مراقبة لاضطرابات مستوى الشوارد الكهربائية مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم، المغنيسيوم والكالسيوم.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر سنين.

الفحوصات والمتابعة

نظرًا لأن فيفند يؤثر على الكبد والكلوي، فسوف يقوم الطبيب بمراقبة عمل الكبد والكلوي عن طريق إجراء فحوصات دم. يرجى منك إخبار الطبيب إذا كنت تشعر بألم في البطن أو إذا كان هناك تغيير في قوام البراز.

أدوية أخرى وثيفند

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

أدوية التي يجب تجنب إعطاؤها بتوقيف مع ثيفند إن أمكن و يجب ملائمة الجرعة إذا تم إعطاؤها سوية:

• فييترين (العلاج الصرعي) إذا كنت تتناول هذا الدواء فيجب رصد مستوى الفيتريتين في الدم.

• ريتونافير (العلاج HIV) بجرعة منخفضة بمقدار 100 ملغ مرتين في اليوم. جرعات معينة من ريتونافير لا يمكن تناولها مع ثيفند،

أنظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا"، تحت هذا البند.

• چلاسيديجي (العلاج السرطان) – إذا طلب منك استعمال الدواعين، سيقوم الطبيب بمراقبة نظم القلب في أوقات متقاربة أكثر.

أدوية بتوقيف مع ثيفند قد يطلب منك ملائمة الجرعة والمتابعة بـ الأدوية وأو ثيفند ما تزال ذات الفائدة المرغوبة:

• وارفارين ومضادات تخثر أخرى (مثل بنيفروكومون، أسينوكومرون)

• سيكلوسيپورين، تاكروليموس (المتعالجين خضعوا زراعة عضو)

• أدوية من نوع سولفونيل أوريا (مثل تولبوميد، غلبيزيد وغليبوريد) (العلاج السكري)

• ستاتينات (مثل أتروفاستاتين، سيمافاستاتين، لوؤاستاتين) (الخفض مستوى الكوليسترول)

• بنزوديازيبين (مثل ميديزولام، أليپروزولام وتريزازولام) (اللارق الشديد وللتهدئة)

• أو ميرازول (العلاج قرحة المعدة)

• حبوب منع الحمل (تحتمل أعراض جانبية مثل غثيان واضطرابات في الدورة الشهرية)

• مشتقات فينكا (مثل فينكريسين، فينبلاستين)، (العلاج السرطان)

• مثبطات كيناز التيروزين (مثل أكتينينيب، بوسوتينيب، كوزنوتينيب، سريتنيب، ذبرافينيب، ذراتينيب، نيلوتينيب،

سوينتيبي، إبروتينيب، ريبوتسكليب (العلاج السرطان)

• تريتينين (العلاج ابيضاض الدم)

• ايندينيافير وشنطات إنزيم HIV پروتياز أخرى (العلاج HIV)

• أدوية من فصيلة NNRTI لـ العلاج HIV (مثل ديلاقيردين، نيفيرلين، إفافيرينز) (يمنع تناول جرعات بمقادير معينة من إفافيرينز سوية

مع ثيفند، أنظر تحت هذا البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا")

• ميثانون (العلاج الإدمان)

• الأفيون قصير الأمد (مثل أفيتنانيل، فنتانيل، سوفينتانيل، (مسكنات الآلام بإجراءات جراحية)

• او كسيكودون وهيدروكودون (لتسكن آلام معتدلة حتى شديدة)

• أدوية مضادة للالتهاب غير سteroidية (مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك) (العلاج الألم والالتهاب)

• فلوكونازول (العلاج حالات عدوى فطرية)

• إفروميلوس (العلاج سرطان متقدم في الكلية ولدى متعالجين اجتازوا زراعة أعضاء)

• لتروموفير (منع مرض ناجم عن الفيروس المضخم للخلايا (CMV) بعد زرع نخاع العظم)

- إفاكافتور (العلاج التليف الكيسي (CF))
- فلوكوكساسلين (مضاد حيوي يُستعمل لعلاج حالات العدوى البكتيرية)

للمزيد من المعلومات حول الأدوية المذكورة أعلاه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.

الحمل والإرضاع
يُنصح بتجنب تناول الأدواء في حالة الحمل أو الرضاعة. إذا كنت حاملاً، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأدواء. إذا كنت رضاعاً، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأدواء.

إذا كنت حاملاً أو مرضع، تعرفي على تأثير الأدواء على الجنين قبل تناوله.

القيادة واستعمال الماكينات
يُنصح بتجنب تناول الأدواء قبل القيادة أو استخدام الماكينات. إذا كنت تتناول الأدواء قبل القيادة أو استخدام الماكينات، يجب انتظار ساعتين على الأقل.

- يحتوي الدواء على سكر أو سكراء إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، ارجع إلى الطبيب قبل تناول الدواء.
- يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار لدى مرضى السكري. قد يسبب ضرراً للأنسنان.
- يحتوي الدواء على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 ملغم) صوديوم لجرعة بمقدار 5 مل معلق، بمعنى آخر يعتبر "حال من الصوديوم".
- يحتوي المعلق على بنزوات الصوديوم.

أقراص مطالية

- تحتوي الأقراص على لاكتوز ولهذا إذا قيل لك من قبل طبيب إن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول الدواء.
- يحتوي قرص 50 أو 200 ملغم على أقل من 1 ملليمول (23 ملغم) صوديوم لقرص الواحد، بمعنى أنه يعتبر "حال من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا وفقاً لتعليمات الطبيب.

يجب عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بشأن الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة وطريقة العلاج سيحددان من قبل الطبيب فقط. سوف يتم تحديد الجرعة اعتماداً على وزنك وصنف العدوى.

بالاعتماد على استجابتك للعلاج، من المرجح أن يرفع أو يخفض الطبيب الجرعة اليومية.

إذا كان لديك مرض كبدي، فمن المرجح أن يخفض الطبيب جرعتك.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!

إذا كنت أو طفلك تتناولان ثيفند لمنع حالات العدوى الفطرية، فمن الجائز أن يقوم الطبيب بوقف العلاج إذا كنت أو طفلك تطوراً أعراضًا مرفقة للعلاج.

- يجب إعطاء الأقراص فقط إذا كان الطفل قادرًا على ابتلاع الأقراص.
- **أقراص مطالية:** يجب تناول القرص على الأقل ساعة قبل أو ساعة بعد وجبة الطعام.
يجب بلع القرص بكامله مع قليل من الماء.
ممنوع السحق/الشطر/المضغ، وذلك لأن القرص مطلي.

المعلق: يجب تناول المعلق ساعة على الأقل أو ساعتين بعد وجبة الطعام.
يُنصح بخلط المعلق مع أي دواء آخر ويُنصح تخفيض المعلق الجاهز بالماء أو أي سائل آخر.


تعليمات تجهيز المعلق:

سوف يجهز الصيدلى المعلق قبل صرفه.

يكون المعلق جاهزاً للاستعمال إذا كان على شكل سائل. إذا كان يبدو المسحوق جافاً، يجب تجهيز المعلق بموجب التعليمات فيما يلي.


1. انقر على القنبلة بطرف الأصبع لتحرير المسحوق.
2. قم بإزالة الغطاء.

3. أضف كأس قياس معياري (كأس القياس المعياري مرفق داخل العبوة) من الماء (ما مجموعه 46 مل) إلى القنينة. املأ كأس القياس حتى الخط المحدد وأضف الماء إلى القنينة. يجب عليك دالماً إضافة كمية إجمالية قدرها 46 مل من الماء، بغض النظر عن الجرعة التي تتناولها.
4. أعد الغطاء وخزن القنينة جيداً لمدة دقيقة. بعد التعليق، يجب أن تكون الكمية الإجمالية للسائل في المعلق 75 مل.
5. قم بإزالة الغطاء. اضغط على ملائم القنينة (المرفق داخل العبوة) لداخل عنق القنينة (كما هو موضح في الرسم أدناه). يتم إعطاء الملائم للسماح بملء المحقنة بالدواء من القنينة. قم بإعادة الغطاء للقنينة.
6. سجل تاريخ انتهاء صلاحية المعلق الجاهز على ملصق القنينة. يجب استعمال المعلق الجاهز في غضون 14 يوماً. يجب إتلاف جميع بقايا المعلق بعد هذا التاريخ.



تعليمات الاستعمال:

1. يجب استعمال المحقنة للاستخدام عن طريق الفم (المرفقة داخل العبوة) لقياس جرعة الدواء. خزن المعلق الجاهز في القنينة المغلقة قبل حوالي 10 ثوان من كل استخدام. قم بإزالة الغطاء.
2. ضع القنينة على سطح مستو وأنزل حافة المحقنة في الفتحة الموجودة في ملائم القنينة.
3. أقلب القنينة بينما تحافظ على ثبات المحقنة في مكانها. اسحب مكبس المحقنة ببطء حتى العلامة الصحيحة للجرعة التي تم ملائمتها من أجلك. من المفترض أن يكون الطرف العلوي من الحلقة السوداء على خط واحد مع الجرعة المناسبة المدونة على المحقنة.
4. إذا كنت تلاحظ وجود فقاعات كبيرة، فادفع مكبس المحقنة ببطء مرة أخرى إلى المحقنة، حتى يعود معلق الدواء إلى القنينة. كرر الخطوة رقم 3.
5. أقلب القنينة مرة أخرى إلى وضع مستقيم بينما ما تزال المحقنة في مكانها. أخرج المحقنة.
6. أدخل طرف المحقنة في فمك. اضغط ببطء على مكبس المحقنة لإخراج المعلق إلى داخل فمك (نحو الجهة الداخلية من الخد). لا تضغط بسرعة لإخراج الدواء. إذا تم إعطاء المعلق لطفل، فتأكد من أن الطفل يجلس أو يتم إبقاؤه في وضع منتصب قبل الإعطاء.
7. أغلق القنينة بالغطاء، يبقى ملائم القنينة في مكانه.
8. يجب غسل المحقنة بعد كل استخدام. قم بتنظيف الجزيئين من المحقنة بالماء والصابون وأشطفهما بالماء. جفف الجزيئين. احتفظ بالمحقنة في مكان نظيف بمصاحبة الدواء.



إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، فتووجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك. من الجائز أن تشعر بزيادة الحساسية للضوء نتيجة لتناول مفرط.

إذا نسيت تناول الدواء

من المهم تناول الدواء كل يوم في وقت محدد.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد، ولكن يُمنع بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة للتتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصي به من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

استمر في تناول الدواء حتى يأمرك الطبيب بالتوقف. إذا توقفت عن تناول الدواء مبكراً، فقد تستمر العدوى أو تعود. في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو مع حالات عدوى صعبة فمن الجائز أن تكون هناك حاجة إلى علاج طويل الأمد لمنع تكرار العدوى.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعماله ثقباً في اعراض جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تنداش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية.

أعراض جانبية خطيرة – يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب

- طفح
- يرقان، تغير في نتائج فحص وظائف الكبد بفحص الدم
- التهاب البنكرياس (pancreatitis)

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً (من المرجح أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- ضعف بالرؤية (تغيرات في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، تغيرات في الألوان، زيادة الحساسية للضوء، عمى ألوان، ضعف بالعين، رؤية هالة، عمى ليلي، تقلب بصرى، رؤية شرار، رؤية أورّة، انخفاض حدة البصر، بهر (الجهر من شدة الضوء)، تصبيق مجال الرؤية، بقع/نقط في مجال الرؤية)
- سخونة عالية
- طفح
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- تورم في الأطراف
- أوجاع في البطن
- صعوبة في التنفس
- زيادة في إنزيمات الكبد

أعراض جانبية شائعة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللثة، قشعريرة، ضعف
- انخفاض مستوى، بما في ذلك خطير، بعض خلايا الدم الحمراء وأو البيضاء (محظوظ أحياناً بسخونة)، انخفاض مستوى الصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم
- انخفاض مستوى السكر في الدم، انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، انخفاض مستوى الصوديوم في الدم
- قلق، عدم راحة، اكتئاب، ارتباك، صعوبة النوم، هلوسة
- اختلالات، رجفان أو حرکات للعضلات لا إرادية، إحساس بالوخز أو أحاسيس جلدية غير عادية، زيادة في توترية العضلات، نعاس، دوخة

• نزيف في العين

- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك نبض سريع/بطيء جداً، إغماء
- انخفاض ضغط الدم، التهاب وريدي (phlebitis)

• صعوبات خطيرة في التنفس، ألم في الصدر، تورم في الوجه (الفم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين

• إمساك، غُسْر الهضم، التهاب الشفتين

• يرقان، التهاب الكبد (hepatitis) وتلف الكبد

- أطاح جلدية التي يمكن أن تسبب تشققاً خطيراً وبثوراً في الجلد الذي تتميز بمنطقة مسطحة، حمراء في الجلد مغطاة بنتوءات صغيرة متصلة، احمرار في الجلد
- حكة

- تساقط الشعر
- آلام الظهر
- فشل كلوي، دم في البول، تغيرات في فحوصات وظائف الكلى
- حروق شمس أو ردة فعل جلدية خطيرة نتيجة التعرض للضوء أو للشمس
- سرطان الجلد

أعراض جانبية غير شائعة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

- أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تهيج والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب الجهاز الهضمي الذي يسبب الإسهال، التهاب الأوعية المفاوية
- التهاب النسيج الرقيق الموجود في الجدار الداخلي للبطن والذي يعطي تجويف البطن
- تضخم الغدد الليفافية (مؤلم في بعض الأحيان)، فشل نخاع العظم، زيادة في مستوى الخلايا اليلوزينية في الدم
- تراجع في الأداء الوظيفي للغدة الكظرية، قصور الغدة الدرقية
- أداء وظافي غير سليم للدماغ، أعراض شبيهة بمرض الباركنسون، ضرر عصبي الذي يسبب التنميم، الألم أو الوخز أو الإحساس بالحرقة في الأطراف
- مشكلة في التوازن أو التنسيق
- تورم في الدماغ
- رؤية مزدوجة، حالات خطيرة في العين والتي تشمل ألمًا والتهابًا في العينين والجفنين، حركة غير عادية للعين، وتلف العصب البصري مما يسبب اضطراباً بصرياً، تورم القرص البصري
- انخفاض الحساسية للمس
- تغير في حاسة التذوق
- اضطرابات في السمع، رنين في الأذنين، الدوار (الشعور بالدوران)
- التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، تورم والتهاب اللسان
- تضخم الكبد، فشل الكبد، حصى أو مرض في كيس المرارة
- التهاب المفاصل، التهاب وريدي المصحوب بشكل خثر دموية (تجلط الدم)
- التهاب الكلوي، بروتين في البول، تضرر الكلية
- نظم قلب سريع جداً أو تقوية ضربات، مصحوب أحياناً بنوبات كهربائية غير منتظمة
- تغيرات في مخطط كهربائية القلب (ECG)
- زيادة في مستوى الكوليستيرون في الدم، زيادة في مستوى اليلوريا في الدم
- ردود فعل تحسسية للجلد (خطيرة في بعض الأحيان) بما في ذلك حالات في الجلد تشكل خطراً على الحياة والتي تسبب ظهور بثور مؤلمة، حروق جلدية/ثاليل وفي الأغشية المخاطية، وخاصة في الفم، التهاب جلد، شرى، جلد أحمر ومتينج، بقع حمراء أو أرجوانية في الجلد بسبب انخفاض تعداد الصفائح الدموية، أكزيما
- رد فعل تحسسي أو استجابة مناعية غير طبيعية
- التهاب النسيج المحيط بالعظم

أعراض جانبية نادرة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- فرط نشاط الغدة الدرقية
- تدهور في أداء وظائف الدماغ (مضاعفات خطيرة لمرض كبدي)
- تضرر خطير في العصب البصري، تعكر القرنية، حرکات لا إرادية للعينين
- ظهور بثور نتيجة الحساسية/التعرض للضوء
- اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم جزءاً من الجهاز العصبي المحيطي
- مشاكل في نظم القلب أو التوصيل الكهربائي (يشكل خطراً على الحياة في بعض الأحيان)
- رد فعل تحسسي يشكل خطراً على الحياة
- اضطراب في جهاز تنفس الدم
- تشمل ردود الفعل التحسسية في الجلد (أحياناً خطيرة) تورماً سريعاً (وذمة) في الجلد، بقع حاكمة أو مؤلمة لجلد سميك، محمّر مع قشور، حكة في الجلد والأغشية المخاطية، وهي حالة جلدية تشكل خطراً على الحياة تتسبّب في انفصال أجزاء كبيرة من البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد) عن الطبقات السفلية من الجلد.
- بقع جلدية صغيرة، جافة وحرشفية، أحياناً سميكه مع "قرون"

أعراض جانبية التي شيوّعها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديد شيوّعها بعد):

- نمش وبقع صبغية

أعراض جانبية التي شيوّعها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديد شيوّعها بعد)، ولكنها ذات اعتبار و يجب التبليغ عنها إلى الطبيب المعالج على الفور:

- مناطق حمراء ومتقدّرة في الجلد أو كدمات في الجلد على شكل يشبه الحلقة التي قد تكون عارض لمرض مناعة ذاتية يسمى ذبة حمامية جلدية

هناك تقارير عن تطور سرطان الجلد في مرضى قد تناولوا ثيفند لفترة طويلة من الزمن.

لقد تم ملاحظة حروق شمس أو رد فعل جلدي خطير، نتيجة التعرض للضوء أو للشمس، بتوتر أعلى لدى الأطفال. إذا كنت أنت/طفلك تطوران اضطرابات جلدية، فمن الجائز أن يوجهك الطبيب المعالج إلى طبيب الأمراض الجلدية، الذي سيقرر بعد التشاور ما إذا كان من المهم أن تصل أنت/طفلك للمتابعة على أساس منتظم. ولقد تم أيضاً ملاحظة زيادة في إنزيمات الكبد بتوتر أعلى لدى الأطفال.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تتعارى مع عرض جانبي غير منكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للتبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجاالت رؤية الأطفال وأو الرضع، وهذا تجنب التسمم. لا تسبّب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- **أقراص مطلية:** يجب تخزينها في درجة حرارة أقل من 30°C.
- **المعلق قبل الإعداد:** يجب تخزين المسحوق في البراد (2°-8°C).
- **بعد الإعداد:** يجب تخزين المعلق الجاهز ما دون الـ 30°C، ليس في البراد وليس في المجمد، ويجب استعماله في غضون 14 يوم من يوم إعداده.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:
أقراص مطلية:

Lactose monohydrate, pregelatinised starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol triacetate.

المعلق:

Sucrose, citric acid (anhydrous), natural orange flavour, sodium citrate dihydrate, sodium benzoate, xanthan gum, silica colloidal anhydrous, titanium dioxide.

أقراص مطلية:

يحتوي كل قرص من ثيفند 50 ملغ على 62.5 ملغ أحادي هيدرات اللاكتوز.
يحتوي كل قرص من ثيفند 200 ملغ على 250 ملغ أحادي هيدرات اللاكتوز.

المعلق:

يحتوي كل 1 مل معلق على: 0.54 غرام سكروز.
تحتوي جرعة بمقادير 5 مل من المعلق على 12 ملغ بنزوات الصوديوم.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

ثيفند 50 ملغ أقراص مطلية: قرص مدور بلون أبيض-أوف وايت، مختوم على جانب واحد "Pfizer" ومن الجانب الثاني "VOR 50". يتم تسييقها في عبوات من 2، 10، 14، 20، 28، 30، 50، 56، 56، 100 قرص.
ثيفند 200 ملغ أقراص مطلية: قرص بشكل بيضوي بلون أبيض-أوف وايت حيث مختوم على جانب واحد "Pfizer" ومن الجانب الثاني "VOR 200". يتم تسييقها في عبوات من 2، 10، 14، 20، 28، 30، 50، 56، 100 قرص.
قد لا يتم تسييق جميع أحجام العينات.

ثيفند 40 ملغ/مل مسحوق لإعداد معلق يعطى عن طريق الفم: مسحوق بلون أبيض - أوف وايت لإعداد معلق بلون أبيض - أوف وايت بنكهة البرتقال. يتم تسييقه في قبينة التي تحتوي على 45 غرام مسحوق لإعداد 75 مل معلق.

صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر بي أف إي مستحضرات دوائية إسرائيل م.ض، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتواخ 46725

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ثيفند 50 ملغ أقراص مطلية: 126-69-30596

ثيفند 200 ملغ أقراص مطلية: 126-70-30597

ثيفند 40 ملغ/ملل مسحوق لإعداد مُعلق يعطى عن طريق الفم: 134-48-31157

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لأنّباء كلا الجنسين.

تم تحدّيث النشرة في 01/2024 وفق تعليمات وزارة الصحة.