

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986		
<div>يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط</div>		
سلسبيت	سلسبيت	
250 ملغ	500 ملغ	أقراص
<div>كبسولات</div>	<div><span></span></div>	<div><b>Roche</b></div>

**التركيب:**

كل كبسولة تحتوي:

ميكوفينولات موفيتيل 250 ملغ	Mycophenolate mofetil
ميكوفينولات موفيتيل 500 ملغ	Mycophenolate mofetil 500 mg

\*لمعلومات عن المركبات غير الفعالة والمثيرة للحساسية أنظر الفقرة 2 "قبل استعمال الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

● **إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك فقط. لا تعطيه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

**معلومات هامة إقرأها بتمعن**

تحذير:

يؤدي ميكوفينولات إلى إجهاضات وتشوهات خلقية. لا يجوز بدء العلاج بـ **سلسبيت** لدى نساء في سن الخصوبة، بدون فحص حمل سلبي قبل بدء العلاج.

يجب الإنصياح لتعليمات منع الحمل التي ستقدم لك من قبل الطبيب المعالج. قبل تناول المستحضر، يجب إستشارة الطبيب مجدداً في حال عدم فهمك لكامل التعليمات. لمعلومات إضافية، أنظر فقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" وفقرة "الحمل، منع الحمل والإرضاع".

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل الدواء **سلسبيت**، بالمشاركة مع سيكلوسبورين وكورتيكوستيروئيدات لمنع رفض عضو مزروع لدى مزروعي كلية، قلب أو كبد.

**الفصيلة العلاجية**

من الأدوية الكابحة لجهاز المناعة (Immunosuppressants).

### 2. قبل إستعمال الدواء

**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً لـ mycophenolic acid، mycophenolate mofetil، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية").
- كنت امرأة في سن الخصوبة ولم تجري فحص حمل سلبي قبل الحصول على الوصفة الأولى لـ **سلسبيت**، ذلك لأن ميكوفينولات يسبب إجهاضات وتشوهات خلقية.
- كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.
- كنت امرأة في سن الخصوبة ولا تستعلمي طرق ناجعة لمنع الحمل (لمعلومات إضافية، أنظري فقرة "الحمل، منع الحمل والإرضاع").
- كنت في فترة الرضاعة.

إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة سابقاً، فلا يجوز تناول الدواء. إذا لم تكن واثقاً، راجع طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل تناول **سلسبيت**.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

**لا يجوز بدء العلاج بـ سلسبيت ويجب مراجعة الطبيب المعالج حالاً إذا:**

- كان عمرك فوق 65 سنة، ذلك لأنه مقارنة بالمعالجين الأصغر سناً، هناك خطورة أكبر لتطوير أعراض جانبية مثل: تلوثات من فيروسات معينة، حالات نزف في الجهاز الهضمي ووذمة رئوية.
- وجدت لديك علامة لحدوث تلوث، مثل: سخونة أو ألم في الحنجرة
- وجدت لديك كدمات أو انزفة غير متوقعة
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل: قرحة معدية)
- كنت تخططين للحمل، أو إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بالدواء.
- إذا وجد لديك نقص إنزيم وراثي مثل متلازمة **Lesch-Nyhan** و- **Kelley-Seegmiller**.

إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة سابقاً (أو إذا لم تكن واثقاً)، راجع الطبيب المعالج فوراً، قبل تناول الدواء.

**تأثير ضوء الشمس على العلاج**

يقلل **سلسبيت** من آليات دفاع جسمك. نتيجة لذلك، هناك خطورة متزايدة لتطوير سرطان الجلد. يتوجب عليك الحد من تعرضك للشمس ولأشعة UV بواسطة:

- إرتداء ملابس واقية بحيث تغطي أيضاً رأسك، عنقك، ذراعيك ورجليك.
- إستعمال واقيات الأشعة ذات عامل واقى عال.

**الأطفال**

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال دون عمر سنتين لأنه بناءً على معلومات النجاعة والسلامة المتوفرة، لا يمكن إعطاء توصيات بشأن المقدار الدوائي لهذه الفئة العمرية.

**سلسبيت والأدوية الأخرى**

**إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.**

من المهم فعل ذلك نظراً لأن الدواء **سلسبيت** قد يؤثر على طريقة عمل أدوية أخرى وأدوية أخرى قد تؤثر على طريقة عمل **سلسبيت**. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول الأدوية التالية قبل بدء العلاج بـ **سلسبيت**:

- أزاثيوبرين أو أدوية أخرى الكابحة لجهاز المناعة التي تعطى بعد الزرع.
- كوليستيرامين - دواء لعلاج إرتفاع الكوليسترول.
- ريفامبيسين - مضاد حيوي مخصص لمنع ومعالجة التلوثات مثل السل (TB).
- مضادات الحموضة، أو مثبطات مضخة البروتونات (PPIs) - مستحضرات

لمعالجة مشاكل فرط حموضة المعدة، مثل عسر الهضم.

- المستحضرات الرابطة للفوسفات - تعطى للمتعالجين الذين يعانون من قصور كلوي مزمن لتخفيض كمية الفوسفات الممتصة للدم.
- مضادات حيويّة - تُستعمل لعلاج حالات عدوى جرثومية.
- إيزوكونازول - يُستعمل لعلاج حالات عدوى فطريّة.
- تلميسارتان - يُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع.

**اللقاحات**

إذا توجب عليك تلقي لقاح (لقاح حي - مضعف) ومازلت تتعالج بـ **سلسبيت**، عليك أولاً التوجه للطبيب أو للصيدلي الخاص بك. يرشدك الطبيب المعالج عن أية لقاحات يمكنك تلقيها.

لا يجوز التبرع بالدم خلال فترة العلاج بـ **سلسبيت** وحتى 6 أسابيع على الأقل بعد إنتهاء العلاج.

لا يجوز التبرع بالحيوانات المنويّة خلال فترة العلاج بـ **سلسبيت** وحتى 90 يوماً على الأقل بعد إنتهاء العلاج.

**إستعمال الدواء والطعام**

لا يوجد للطعام والشراب تأثير على العلاج بـ **سلسبيت**.

**الحمل، منع الحمل والإرضاع**

**منع الحمل لدى النساء اللواتي يتناولن سلسبيت:**

دائماً يجب إستعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل وذلك لدى نساء في سن الخصوبة اللواتي وصف لهن العلاج بـ **سلسبيت**:

- قبل بدء العلاج بـ **سلسبيت**
- خلال كامل فترة العلاج بـ **سلسبيت**
- خلال 6 أسابيع بعد التوقف عن العلاج بـ **سلسبيت**

يجب إستشارة الطبيب المعالج حول وسائل منع الحمل المناسبة أكثر من أملك. وسائل منع الحمل تلك تحدد وفقاً لحالتك. من المفضل استعمال وسيلتين من وسائل منع الحمل لأن ذلك سيقصص الاحتمال لحصول حمل غير مخطط له.

**يجب مراجعة الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعتقدين بأن وسيلة منع الحمل لم تكن ناجعة أو إذا نسيت تناول قرص منع الحمل.**

لا يمكنك الحمل، إذا كان أحد المعايير التالية ينطبق عليك:

- كنت امرأة بسن اليأس، أي: عمرك 50 سنة على الأقل وتلقيت طمثك الأخير قبل أكثر من سنة (في حال توقف طمثك جراء علاج سرطان، لا يزال هناك إحتمال أن تحملي)
- إجتزت عملية جراحية لإستئصال البوقين والمبيضين (bilateral salpingo-oophorectomy)
- إجتزت عملية جراحية لإستئصال الرحم (hysterectomy)
- في حال أن مبيضيك لا يعملان (فشل مبيضي مبكر، والذي شُخص من قبل أخصائي نسائي)
- ولدت ولديك إحدى الحالات النادرة التالية، والتي لا تتمكنك من الحمل: نمط جيني XY (XY genotype)، متلازمة تورنر (Turner syndrome) أو عدم تطور الرحم (Uterine agenesis)

- كنت طفلة أو مراهقة، ولم تبدأ بتلقي الطمث

**منع الحمل لدى الرجال الذين يتناولون سلسبيت**

- لا تشير المعطيات المتوفرة إلى ارتفاع في احتمال حدوث إعاقات أو حالات إجهاض إذا كان الأب يتناول ميكوفينولات. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية الخطر تماماً. كوسيلة حذر، يوصى بأن تستخدم أنت أو زوجتك وسائل منع حمل موثوقة خلال فترة العلاج ولمدة 90 يوماً بعد انتهاء العلاج.
- إذا كنت أنت وزوجتك تخططان للحمل، تحدث مع الطبيب حول المخاطر المحتملة والعلاجات البديلة.

**الحمل والإرضاع**

يجب إستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول المستحضر، وذلك إذا كنت في فترة الحمل، مرضعة، تخططين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.

يناقشك الطبيب حول المخاطر في فترة الحمل وحول العلاجات البديلة التي يمكن إستعمالها لمنع رفض العضو المزروع، في الحالات التالية:

- كنت تخططين للحمل
  - لم تتلقي طمث أو تعتقدين بأنك لم تتلقي طمث، لديك نزف طمثي مختلف عن المعتاد، أو إذا كنت تشكين بأنك حامل
  - مارست علاقات جنسية دون إستعمال وسائل ناجعة في منع الحمل
- يجب إبلاغ الطبيب حالاً إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ **سلسبيت**. مع ذلك، يجب الإستمرار في تناول **سلسبيت** حتى زيارة الطبيب.

**الحمل**

يؤدي ميكوفينولات لإجهاضات بشيوع مرتفع جداً (50%) ولتشوهات خلقية خطيرة (23%-27%).

التشوهات الخلقية التي بلغ عنها، تشمل: تشوهات في الأذنين، في العينين، في الوجه (شق في الشفة/شق في الحنك)، في تطور الأصابع، القلب، في المريء (الأنبوب الذي يربط ما بين الحنجرة والمعدة)، في الكلى وفي جهاز الأعصاب (مثلاً شق في العمود الفقري - عندما لا تتطور كما ينبغي عظام العمود الفقري). طفلك قد يصاب بواحد أو أكثر من التشوهات الواردة أعلاه.

لا يجوز بدء العلاج بـ **سلسبيت** لدى نساء في سن الخصوبة، بدون فحص حمل سلبي قبل بدء العلاج. يجب الإنصياح لتعليمات منع الحمل التي قدمت لك من قبل الطبيب المعالج. بإمكان الطبيب أن يطلب إجراء فحص حمل إضافي لكي يضمن بأنك لست حامل قبل بدء العلاج.

**الإرضاع**

لا يجوز إستعمال **سلسبيت** إذا كنت مرضعة، نظراً لأن كميات ضئيلة من الدواء قد تدخل إلى حليب الأم.

**السياقة وإستعمال الماكينات**

يوجد لـ **سلسبيت** تأثير متوسط على القدرة على السياقة أو إستعمال الأدوات والماكينات. إذا كنت تتعثر بالنعاس، بالخدر أو بالارتباك، تحدث مع الطبيب أو مع المرمرضة ولا تقم بالسياقة أو استعمال أدوات أو ماكينات إلى أن تشعر بشكل أفضل.

محتوى الصوديوم في **سلسبيت**

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميللمول صوديوم (23 ملغ) بكل كبسولة/قرص ولذلك يُعتبر "خالٍ من الصوديوم".

### 3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

**المقدار الدوائي الإعتيادي**

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي يتعلق بنوع الزراعة التي إجتزتها. المقادير الدوائية الإعتيادية مذكورة لاحقاً.

يستمر العلاج لطالما هناك حاجة بمنع رفض العضو المزروع من قبل جسمك.

**لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.**

**زرع كلية**

الكبار:

- المقدار الدوائي الأولي يعطى خلال 3 أيام من الزراعة.
- المقدار الدوائي اليومي هو 2 غرام من **سلسبيت**، مقسم إلى مقدارين منفصلين: 1 غرام في الصباح و - 1 غرام في المساء.
- الأطفال (بأعمار سنتين حتى 18):
- يتعلق المقدار الدوائي بحجم الطفل.
- يقرر الطبيب المعالج بالنسبة للمقدار الدوائي الأكثر ملاءمة وذلك حسب طول ووزن طفلك.

**زرع قلب**

الكبار:

- المقدار الدوائي الأولي يعطى خلال 5 أيام من الزراعة.
- المقدار الدوائي اليومي هو 3 غرام من **سلسبيت**، مقسم إلى مقدارين منفصلين: 1.5 غرام في الصباح و - 1.5 غرام في المساء.
- الأطفال:

- لا توجد معلومات حول إعطاء **سلسبيت** لأطفال بعد زراعة قلب.

**زرع كبد**

الكبار:

- المقدار الدوائي الأولي من **سلسبيت** يعطى لك على الأقل بعد 4 أيام من الزراعة وعندما تكون قادراً على بلع أدوية.
- المقدار الدوائي اليومي هو 3 غرام من **سلسبيت**، مقسم إلى مقدارين منفصلين: 1.5 غرام في الصباح و - 1.5 غرام في المساء.
- الأطفال:

- لا توجد معلومات حول إعطاء **سلسبيت** لأطفال بعد زراعة كبد.

**طريقة إستعمال الدواء**

يجب بلع الكبسولات/الأقراص بشكلها الكامل، مع كأس من الماء.

لا يجوز كسر أو سحق الكبسولات/الأقراص.

**الكبسولات:** لا يجوز فتح أو شطر الكبسولات. لا يجوز تناول كبسولات تم فتحها أو شطرها إلى نصفين.

يجب الإمتناع عن حصول تماس بين المسحوق المنسكب من الكبسولات المتضررة وبين الجلد، العينين والفم. إذا فتحت/كُسرت كبسولة بالخطأ، يجب شطف بقايا المسحوق عن الجلد بالماء والصابون. إذا دخل مسحوق إلى العينين/الفم، يجب الشطف جيداً بالكثير من الماء. **إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو** إذا بلع طفل أو أي شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

**إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب،** يجب تناول مقدار دوائي حال تذكرك والإستمرار بتناول الدواء في الأوقات المحددة. لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن مقدار دوائي منسي.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

**في حال توقفك عن تناول الدواء**

لا تتوقف عن العلاج بالدواء **سلسبيت**، إلا إذا أوصاك طبيبك بفعل ذلك. في حال توقفك عن العلاج فأنت قد تزيد من خطورة رفض العضو المزروع.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي **في كل مرة** تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **سلسبيت** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أباً منها.

**عليك التوجه للطبيب حالاً إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة التالية – من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ:**

- وجدت لديك علامة لتلوث، مثل سخونة أو ألم في الحنجرة
- كنت تعاني من كدمات أو انزفة غير متوقعة
- كنت تعاني من طمح، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان أو في الحنجرة، مع صعوبة في التنفس - من الجائز أن لديك رد فعل تحسسي حاد للدواء (مثل صدمة إستهدافية، وذمة وعائية).

**أعراض جانبية شائعة**

بعض الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً هي: إسهال، قلة كريات الدم البيضاء أو الحمراء في الدم، تلوث وتقيؤات. يقوم الطبيب المعالج بإجراء فحوص دم منتظمة من أجل تشخيص تغيرات ب:

- عدد خلايا دمك أو علامات لحدوث تلوث.

قد يعاني الأطفال من الأعراض الجانبية التالية بإحتمال أكبر مما هو عليه عند الكبار: إسهال، تلوثات، قلة كريات الدم البيضاء وقلة كريات الدم الحمراء.

**الوقاية من التلوثات**

الدواء **سلسبيت** يقلل من الآليات الدفاعية لجسمك، وذلك لمنعك من رفض العضو

المزروع. نتيجة لذلك، فإن قدرة جسمك على محاربة التلوثات تصبح أقل جودة من المعتاد. وبالتالي فأنت قد تصاب بتلوثات بشكل أكثر من المعتاد، يشمل ذلك: تلوثات الدماغ، الجلد، الفم، المعدة، الأمعاء، الرئتين والجهاز البولي.

#### سرطان الجلد والليمفا

بالمشابه لما قد يحدث لدى المعالجين يتناولون أدوية من هذا النوع (الأدوية الكابحة لجهاز المناعة)، فإن عدد قليل جداً من المعالجين الذين تناولوا سلسبيت تطور لديهم سرطان الأنسجة اللمفاوية وسرطان الجلد.

#### أعراض جانبية إضافية:

أنت قد تعاني من أعراض جانبية عامة التي تؤثر على كامل الجسم حيث تشمل:

ردود فعل تحسسية خطيرة (مثل: صدمة إستهدافية، وذمة وعائية)، سخونة، الشعور بإرهاق شديد، صعوبات في النوم، آلام (مثل: آلام بطنية، آلام في الصدر، آلام مفصلية أو عضلية)، صداع، أعراض إنفلوإنزا وإنتفاخ.

#### أعراض جانبية أخرى يمكن أن تشمل:

مشاكل في الجلد، مثل: حب الشباب، جروح البرد، العقبولة المنطقية، أورام جلدية، تساقط شعر، طفح وحكة.

مشاكل في الجهاز البولي، مثل: دم في البول.

مشاكل في الجهاز الهضمي وفي الفم، مثل:

- إنتفاخ اللثة وتقرحات في الفم
- إلتهاب البنكرياس، الأمعاء الغليظة أو المعدة
- اضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل نزف؛
- اضطرابات في الكبد
- إسهال، إمساك، شعور بالمرض (غثيان)، صعوبات هضمية، فقدان الشهية للطعام، نفخة (غازات في جهاز الهضم)

#### مشاكل في الجهاز العصبي، مثل:

- دوار، نعاس أو خدر
  - رجفان، تقلصات عضلية، تشنجات
  - الشعور بقلق أو إكتئاب، تغيرات في المزاج أو في الأفكار
- مشاكل قلبية ومشاكل في جهاز الدم، مثل:
- تغيرات بضغط الدم، نظم قلب متسارع، توسع الأوعية الدموية

#### مشاكل في الرئتين، مثل:

- إلتهاب الرئتين، إلتهاب القصبات الهوائية (bronchitis)
- ضيق تنفس، سعال قد ينتج عن توسع القصبات (Bronchiectasis - حالة تتوسع فيها الطرق الهوائية في الرئتين بشكل شاذ) أو تليف رئوي (تندب الرئتين). يجب إستشارة الطبيب إذا تطور لديك سعال لا يتوقف أو ضيق تنفس
- سوائل في الرئتين أو داخل الصدر
- مشاكل في الجيوب الأنفية

مشاكل إضافية مثل: إنخفاض الوزن، النقرس (gout)، ارتفاع نسبة السكر بالدم، أنزفة وكدمات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية التي ذكرت سابقاً، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

#### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي التسمم.
- لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية، في مكان بارد وجاف. يجب الحفظ بالعبوة الأصلية لحمايته من الرطوبة.
- لا يجوز رمي الدواء لمياه المجاري أو لسلة المهملات البيئية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم يعد هناك حاجة بها. تلك الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

كبسولات 250 ملغ:

**Capsules:** starch pregelatinized, croscarmellose sodium, polyvidone K90, magnesium stearate.

**Capsules shells:**

**Body:**

titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), gelatin, printing Ink.

**Cap:**

titanium dioxide (E171), indigo carmine FD&C blue 2 (E132), gelatin, printing ink.

أقراص 500 ملغ:

**Tablets:** microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, polyvidone K90, magnesium stearate.

**Tablet Coating:** hypromellose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide (E171), macrogol 400, indigo carmine aluminium lake (E132), iron oxide red (E172).

#### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

كبسولات سلسبيت هي كبسولات مطاولة، جانب واحد بلون أزرق وجانب ثاني بلون بني. على الجزء الأزرق من الكبسولات طُبعت الكتابة "CellCept 250" بلون أسود وعلى الجزء البني طُبعت الكتابة "Roche" بلون أسود. الكبسولات متوفرة بعبوات ذات 100 [ضمن عبوة لويحة (بليستر) ذات 10].

أقراص سلسبيت هي أقراص مطاولة (على شكل كبسولة)، مطلية، ذات لون مائل للبنفسجي. على جانب واحد من الأقراص طُبعت الكتابة "CellCept 500" وعلى الجانب الثاني طُبعت الكتابة "Roche". الأقراص متوفرة بعبوات ذات 50 [ضمن عبوة لويحة (بليستر) ذات 10].

**صاحب الإمتياز وعنوانه:** روش فارماسيوتيك (إسرائيل) م.ض.، ص.ب. 6391، هود هشارون 4524079.

**إسم المنتج وعنوانه:** هوفمان — لا روش م.ض.، بازل، سويسرا.

**تم التحديث في آذار 2024.**

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

سلسبيت 250 ملغ كبسولات: 111.34.29434

سلسبيت 500 ملغ أقراص: 111.35.29435

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.