



עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ונטולין תמייסה לשאיפה

תמייסה לשאיפה לאינהלציה עם נבולייזר (מכשיר אינהלציה)

חומר פעיל:

סאלבוטאמול (כסולפאט) 5 מ"ג/מ"ל

salbutamol (as sulfate) 5 mg/ml

לרשימת החומרים הבלטי פיעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספים".
קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ונטולין תמייסה לשאיפה מיועדת לשימוש במבוגרים, מתבגרים וילדים.
ונטולין תמייסה לשאיפה מיועדת לשימוש בטא-2, בעל פעילות קצרת טווח.
(ברונוכוספazzom) כרונית אשר אינה מוגיבה לטיפול המקביל וכן לטיפול באסתמה חריפה חמורה.

קבעת רפואיית:

מרחיבי סمفונות מהיריה פעולה, אגוניסט סלקטיבי של רצפטורי בטא-2, בעל פעילות קצרת טווח.

ונטולין תמייסה לשאיפה מכילה את החומר הפעיל סאלבוטאמול המשתייך לקבוצה של תרופות הנקראט מרחיבי סمفונות מהיריה פעולה.

- מרחיבי סمفונות עזרים לדרכי האוויר בריאות להישאר פתוחות, דבר המקל על כניסה ויציאת אויר.
- הם עזרים להקל על לחץ בבית החזה, צפופים ושיעול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לסאלבוטאמול סולפאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

יש להשתמש בוונטולין תמייסה לשאיפה לפי הצורך ולא באופן סדייר.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בוונטולין תמייסה לשאיפה, ספר לרופא אם:

- האסתמה שלך פעילה (לדוגמה, יש לך תסמנינום תכופים או התלקחות כמו קוצר נשימה שגורם לקושי בדיור, באכילה או בשינה, שיעול, צפופים, לחץ בבית החזה או יכולת גופנית מוגבלת), עליך לספר על כך במידית לרופא אשר עשוי לסייע给你 להעלאת מינון של תרופה הנחננת לשילטה באסתמה שלך כמו קורטיקוסטרואיד בשאיפה.
- יש לך לחץ דם גבוה.
- יש לך סוכרת.
- יש לך פעילות יתר של בלוטת התריס.
- יש לך היסטוריה של בעיות לב כמו דופק לא סדייר, דופק מהיר או תעוקת חזה.
- אתה משתמש בתמייסה אחרת למכתיר אינהלאציה כמו איפראטרופינים ברומיד, יש לוודא כי האדים לא נכנסים לעיניך. ניתן למנוע זאת על ידי שימוש בפייה במקום מסיכת פנים או שימוש במקפי מגן.
- אתה נוטל נגירות קסנתין (כמו תאופילין) או סטרואידים לטיפול באסתמה.
- אתה נוטל משתנים, המשמשים לעיתים לטיפול בחץ דם גבוה או במחלת לב.
- נטלה תרופות אחרות המשמשות להקלת על גודש באף (כמו אפדרין או פסואדואפדרין) או תרופות אחרות המשמשות לטיפול באסתמה.

איןטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך歎ת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. יש לידע במיוחד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
• תרופות לדופק לא סדייר או מהיר (במיוחד מקבוצת חוסמי בטא כגון פרופרנוולול).

- תרופות אחרות לאסתמה שלך.

הירין והנקה

אם את בהירין או מניקה, חשוב שיתacen שאתה בהירין או אם אתה מתכוון להרות, התיעצץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שוונטולין תמייסה לשאיפה תשפייע על יכולתך לנוהג או להשתמש בכלים או במכונות כלשהם.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ונטולין תמייסה לשאיפה מכילה 0.1 מ"ג/מ"ל בנזאלקוניום כלורייד (benzalkonium chloride) בכל יחידת מינון.

בנזאלקוניום כלורייד עלול לגרום לצפופים וקשה נשימה (ברונכוספאזם), ביחיד אם יש לך אסתמה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתחום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח במנון ואופן הטיפול בתחום.

יש לשתמש בתרופה רק בשאייה ממכ Shir אין הלאציה, ואסור להזריק או לבלוע אותה. מכ Shir האינה לאציה מייצר אדים עדינים אותם אתה שואף פנימה דרך מסתכת פנים או פירא. ודא שאתה יודע כיצד לשתמש בו כיאות. אם אתה נתקל בבעיות, היועץ ברופא, באחות או ברוקח.

אל אפשר לתרופה או לאדים המיזרים על ידי מכ Shir אין הלאציה להיכנס לעיניך. השתמש במכ Shir אין הלאציה בחדר מאורר היטב מפני שהאלים ישחררו לאויר ועלולים להישאף פנימה על ידי אחרים. ודא שאתה יודע איך, מתי ובכמה תמיisha לשתמש.

הרופא המתפל יכול להתחיל את הטיפול ולנטר קלינית את השימוש הביתי במכ Shir אין הלאציה ובתרופה המיעודות לשאייה באינה לאציה לטיפול אקטוי באסתמה ילדים ובמבוגרים.

השתמש רק במכ Shir אין הלאציה שהומלץ על ידי הרופא והשגח על ידיך בזמן שהם משתמשים במכ Shir אין הלאציה.

פנה לקבלת עזרה רפואיית דחויפה אם התרופה לשימוש באינה לאציה אינה משפיעה, גם אם ישנה הטבה לפוך ומן קצר לאחר השימוש בתרופה שנרשמה לך.

ספר לרופא בהקדם האפשרי אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת עליך כרגיל (לדוגמה אם אתה זוקק למין גבוה יותר של התרופה כדי להקל על בעיות הנשימה שלך או שהשימוש במשאף שלך לא יוצר הקלה הנמתחת לפחות 3 שעות), כיוון שייתכן כי האסתמה שלך מחרירה ואולי תצטרכך לרופאה אחרת.

אם אתה משתמש בוונטולין תמיisha לשאייה יותר מפעם בשבוע לטיפול בתסמיני האסתמה שלך, לא כולל שימוש מניעתי לפני פעילות גופנית, זה מצביע על אסתמה שאינה נשלט היטב זהה עלול להעלות את הסיכון להתקפות חמורות של אסתמה (החמרה של האסתמה) שייתכן יהיה להן סיבוכים חמורים שיכולים להיות מסכני חיים או אפילו קטלניים. עליך לפנות לרופא בהקדם האפשרי כדי לבחון את הטיפול שלך באסתמה.

אם אתה משתמש בתרופה אנטי-דלקתית לריאות敞开 יום-יום, לדוגמה "קורטיקוסטרואיד בשאייה", חשוב להמשיך לשימוש בה באופן סדיר, אפילו אם אתה מרגיש יותר טוב.

יתacen כי הרופא רשם לך טיפול לסירוגין (להתקחיות קצרות אקריאיות) או טיפול רציף בוונטולין תמיisha לשאייה. המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המיןון המקביל בדרך כלל הוא:

טיפול לסיוגין (Intermittent treatment)

- מבוגרים ומתבגרים בני 12 שנים ומעלה – 0.5 מ"ל עד 1 מ"ל של ונטולין תמישה לשאייפה עד 5 מ"ג סאלבוטאמול). חלק מהמתופלים עשויים לצורק עד 2 מ"ל (10 מ"ג סאלבוטאמול).
- ילדים בני 18 חודשים עד 12 שנים – 0.5 מ"ל עד 1 מ"ל של ונטולין תמישה לשאייפה עד 5 מ"ג סאלבוטאמול).

יתכן שהרופא אמר לך לדלл את ונטולין תמישה לשאייפה עם תמישת מלח סטרילית (סלין) לפני השימוש בה במק Shir האינלהציה. זכור לעקוב אחרי הוראות הדילול.

טיפול רציף (Continuous treatment)

1 עד 2 מ"ג של סאלבוטאמול לשעה. ניתן להגיע למונה זו על ידי דילול של 1 או 2 מ"ל של ונטולין תמישה לשאייפה ל-100 מ"ל עם תמישת מלח (סלין) סטרילית ליצירת תמישה המכילה 50 או 100 מיקרוגרם/מ"ל של סאלבוטאמול, ושייפת האדים ממק Shir האינלהציה מתאים.

אין לעבור על המונה המומלצת.

איך לשימוש בתרופה

1. הcn את מכשיר האינלהציה למילוי.
2. מדוד את הכמות הנכונה של ונטולין תמישה לשאייפה והcnס אותה לקירית מכשיר האינלהציה.
3. הוסף את הכמות הנכונה של תמישת מלח (סלין) סטרילית (ודא כי הרופא הנחה אותך בכמות שצרייך לשימוש).
4. הנח את המכסה על קירית מכשיר האינלהציה ונער אותה בעדינות כדי לערוב את התcolaה.
5. הרכב את מכשיר האינלהציה והשתמש בו על פי ההנחיות.
6. לאחר השימוש השLR כל תמישה שנותרה בקירית מכשיר האינלהציה. נקה את מכשיר האינלהציה בדרך המומלצת.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר

אם נטלה מינון גבוהה יותר ממה שהיה צרייך, דבר עם הרופא בהקדם האפשרי. התופעות הבאות עלולות להתרחש:

- הלב שלך יפעם מהר יותר מהרגיל
- אתה תרגיש רעד
- פעילות יתר (היפראקטיביות).

תופעות אלה חולפות בדרך כלל תוך שעوت ספורות.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעליל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, קח אותה ברגע שאתה נאכ'r. אולם, אם זה הזמן למננה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אל תיטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחחשרי! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב

משמעותי אם הנך זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

אם **ניסיוח או הצפוזים חמירים** מיד לאחר נטילת תרופה זו, הפסיק **להשתמש בה מיד**, וספר **לרופא בהקדם האפשרי**.

כמו **בכל תרופה**, השימוש בונטולין תמייה לשאייפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול אף אחת מהן.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע עם הופיעת תרופה זו:

תגובה אלרגיות (אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10,000 אנשים**)

אם יש לך תגובה אלרגית, הפסיק לחתת ונטולין תמייה לשאייפה ופנה לרופא מיד. סימנים של תגובה אלרגית כוללים: התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או האגרון אשר עלולים לגרום لكשיי בלייה או קשיי נשימה, פריחה מגרדת, תחושת עילפון וסחרורות והתקמטנות.

פנה לרופא בהקדם האפשרי אם:

- אתה מרגיש **שלבר** פുם מהר יותר או חזק יותר מהרגיל (**דפיקות לב**). תופעה זו בדרך כלל אינה מזיקה, ולרוב חולפת לאחר שימוש בתרופה במשך זמן מה.
 - ייתכן שתargin יש שהדופק שלך לא סדי' או שהוא פുם פעימה נוספת.
 - **תופעות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים.**
- אם אחת מתופעות אלה מופיעה אצלך, פנה לרופא בהקדם האפשרי. אל **פסיק להשתמש בתרופה זו** אלא אם נאמר לך לעשות כן.

ספר לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות אשר עלולות גם הן להופיע במהלך השימוש בתרופה זו:

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- **תחושת רעד**
- **כאב ראש.**

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- גירוי בפה ובראשו.
- התכווצויות שריריים.

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- רמה נמוכה של אשלגן בدم
- זרימת דם מוגברת לגפיים (התרחבות פריפריאלית).

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- שינויים בדפוסי השינה ושינויים בהתנהגות, כמו חוסר מנוחה והתרגשות יתר.

תופעות הלואין הבאות עלולות גם להופיע אך שכיחותן אינה ידועה:

- כאב בבית החזה בגלל בעיות לב כמו תעוקת חזה (אנגינה). ספר לרופא, לאחות או לרוקח אם זה מתרחש. אלopsis להשתמש בתרופת זו אלא אם נאמר לך לעשות כן.
- מצב הקרי "חמצת לקטית" (Lactic acidosis) אשר עלול לגרום לכאבי בטן, נשימת יתר (היפרונטילציה), קוצר נשימה, כפות רגלים וידים קרות, דופק לא סדיר או חשש צמא.

אם אתה חושב שתרופה זו אינה פועלת מספיק טוב עבורה

אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת כראיל, פנה לרופא בהקדם האפשרי. ניתן כי בעית הנשימה שלך חמירה וייתכן שאתה צריך תרופה אחרת. אל טיפולמנה נוספת של ונטולין תmisה לשאייה אלא אם הרופא הורה לך על כן.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. יש לאחסן את הבקבוק בקרטון החיצוני כדי להגן מפני אור.
- אל תשאיר תמיisa במכשיר האינלהציה לאחר סיוםת את הטיפול.
- לשימוש עד חדש ימים מפתיחה הבקבוק לראשונה ולא יותר מתאריך התפוגה של התכשיר.
- לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, יש לרשום על גבי אריזת הקרטון את תאריך הפתיחה במקום המועד.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסך על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Benzalkonium chloride solution, sulfuric acid dilute and purified water.

 - כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ונטולין תמיisa לשאיפה מגיעה בבקבוק זכוכית בצע ענבר המכיל 10 מ"ל או 20 מ"ל.
התמיisa נטולת צבע עד צבע צהוב בהיר.
ייתכן שלא כל גדרי האריזות משוקרים.
 - בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בלז 25, פתח תקווה.
 - יצרן: גלקסו אופריאנס (אנגליה) בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
 - מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 021-31-21046
 - לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בפברואר 2024.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Ven RS PT v10A