

تيمو TM 5 ملغ، تيمو TM 20 ملغ، تيمو TM 100 ملغ، تيمو TM 250 ملغ

كبسولات

تحتوي كل كبسولة على:

تيموزولوميد 5 ملغ، 20 ملغ، 100 ملغ، 250 ملغ
Temozolomide 5 mg, 20 mg, 100 mg, 250 mg

المواد الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر- أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم، حتى ولو بلدك أن مرضهم مشابه.
- الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 3 سنوات، نظراً لعدم توفر معلومات بشأن الإستعمال لدى متعاليين دون عمر 3 سنوات. إن المعلومات المتوفرة بشأن الأطفال ما فوق عمر 3 سنوات هي محدودة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- يحتوي تيمو على المادة الفعالة تيموزولوميد. هذا الدواء مخصص لعلاج الأورام السرطانية من أنواع مختلفة من الأورام في الدماغ.
- ينتمي تيمو إلى مجموعة الأدوية المسماة الأدوية السامة للخلايا أو أدوية المعالجة الكيميائية.
- تحتوي تيمو مخصصة لعلاج:
- لدى المرضى الذين يعانون من الورم الدبقي الخبيث، مثل الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال أو ورم نجمي كشمي، الذي يظهر ثانية أو يتطور بعد علاج إعتيادي.
- كخط أول للمرضى الذين يعانون من الميلانوما الخبيثة المتقدمة.
- لدى المرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً بالورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال، بالمشاركة مع العلاج الإشعاعي وكعلاج منفرد فيما بعد.

الفصيلة العلاجية: مستحضر مضاد للأورام.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة تيموزولوميد أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة).
- كان لديك في الماضي رد فعل تحسسي لـ دكاربازين (دواء مضاد للسرطان يُسمى أحياناً DTIC)، علامات رد الفعل التحسسي تشمل شعور بالحكة، ضيق في التنفس أو صغير، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة.
- كان هناك إنخفاض شديد في بعض خلايا الدم (تثبيط نخاع العظم)، مثل تعداد خلايا الدم البيضاء وتعداد الصفائح الدموية لديك. خلايا الدم هذه مهمة لمكافحة التلوثات ومن أجل تحتر الدم بشكل سليم. سيقيم الطبيب بإجراء فحوصات دم للتأكد من أن لديك ما يكفي من خلايا الدم هذه قبل بدء العلاج.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- قبل العلاج ب تيمو، تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو مع الممرضة، لأنه يجب أن تخضع لمراقبة حثيئة من أجل مراقبة تطور حالة خطيرة لتلوث في الصدر يسمى التهاب الرئتين الناتج من المتكيسة الرئوية الجوجوية (PCP). إذا كنت متعالجاً يتم تشخيصه لأول مرة (الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال) فمن الممكن أن تتلقى تيمو لمدة 42 يوماً بالمشاركة مع العلاج الإشعاعي. في هذه الحالة، سيصف لك الطبيب أيضاً دواء يساعد في منع حدوث هذا النوع من التهاب الرئتين (PCP).
- إذا كنت قد عانيت في الماضي أو من الجائز أنك تعاني من التهاب الكبد من نوع B، وذلك لأن تيمو قد يؤدي إلى تجديد نشاط الفيروس المسبب لالتهاب الكبد من نوع B، والذي قد يشكل خطراً على الحياة في بعض الحالات. سيتم فحص المتعاليين بعناية من قبل طبيبهم لتحديد علامات هذا التلوث قبل بدء العلاج.
- إذا كان لديك إنخفاض في تعداد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية أو مشاكل في تحتر الدم قبل بدء العلاج أو التي تطورت خلال العلاج. قد يقرر طبيبك خفض المقدار الدوائي، التخل، إيقاف أو تغيير علاجك. من الجائز أن تحتاج أيضاً إلى علاجات أخرى. في بعض الحالات، من الجائز أن تكون هناك حاجة لإيقاف العلاج ب تيمو. سنجري لك فحوصات دم في أوقات متقاربة خلال العلاج لمراقبة الأعراض الجانبية ل تيمو على خلايا دمك.
- نظراً لأنه من الجائز أن تكون لديك خطورة طفيفة لحدوث تغييرات أخرى في خلايا دمك، بما في ذلك اللوكيميا.
- إذا كنت تعاني من الغثيان و/أو التقيؤ، وهي من الأعراض الجانبية الشائعة جداً ل تيمو (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية")، فمن الممكن أن يصف لك الطبيب دواءً (مضاد للتقيؤات) للمساعدة في منع التقيؤات.
- إذا كنت تتقيأ في أوقات متقاربة قبل أو خلال العلاج، إسأل الطبيب حول أفضل وقت لتناول تيمو حتى يتم السيطرة على التقيؤات. إذا كنت تتقيأ بعد تناول الجرعة الدوائية، فلا تتناول جرعة دوائية ثانية في نفس اليوم.
- إذا طُورت سخونة أو أعراض لتلوث، فتوجه للطبيب فوراً.
- إذا كنت بالغاً فوق عمر 70 سنة، حيث من الممكن تكون أكثر عرضة للإصابة بالتلوثات، الكدمات أو النزف.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى، من الجائز أن تكون هناك حاجة لملاءمة المقدار الدوائي من تيمو.
- عند إستعمال الدواء هناك خطورة لحدوث ضرر في الكبد، والذي

يشمل قصور في الكبد الذي قد يشكل خطراً على الحياة. لذلك، هناك حاجة لإجراء فحوصات وظائف الكبد قبل وخلال العلاج ب تيمو.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال دون عمر 3 سنوات، نظراً لأنه لم تتم دراسته. تيمو مخصص للعلاج لدى الأطفال من عمر 3 سنوات لأنواع مختلفة من الأورام الدماغية (مثل الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال أو ورم نجمي كشمي)، التي تظهر ثانية أو تستمر بالتطور بعد علاج إعتيادي. مع ذلك، فإن المعلومات المتوفرة بشأن الأطفال ما فوق عمر 3 سنوات هي محدودة.

الفحوص والمتابعة

خلال العلاج يجب عليك الخضوع لفحوص دم في أوقات متقاربة من أجل مراقبة حالة خلايا الدم لديك.

كذلك، سيتم إجراء فحص لوظائف الكبد لديك قبل وخلال العلاج، نظراً لوجود خطورة لحدوث ضرر في الكبد والذي قد يشكل خطراً على الحياة (أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخص إذا كنت تتناول: أدوية أخرى تُستعمل في علاج السرطان، أدوية أخرى متبيلة لنخاع العظم، أو حمض الفالبرويك.

إستعمال الدواء والطعام

يجب تناول الكبسولة/الكبسولات على معدة خاوية، على سبيل المثال: ساعة على الأقل قبل تناولك وجبة الفطور. يجب بلع الكبسولة/الكبسولات بأكملها مع كوب من الماء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً، تحققين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء، وذلك لأنه يُمنع إستعمال تيمو أثناء الحمل إلا إذا أوصاك الطبيب بفعل ذلك بشكل صريح. المتعاليات اللواتي بإمكانهن أن يحملن أثناء العلاج ب تيمو يتوجب عليهن إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 6 أشهر على الأقل بعد إنتهاء العلاج.

يجب عليك التوقف عن الإرضاع أثناء العلاج ب تيمو.

الخصوبة لدى الرجال

قد يسبب تيمو عقم غير قابل للعكس. يجب على الرجال الذين يتلقون العلاج ب تيمو إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل وعدم التسبب بحمل زوجاتهم لمدة 3 أشهر على الأقل بعد التوقف عن العلاج. يُنصح بالتوجه للإستشارة بشأن حفظ النطفاء قبل بدء العلاج.

السياقة وإستعمال الماكينات

تيمو قد يسبب لك الشعور بالإرهاق أو بالنعاس. في هذه الحالة، لا يجوز السياقة أو تشغيل أية معدات أو أية ماكينات أو ركوب الدراجات حتى ترى كيفية تأثير هذا الدواء عليك (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز اللايثامي (نوع من السكر). إذا تم إخبارك من قبل طبيبك أن لديك عدم تحمل لبعض السكريات، فتوجه لطبيبك قبل تناول الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومل صوديوم (23 ملغ) لكل كبسولة، ولذلك يعتبر "خال من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بأدواء. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

إن للأخطأ في كيفية تناول الدواء من قبلك من الممكن أن تكون عواقب صحية خطيرة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للإعطاء للرضع وللأطفال دون عمر 3 سنوات.

طبيبك سيقدر الجرعة الدوائية الدقيقة من تيمو التي يجب عليك تناولها، بناءً على حجم الجسم (الطول، الوزن)، وما إذا كنت قد تلقيت العلاج الكيميائي في الماضي أم لا. من الجائز أن يطلب منك تناول دواء إضافي قبل تناول تيمو أو بعده، من أجل منع حدوث الغثيان والتقيؤات وللسيطرة عليها.

طريقة تناول الدواء (بالنسبة لكافة المرضى):

يجب تناول الجرعة الدوائية من تيمو التي وُصفت لك مرة في اليوم على معدة خاوية، مثلاً ساعة على الأقل قبل وجبة الفطور. يُفضل تناول الجرعة الدوائية في نفس الساعة من كل يوم. يجب بلع الكبسولة بأكملها مع كوب من الماء.

السحق/الشرط/المضغ:

لا يجوز فتح، سحق أو مضغ الكبسولة.

ينتمي تيمو إلى مجموعة الأدوية المسماة بالأدوية السامة للخلايا أو أدوية المعالجة الكيميائية. إن فتح الكبسولات يؤدي لخطورة التعرض غير المقصود للدواء عن طريق الإستنشاق أو التماس مع الجلد أو مع الأنسجة المخاطية. لتقليل خطورة التعرض غير المقصود ل تيمو، لا يجوز فتح الكبسولات. إذا تضررت كبسولة، تجنب أن يلامس مسحوق الكبسولة الجلد والأنسجة المخاطية (العينين، الأنف). في حال التماس مع المسحوق، يجب غسل اليدين.

وفقاً للمقدار الدوائي الذي سيحدد لك، من الجائز أن يطلب منك بلع أكثر من كبسولة واحدة في نفس الوقت، ومن الجائز أن يطلب منك بلع كبسولات من عبارات مختلفة في نفس الوقت (الجرعات الدوائية - كمية المادة الفعالة في الكبسولة، بالمليغرامات). إن لون الخطوط والكتابة على الكبسولات يختلف بالنسبة للمقادير الدوائية المختلفة (أنظر التفاصيل في الجدول التالي).

العيار	لون الخطوط والكتابة
تيمو 5 ملغ	الكتابة "T 5mg" باللون الأخضر
تيمو 20 ملغ	الكتابة "T 20mg" باللون البرتقالي
تيمو 100 ملغ	الكتابة "T 100mg" باللون الوردي
تيمو 250 ملغ	الكتابة "T 250mg" باللون الأسود

يجب عليك التأكد من فهمك الكامل وتذكرك للنقاط التالية:

- عدد الكبسولات التي يجب عليك تناولها في كل "يوم جرعة دوائية".
- أطلب من طبيبك أو من الصيدلي كتابة ذلك لك (بما في ذلك لون الخوط).
- ما هي أيام الجرعة الدوائية خاصتك - أيام تناول الدواء.
- تحقق من الجرعة الدوائية مع طبيبك في كل مرة تبدأ فيها دورة علاج جديدة، نظراً لأنه من الممكن أن يكون مختلفاً عن دورة العلاج السابقة.
- في حالة التقيؤ بعد تناول الدواء، لا يجوز تناول جرعة دوائية إضافية في نفس اليوم.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ عدداً أكبر من كبسولات **تيمو** مما تم إخبارك به، فتوجه لطبيبك، الصيدلي، أو الممرضة حالاً. إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول الجرعة الدوائية المنسية في أقرب وقت ممكن خلال نفس اليوم. إذا مر يوم علاج كامل، إستوضح من طبيبك. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية، إلا إذا أوصاك الطبيب بفعل ذلك.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **تيمو** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوجه إلى الطبيب حالاً إذا كان لديك أي من العلامات التالية:

- رد فعل تحسسي (فرط الحساسية) شديد (شرى، صغير أو صعوبات تنفسية أخرى)
- نزف لا يمكن السيطرة عليه
- نوبات صرعية (تشنجات)
- سخونة
- شعورية
- صداع شديد لا يزول

إن العلاج بـ **تيمو** قد يؤدي إلى إنخفاض في بعض أنواع خلايا الدم. هذا الأمر قد يسبب لديك زيادة في الكدمات أو في الأنزفة، فقر الدم (نقص في خلايا الدم الحمراء)، سخونة وإنخفاض في مقاومة التلوثات. إن الإنخفاض في تعداد خلايا الدم يستمر عادة لفترة قصيرة. في بعض الحالات، قد يكون مطولاً وقد يؤدي إلى شكل خطير جداً من فقر الدم (فقر الدم اللاتنسجي). سيقيم طبيبك فحص دمك بانتظام لإكتشاف التغيرات، وسيقرر ما إذا كان يتطلب أي علاج. في بعض الحالات، يتم تقليل المقدار الدوائي من **تيمو** أو إيقاف العلاج.

أعراض جانبية إضافية تم الإبلاغ عنها مفصلة أدناه:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):

- فقدان الشهية، صعوبات في الكلام، صداع
- إسهال، إمساك، غثيان، تقيؤات
- طفح جلدي، تساقط الشعر
- إرهاق

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- تلوّثات، تلوّثات في الفم
- إنخفاض في تعداد خلايا الدم (إنخفاض العدلات، إنخفاض اللبغويات، إنخفاض الصفائح الدموية)
- رد فعل تحسسي
- ارتفاع في مستويات السكر في الدم
- ضرر في الذاكرة، قلق، إكتئاب، إرتباك، عدم القدرة على النوم أو البقاء بحالة من النوم
- ضرر في التنسيق والتوازن
- صعوبات في التركيز، تغيرات في الحالة الذهنية أو في اليقظة، نسيان
- دوام، إضطراب في الإحساس، شعور بالخو، إرتجاف، طعم شاذ
- فقدان جزئي للرؤية، رؤية غير سليمة، رؤية مزدوجة، ألم في العينين
- صمم، طنين في الأذنين، ألم في الأذنين
- خثرة دموية في الرئتين أو في الرجلين، إرتفاع ضغط الدم
- إلتهاب الرئتين، إلتهاب الجيوب الأنفية، إلتهاب القصبات الهوائية، ضيق في التنفس، سعال
- ألم في المعدة أو في البطن، حرقان/صعوبات في الهضم، صعوبات في البلع
- جفاف الجلد، حكة
- ضرر للعضلات، ضعف العضلات، ألم في العضلات
- ألم في المفاصل، ألم الظهر
- تبول متكرر، صعوبات في التحكم بالتبول
- سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، ألم، شعور عام غير جيد، برد أو إنفلونزا
- إحتباس السوائل، إنتفاخ الرجلين
- إرتفاع في إنزيمات الكبد
- تناقص الوزن، زيادة الوزن
- ضرر ناتج عن الأشعة

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- تلوّثات الدماغ (إلتهاب السحايا والدماغ الهرپسي، تلوّثات الدماغ الناجمة عن فيروس الهرپس) بما في ذلك حالات انتهت بالوفاة
- تلوّث في الجروح
- تلوّثات جديدة أو تمت إعادة تنشيطها (متكررة) من قبل فيروس المضخم للخلايا

- تلوّثات تمت إعادة تنشيطها (متكررة) من قبل الفيروس المسبب لإلتهاب الكبد من نوع B
- سرطان ثانوي بما في ذلك اللوكيميا
- إنتفاخ في تعداد خلايا الدم (قلة الكريات الشاملة، فقر الدم، قلة الكريات البيضاء)
- تقاطح حمراء من تحت الجلد
- داء السكري الكاذب (diabetes insipidus)، تشمل الأعراض إنتاج كميات كبيرة من البول والشعور بالعطش)، نسبة منخفض من اليوتاسيوم في الدم
- تقلبات في المزاج، هلوسات
- شلل جزئي، تغيرات في حساسية الشم
- تضمر السمع، تلوّث في الأذن الوسطى
- ضربات قلب (خفقان، عندما تشعر بضربات قلبك)، هبات حرارة
- إنتفاخ في البطن، صعوبات في السيطرة على نشاط الأمعاء، بواسير، جفاف الفم
- إلتهاب الكبد وتضمر الكبد (بما في ذلك قصور كبدي أدى للوفاة)، إضطراب في تدفق الصفراء (ركود صفراوي)، إرتفاع في البيليروبين
- حوصلات على الجسم أو في الفم، تقشر الجلد، تقشري طفح جلدي، إحمرار في الجلد مترافق مع ألم، طفح جلدي شديد مترافق مع إنتفاخ في الجلد (بما في ذلك في راحتي اليدين والرجلين)
- تزايد حساسية الجلد لأشعة الشمس، شرى، زيادة في التعرق، تغير في لون الجلد
- صعوبات في التبول
- نزف من المهبل، تهيج في المهبل، غياب الدورة الشهرية أو نزف شديد خلال الدورة الشهرية، ألم في الثديين، عجز جنسي
- إرتجاف، إنتفاخ الوجه، تغير في لون اللسان، عطش، مشاكل في الأسنان
- جفاف العينين

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداچيس بواسطة العنوان التالي: [Padagis.co.il](https://www.padagis.co.il)

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسشم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تتفادى إصابتهم بالتسشم. إن البلع بالخطأ قد يكون مميتاً بالنسبة للأطفال. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (date exp) الذي يظهر على ظهر العلبة والملصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية.
- بعد الفتح الأول بالإمكان الإستعمال لمدة 3 أسابيع، ولكن ليس بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Lactose anhydrous, Sodium starch glycolate (type A), Stearic acid, Tartaric acid, Silica colloidal anhydrous, Gelatin, Titanium dioxide (E 171).

تحتوي كل كبسولة من **تيمو 5** ملغ على: 87.30 ملغ لكتوز اللامائي تحتوي كل كبسولة من **تيمو 20** ملغ على: 72.30 ملغ لكتوز اللامائي تحتوي كل كبسولة من **تيمو 100** ملغ على: 83.60 ملغ لكتوز اللامائي تحتوي كل كبسولة من **تيمو 250** ملغ على: 209.00 ملغ لكتوز اللامائي

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

تيمو 5 ملغ: كبسولة من الجيلاتين بيضاء قائمة عليها خطين والكتابة "T 5mg" باللون الأخضر.
تيمو 20 ملغ: كبسولة من الجيلاتين بيضاء قائمة عليها خطين والكتابة "T 20mg" باللون البرتقالي.
تيمو 100 ملغ: كبسولة من الجيلاتين بيضاء قائمة عليها خطين والكتابة "T 100mg" باللون الورد.
تيمو 250 ملغ: كبسولة من الجيلاتين بيضاء قائمة عليها خطين والكتابة "T 250mg" باللون الأسود.

تحتوي الكبسولات على مسحوق بلون أبيض-بيج حتى وردي فاتح. الكبسولات معبأة في قنينة زجاجية تتضمن 5 أو 20 كبسولة. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العب. صاحب الإمتياز، المستورد وعنوانه: باداچيس إسرائيل وكالات م.ص، شارع راكيفيت 1، شوهام.

تم إعدادها في كانون الثاني 2024 بحسب تعليمات وزارة الصحة. أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تيمو 5 ملغ: 145.24.33256
تيمو 20 ملغ: 145.25.33257
تيمو 100 ملغ: 145.26.33258
تيمو 250 ملغ: 145.29.33261

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

22.1.2024