



עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תשכירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

CFC מנטולין משאף ללא

כל מנה מדוזה מכילה:

סאלבוטאמול (כסולפאט) 100 מ"ג/מנה
נטולין משאף מכל 200 מנדות מדוחות.

רשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 – "מידע נוספים".
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על
התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה
לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

נטולין משאף הוא מריחיב סمفוניות בעל פעילות קצרת טווח (6-4 שעות), מהירה (תוך 5 דקות) בחסימה הפיכה של דרכי הנשימה.

הוא מתאים במיוחד להקללה ולמניעה של תסמיני מחלת האסתמה.
יש לשמש בו להקללה על תסמינים כאשר הם מופיעים וכן על מנת למניעת הופעת
התסמינים באותו נסיבות המוכרות על ידי החולה ככאלו שימושו הרתקני אסתמה
(כגון לפניו פעילות גופנית או חשיפה בלתי נמנעת לארגן).
נטולין משאף מועיל במיוחד כתרופה להקללה על אסתמה קלה, ביןונית וחמורה, בתנאי
שהתלוות בו אינה מעכבת את התחלת הטיפול והשימוש השגרתי בקורטיקוסטרואידים
בשאיפה.

קבוצת רפואיות:
AGONIST SKLETTIBI לדרנורצפטור בטא-2.

- נטולין משאף מכיל תרופה הנקראת סאלבוטאמול. היא שייכת לקבוצת תרופות הנקראת
מרחיבי סمفוניות מהיריו פעולה.
- מרחיבי סمفוניות עוררים לדרכי האויר בריאות להישאר פתוחות, דבר המקל על כניסה
ויציאת אויר.
- הם עוררים להקל על לחץ בבית החזה, צפופים ושיעול.

נטולין משאף מכיל מרכיב הנקרא a 134 HFA. זה פחת מזיך לסביבה ממשאים ישים
יותר. ממשאים ישים יותר עשוי להיות טעם שונה מאשר לונטולין משאף. זה לא ישנה
את האופן שבו התרופה פועלת.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגish (אלרגי) לסאלבוטאמול סולפאת או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

יש להשתמש בוונטולין משאף לפי הצורך ולא באופן סדר.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בוונטולין משאף, ספר לרופא אם:

- האסתמה שלך פעילה (לדוגמה, יש לך תסמינים תכופים או התלקחות כמו קוצר נשימה שגורם לקושי בדיבור, באכילה או בשינה, שיעול, צפופים, לחץ בבית החזה או יכולת גופנית מוגבלת), عليك לספר על כך למינית לרופא אשר עשוי להתחיל או להעלות מינון של תרופה הנניתנת לשילטה באסתמה שלך כמו קורטיקוסטרואיד בשאיפה.
- יש לך לחץ דם גבוה.
- יש לך פעילות יתר של בלוטת התיריס.
- יש לך היסטוריה של בעיות לב כמו דופק לא סדרי, דופק מהיר או תעוקת חזה.
- אתה נוטל נגירות קסנתין (כמו אופילין) או סטרואידים לטיפול באסתמה.
- אתה נוטל משתנים, המשמשים לעיתים לטיפול בחץ דם גבוה או במחלת לב.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. יש לידע במיוחד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לדופק לא סדרי או מהיר (במיוחד מקבוצת חוסמי בטא כגון פרופרנולול).
- תרופות אחרות לאסתמה שלך.

שימוש בתרופה ומון

ניתן להשתמש בוונטולין משאף בכל שעות היום, עם או בלי אוכל.

הירין והנקה

אם אתה בהירין או מניקה, חשוב שיתכן שאתה בהירין או אם אתה מתכוון להרות, התיעיצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שוונטולין משאף ישפיע על יכולתך לנוהג או להשתמש בכליים או במכונות כלשהם.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. عليك לבדוק עם הרופא או הרוקח

אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המיןון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים ומתבגרים מגיל 12 ומעלה

- להקלת אסתמה - שאייפה אחת או שתי שאייפות.
- למניעת אסתמה - שתי שאייפות 15-10 דקות לפני פעילות גופנית או חסיפה לאלרגנים.
- לטיפול רגל - שתי שאייפות עד 4 פעמים ביום.
- המיןון המקורי הוא 8 שאייפות בפרק זמן של 24 שעות.

ילדים מתחת לגיל 12

- להקלת אסתמה - שאייפה אחת. ניתן להעלות את המיןון עד שתי שאייפות אם נדרש.
 - למניעת אסתמה - שאייפה אחת 15-10 דקות לפני פעילות גופנית או חסיפה לאלרגנים.
ניתן להעלות את המיןון עד שתי שאייפות אם נדרש.
 - לטיפול רגל - שתי שאייפות עד 4 פעמים ביום.
 - המיןון המקורי הוא 8 שאייפות בפרק זמן של 24 שעות.
- ייתכן שתמצא שמתאים (ספירים), עם או בלי מסכת פנים, מועיל אם אתה צריך לחת
ונטולן משאף לתינוק או ליד מתחת לגיל 5. פנה לרופא אם אתה חושב שתזדקק לאחד
מהם.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עקבות אחורי הוראות השימוש המופיעות בסוף העalon.

אם נטלה בטיעות מיןון גבוה יותר

אם נטלה מיןון גבוה יותר ממה הייתה צריכה, שוחח עם הרופא בהקדם האפשרי.
התופעות הבאות עלולות להתרחש:

- הלב שלך יפעם מהר יותר מהרגיל
- אתה תרגיש רעד
- פעילות יתר (היפראקטיביות)

תופעות אלה חולפות בדרך כלל בתוך שעوت ספורות.

אם שאפת מנת יתר או אם בטיעות שאףILD מין התירועה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של
בית החולים והבא אריזת התירועה איתך.

אם שכחת ליטול את התירועה

אם שכחת ליטול התירועהزو בזמן המועד, קח אותה ברגע שאתה נזכר. אולם, אם הגיע הזמן
למנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אל תיטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התירועה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתירועה ללא התיעיצות עם
הרופא.

אין ליטול תירועות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שהנרכ נוטל תירועה. הרכיב
משקפיים אם הנרכ זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתירועה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

אם נשימתך או הצפופים מחמירים מיד לאחר נטילת תרופה זו, הפסיק להשתמש בה מיד, וספר לרופא בהקדם האפשרי.

כמו בכל תרופה, השימוש בוונטולין משאף עלול לגרום לתופעת לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מכך כלל.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע עם תרופה זו:

תగובות אלרגיות (אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים)

אם יש לך תגoba אלרגית, הפסיק להשתמש בוונטולין משאף ונפה לרופא מיד. סימנים של TAGOVA ALERGIYAH KOLLIMIM: התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון אשר עלולה לגרום לך כאב בלביה או קשי נשימה, פיריחה מגדדת, תחושת עילפון וסחרורת והתמותות.

פנה לרופא בהקדם האפשרי אם:

- אתה מרגיש שלבך פועם מהר יותר או חזק יותר מהרגיל (דפוקות לב). תופעה זו בדרך כלל אינה מזיקה, ולרוב חולפת לאחר שהשתמשה בתרופה במשך זמן מה.
- ייתכן שתרגיש שהדפק שלך לא סדיר או שהוא פועם פעימה נוספת.
- תופעות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים.

אם אחת מתופעות אלה מופיעה אצלך, פנה לרופא בהקדם האפשרי. אל תפסיק להשתמש בתרופה זו אלא אם נאמר לך לעשות כן.

ספר לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות, אשר עלולות גם הן להופיע במהלך השימוש בתרופה זו:

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- תחושת רעד.
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- גירוי בפה ובגרון
- התכווצויות שריריים.

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- רמה נמוכה של אשלגן בדם
- זרימת דם מוגברת לגפיים (התרחבות פריפריאלית).

תופעות לוואי נדירות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:

- שינויים בדפוסי השינה ושינויים בהתנהגות, כמו חוסר מנוחה והתרגשות יתר.

תופעות הלוואי הבאות עלולות גם להופיע אף שכייחודה אינה ידועה:

- כאב בביית החזה בגל בעיות לב כמו תעוקת חזיה (אנגינה). ספר לרופא או לרוקח אם זה מתרחש. אל תפסיק להשתמש בתרופה זו אלא אם נאמר לך לעשות זאת.

אם אתה חושב שתרופה זו אינה פועלת מספיק טוב עבורך
אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת כראיל, פנה לרופא בהקדם האפשרי. ייתכן כי
בעיית הנשימה שלך חמירה ויתכן שאתה צריך תרופה אחרת. אל טיפול מנומן נוספת
של ונטולין משאך אלא אם הרופא הורה לך על כך.

אם הופיעה תופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת
לווואי שלא צוינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיזיון על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיזיון על
תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיזיון על תופעות לוואי, או ע"י כניסה
לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווה
ראיותם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה
מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-30°C. הגן מכפוף ומחשיפה ישירה לאור שימוש.
- אם המשאף מתקרר מאוד, הוצא את מכל המתקנת מתוך מעטפת הפלסטייך וחם אותו
בידך למשך מספר דקות לפני השימוש. אל תשתמש באמצעי אחר כדי לחם אותו.
- מכל המתקנת הינו מכל לחץ. אין לחשוף אותו לטמפרטורות הגבוהות מ-50°C. אין לנקב,
לשבר או לשורף את המשאף גם אם הוא ריק.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות
שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם: HFA 134a.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה:
ונטולין משאף כולל מכל אלומיניום סגור בשסתום מדידה, מעטפה פלסטייך ומכסה פיה.
כל מכל מכיל 200 מנות מדוחות של סאלבוטאמול (כסולפאט) 100 מיקרוגרם.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל 25, פתח תקווה.

- יצן: גלקסו וולקאם S.A., בורגוס, ספרד.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 013-29560-25-113.
- לשם הפשטה ולהקלת הקירה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש:

- ונטולין משאף מייצר رسס עדין אותו אתה שואף דרך הפה לריאות. הרופא, האחות או הרוקח יראו לך כיצד להשתמש בשאף. אם איןך בטוח שאל את הרופא, האחות או הרוקח.
- כל מכל של משאף מספק 200 מנות לשאייה.

אל תשתמש בשאף שלך לעיתים קרובות יותר ממה שהנזהה אותה הרופא. ספר לרופא בהקדם האפשרי אם נראה לך שהתרופה אינה פועלת עלייך כרגע (לדוגמה אם אתה זוקק למינון גבוה יותר של התרופה כדי להקל על בעיות הנשימה שלך או שהשימוש בשאף שלך לא יוצר הקללה הנמשכת לפחות 3 שעות), כיון שיתכן כי בעית הנשימה שלך מחמירה ואולי תצטרכך תרופה אחרת.

אם אתה משתמש בוונטולין משאף יותר מפעם אחת בשבוע לטיפול בתסמיני האסתמה שלך, לא כולל שימוש מניעתי לפני פעילות גופנית, זה מצביע על אסתמה שאינה נשלטת היטב והה עלול להעלות את הסיכון להתקפות חמורות של אסתמה (החמורה של האסתמה) שיתכן שהיאיה להן סיבוכים חמוריים שכוני חיים או אפילו קטלניים. עלייך לפנות לרופא בהקדם האפשרי כדי לבחון את הטיפול שלך באסתמה.


אם אתה משתמש בתרופה אנטידלקתית לריאות באופן יומי-יומי, לדוגמה "קורטיקוסטרואיד לשאייה", חשוב להמשיך להשתמש בה באופן סדיר, אפילו אם אתה מרגיש יותר טוב.

יתכן שהרופא אמר לך להשתמש במינון גבוה מהמקובל לטיפול חירום אם הנשימה או הצפיפות שלך מחמירים מאוד. חשוב שתיכזם להוראות הרופא לגבי כמה שאיופות לקחת ובאיזה תדירות להשתמש בשאף.

בדיקות המשאף

1. בשימוש בשאף בפעם הראשונה, בדוק שהוא עובד. הסר את מכסה הפיה על ידי לחיצה עדינה בצדדי המכסה עם האגודל והאצבע שלך ומשיכטו החוצה.

2. כדי לוודא שהשאף עובד, נער אותו היטב, כוון את הפיה הרחק ממך ולחץ על המכל לשחרור שתי לחיצות לאוויר. אם לא השתמש בשאף במשך 5



ימים או יותר, נער אותו היטב ושרר
שתי לחיצות של התרופה לאוור.

השימוש במשאף

חשוב להתחיל לנשום לאט ככל האפשר מיד לפני השימוש במשאף.

1. עמוד או שב זקור בעת השימוש במשאף.

2. הסר את מכסה הפיה (כפי שנראה בתמונה הראשונה). בדוק בתוך ומוחוץ לפיה כדי לוודא שהיא נקייה וחופשית מעצמים זרים.

3. נער את המשאף 4 או 5 פעמים כדי להבטיח שכל העצמים הזרים המשוחררים הוסרו ושתוכנות המשאף התערבבה בצורה שווה.



4. החזק את המשאף בצורה אנכית כשהאגודל שלך בסיס, מתחת לפיה. נשוף החוצה כמידת יכולתך. אל תשאף פנימה עדין.



5. מקם את הפיה בפה בין השיניים. סגור את שפתיים מסביב לפיה. אל תנשוך.



6. שאף דרך הפה. מיד לאחר שהתחללה לשאוף פנימה, לחץ כלפי מטה על החלק העליון של המכל לשחרור מנה מהתרופה. עשה זאת תוך כדי שאיפה عمוקה ויציבה פנימה.



7. החזק את נשימתך, הוציא את המשאף מהפה ואת האצבע מחלקו העליון של המכל. המשך להחזיק את נשימתך לכמה שניות, או ככל יכולתך.



8. אם הרופא אמר לך ללקחת שתי שאיפות, חכה כחצי דקה לפני שתיקח שאיפה נוספת וחזור על שלבים 3-7.

9. יש להחזיר תמיד את מכסה הפה למקוםו מיד לאחר השימוש כדי למנוע כניסה אבק. החזר את המכסה למקוםו על ידי לחיצה חזקה עד להישמע הקליק.

התאמן לפני מראה בפעמים הראשונות. אם אתה רואה 'רסס' יוצא מחלקו העליון של המשאף או מצידי הפה אתה צריך להתחילה שוב.

ייתכן שילדים קטנים יזדקקו לעזרת הורייהם בהפעלת המשאף. עודד את הילד לנשוח החוצה והפעיל את המשאף מיד לאחר שהילד התחיל התחליל תרגלו את השיטה יחד. ייתכן שתמצא שמתאים (ספירים), עם או בלי מסכת פנים, מועיל אם אתה צריך לתת ונטולין משאף לתינוק או לילד מתחת לגיל 5. פנה לרופא אם אתה חושב שתזדקק לאחד מהם.

ילדים בוגרים או אנשים עם חולשה בידיהם יכולים למצוא שקל יותר להחזיק את המשאף בשתי הידיים. שים את שתי האצבעות על חלקו העליון של המכל ואת שני האגודלים מתחת לפיה. אם זה לא עוזר, הרופא, הרוקח או האחות יכולים ליעץ לך.

ניקוי המשאף

בכדי למנוע מהמשאף להיחסם, חשוב לנוקות אותו לפחות פעם אחת בשבוע.
כדי לנוקות את המשאף:

- הסר את מכל המתקת מתוך מעתפת הפלסטייק של המשאף והסר את מכסה הפה.
- שטוף ביסודות את מעתפת הפלסטייק תחת זרם מים חמים.
- ייבש את מעתפת הפלסטייק ביסודות מבנים וUMBRO.
- החזר את מכל המתקת לתוך מעתפת הפלסטייק ושים את מכסה הפה.
- אל תשים את מכל המתקת בתוך המים.

נערך בפברואר 2024.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכייניות של קבוצת החברות של GSK.

© 2024 קבוצת החברות של GSK או הזכיין שלה.

Ven Inh PT v8A