

עלון לצרכן לפי התקנת הרחוקים (תכשירים) התשע"ו – 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

אופולקסצין טבע 200 מ"ג

טבליות

הרכב:
לכ טבליה מכילה:

אופולקסצין 200 מ"ג

Ofloxacin 200 mg

לידע על מרכיבי בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון על סופו בטורם הנשמט בתרופה.
עלן זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בזיהומים בקטריאליים הגורמים על ידי חיידקים הגרישים לאופולקסצין:

זיהומים במערכת הנשימה, דלקת ריאות, זיהומים באוזן, באף או בגרון, זיהומים בכליות, בדרכי השתן ובמערכת המין (כולל מחלת מין גונוריאה), זיהומים במערכת העיכול כולל דלקת מעיים חיידקית, זיהומים ברקמות רכות ובעור, זיהומים בעצמות ובפרקים.

קבוצה תרפויטית:

אנטיביוטיקה השייכת למשפחת הפלואורוקווינולונים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים. אם סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה כלשהי, היוועץ ברופא לפני נטילת אופולקסצין טבע.
- סבלת בעבר מדלקת גידים (טנדיניטיס) לאחר נטילת אנטיביוטיקות ממשפחת הפלואורוקווינולונים.
- אתה סובל מאפילפסיא או סבלת בעבר מפרכוס או מעויתות.
- אתה סובל ממחסור באזנים גלוקוז-6-פוספט-דהידרוגנאז (מחלה תורשתית המשפיעה על תאי הדם האדומים). בטיפול באופולקסצין טבע תאי הדם האדומים עלולים להתפרק ולגרום לאנמיה או לאצבת.
- את בהריון או מיניקה.
- אתה מתחת לגיל 18 שנים או אם אתה מעל גיל 18 שנים, אך חושב שאתה עדיין בשלבי הגדילה.
- אתה סובל מבעיה תורשתית נדירה של אי סבילות לגלקטוז, מחסור באזנים לאפ-לקטאז או תת-פוספז, של גלוקוז-גלקטוז. אופולקסצין טבע אינה מאמימה לאנשים שיש להם מחלות תורשתיות העוללות לגרום לבעיות עם נטילת סוכרים אלו.
- אתה סובל מזיהום בחיידק סטפילוקוקוס זהוב העמיד לאנטיביוטיקה מתיצ'ילין (MRSA).
- אתה סובל מהפרעות ראייה.

אזהרה מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה

בעיות לב

יש לנקוט באמצעי זהירות בשימוש בתרופה זו אם נולדת עם או אם יש לך במשפחה היסטוריה של קטע QT מוארך (הנראה בבדיקת א.ק.ג., רישום הפעילות החשמלית של הלב), יש לך חוסר איוון המלחים בדם (במיוחד רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם), יש לך קצב לב איטי מאוד (הנקרא ברדיקורדיה), יש יך לב חלש (אי ספיקת לב), היה לך בעבר התקף לב (אוטם שריר הלב), את אישה או אתה קשיש או אתה לוקח תרופות אחרות הגורמות לשינויים לא קטנים בבדיקת א.ק.ג. (ראה סעיף 2 - "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות").

לפני טיטול באופולקסצין טבע 200 מ"ג, ספר לרופא אם:

- אתה סובל או סבלת בעבר ממחלה נפשית.
- אתה סובל מבעיות כבד או כליות. ודא שסיפרת לרופא על כל בעיית כבד או כליות לפני התחלת השימוש באופולקסצין טבע, מאחר שייטכן שתידרש הפחתת המינון.
- אתה סובל ממחלה של מערכת העצבים הנקראת חולשת שרירים חמורה (מיאסנתיה גרביסי), מחלה בה השרירים חלשים ומתעייפים בקלות.
- אתה קשיש או נרשמו לך קורטיקוסטרואידים (ממששים לטיפול באסתמה ובמחלות ריאתי כרוניות אחרות), כיוון שהם עלולים להעלות את הסיכון לנפיקות ולכאב הגידים.
- אתה סובל מסוכרת.
- אתה אתה נוטל תרופה בשם פנבופן או תרופות אחרות ממשפחת NSAIDs, אנטגוניסטים של ויטמין K.
- אתה נוטל תאופילין.
- אובחנה אצלך התרחבות או "בליטה" של כלי דם גדול (מפרצת באבי העורקים או מפרצת בכלי דם פריפרי גדול).
- סבלת בעבר מאירוע ביותר אבי העורקים (קרע דופן אבי העורקים).
- אובחנת עם דליפת סמתם הלב (אי ספיקת מסתם הלב).
- יש לך היסטוריה משפחתית של מפרצת באבי העורקים, ביותר אבי העורקים, מחלת מסתמי לב מולדת, או טרייה או גורמי סיכון אחרים (למשל, הפרעה ברקמת החיבור כגון תסמונת בילרו, תסמונת אלרס-דולוס, תסמונת טרנר, תסמונת סייגורן [מחלה אוטואימונית דלקתית], או הפרעות בכלי הדם כגון דלקת עורקים על שם טקאיאסן, דלקת עורקים של הרקה, מחלת בכעט', לחץ דם גבוה, או ידוע על טרשת עורקים ודלקת מפרקים שגרונית [מחלת מפרקים] או דלקת פנים הלב [דלקת בלב]).

לפני נטילת התרופה

אין לקחת תרופות אנטיביוטיות ממשפחת פלואוקוונולונים/קווינולונים, כולל אופולקסצין טבע, אם סבלת בעבר מתופעות לוואי חמורות במהלך השימוש בקווינולונים או פלואוקוונולונים. במקרה זה יש לייעד את הרופא בהקדם האפשרי.

- אם אתה חש כאב פתאומי חמור בטנן, בחזה או בגב, שעלול להיות סימן למפרצת או בתירה של אבי העורקים, גש מיידית לחדר המיון. הסיכון עלה אם אתה מטופל בקורטיקוסטרואידים סיסטמיים.
- אם אתה מתחיל לחוות התקפים מהירים של קוצר נשימה, במיוחד בשכיבה מלאה, או מבחין בפניחות בקרסוליים, בכפות הרגליים ובבטן או בהפיעה חדשה של פלפטיציות לב (תחושה של דפיקות לב מהירות או לא סדירות), יש לייעד את הרופא מיידית.

במהלך הטיפול באופולקסצין טבע

- אפה עלול לחוות תגובה אלרגית פתאומית חמורה (תגובה אנפילקטית/אלם). אפילו לאחר נטילת המנה הראשונה קיים סיכוי שאתה עלול לחוות תגובה אלרגית פתאומית חמורה עם התסמינים הבאים: לחץ בחזה, תחושת סחרחורת, בחילה או עילפון, או הרגשת סחרחורת בעמידה. אם זה קורה הפסק נטילת אופולקסצין טבע וצור קשר עם הרופא מיידית.
- תופעות לוואי: מחורות ממוכנות, משביתות, מעלולות להיות בלתי הפיכות:** תרופת אנטיביוטיקאלית ממשפחת פלואורוקווינולונים/קווינולונים, כולל אופולקסצין טבע, קשורות לתופעות לוואי נדירות, אך חמורות, כאשר חלקן נמשכות לרוקח זמן (חודשים או שנים), משביתות או בלתי הפיכות פוטנציאלית. תופעות לוואי אלו כוללות כאב בגיד, בשריר ובמפרק של הגפיים העליונות והתחתונות, קושי בהליכה, תחושות חריגות כגון תחושת "דקירות ועקוצים", תחושת רציץ, דגדגו, חוסר תחושה או תחושת שריפה (פרסת'זה), הפרעות תחושתיות הכוללות פגיעה בראייה, בחוש הטעם, הריח והשמיעה, השפעות ברביאות הנפש העלולות לכלול, אך לא בהכרח מוגבלות לחדרה, התקפי חרדה, בלבול, או דיכאון, פגיעה בזיכרון, עייפות חמורה ובעיות שינה חמורות. אין תרופות שנמצאו כיעילות לטיפול בתסמינים של תופעות לוואי ממושכות או משביתות השפעות נטילת פלואורוקווינולונים.
- אם אתה חש אחת מתופעות לוואי אלו לאחר נטילת אופולקסצין טבע, אל תיטול מנות נוספות וצור קשר עם הרופא מיידית. אתה הרופא תחליטו אם להמשיך בטיפול, תוך שיקול של אפשרויות חלופיות.
- במהלך הנטילה של אופולקסצין טבע, כולל הנטילה הראשונה, אתה עלול לחוות תגובות פסיכיאטריות. אם אתה סובל מדיכאון או פסיכודה, התסמינים שלך עלולים להחמיר במהלך הטיפול באופולקסצין טבע. במקרים נדירים, השינויים והפסיכדה עלולים להתפתח למחשבות אובדניות או לנסיגות התאבדות. אם זה קורה הפסק נטילת אופולקסצין טבע וצור קשר עם הרופא מיידית. עלול לא להבחין בשינויים מסוימים במצב הרוח ובהתנהגות שלך, לכן חשוב מאוד לספר לחבריים ולמשפחה שאתה נוטל אופולקסצין טבע, שישיתנו תופעות לוואי פסיכיאטריות נדירות. אנשים אחרים יכולים להבחין בשינויים ולעזור לך לזהות מהי את התסמינים שעליהם עליך לספר לרופא.
- אתה עלול לחוות תסמינים של בעיות כבד, כגון אובדן תיארוך, הצהבת העור ולזון העיניים, שתן כהה, גירוי או גרישות בבטן. הפסק נטילת אופולקסצין טבע מיידית.
- שלוש עלול להתפתח במהלך הטיפול באנטיביוטיקות, כולל אופולקסצין טבע, מספר שבועות לאחר ששתיים של הטיפול בהם. השלשול מחמיר או תמנדי, או אם אתה מבחין שהוצאה מכילה דם או ריר, ספר לרופא מיידית. הטיפול באופולקסצין טבע חייב להיפסק מיידית, כיוון שהדבר עלול להיות מסכן חיים.

- כאב ונפיחות במפרקים ודלקת או קרע של גיד עלולים לקרות לעתים רחוקות. אתה סיכון גבוה יותר אם אתה קשיש (מעל גיל 60 שנה), עברת השתלת איברים, יש לך בעיות בכליה או אתה מטופל בקורטיקוסטרואידים. דלקת קרום'ע של גידים עלולים לקרות במהלך 48 השעות הראשונות מתחילת הטיפול ואפילו לאחר מספר חודשים מהפסקת הטיפול באופולקסצין טבע. עם הופעת הסימן הראשון של הכאב או דלקת גיד (לדומה בקרסול, בשרוש כף הדי, בכתף או בברך), הפסק נטילת אופולקסצין טבע, צור קשר עם הרופא ותן מנוחה לאזור הכואב. הימנע מפעילות פיזית לא הכרחית, מאחר שהיא עלולה להגביר את הסיכון לקרע של גיד.

- לעיתים רחוקות אתה עלול לחוות תסמינים של פגיעה עצבית (ניורופתיה) כגון כאב, תחושת שריפה, עקצוץ, חוסר תחושה ו/או חולשה במויחד כפפות הרגליים ורגליים או כפות הידיים וזרועות. אם זה קורה, הפסק נטילת אופולקסצין טבע וידע את הרופא מיידית על מנת למנוע את האפשרות פוטנציאלית של התפתחות מצב רפואי בלתי הפיך.
- ספר לרופא אם ידוע שלך או לבן שמפחנך ישנו מחסור באזנים גלוקוז-6-פוספט-דהידרוגנאז (G6PD), כיוון שאתה עלול לחוות סיכון לאנמיה בשימוש באופולקסצין.
- אל תשתוף את עצורך לתקופות ממושכות של אור שמש חזק במהלך נטילת הטבליות. השתמש בקרם הגנה אם אינך יכול להימנע מאור שמש חזק.
- אל תשתמש במנורה לטיפול באור (lamp-UVB) או סולריום.
- אתה עלול להיות רגיש יותר לזיהום בחיידקים אחרים.
- ידע את הרופא שאתה נוטל אופולקסצין טבע, אם אתה אמר לעבור בדקיות רפואיות כלשהן, מאחר שהתרופה עלולה להשפיע על התוצאות.
- אתה עלול לחוות בעיות בתגובה עורית כגון תסמונת טיטנס-ג'ונסון, הפרעה נדירה וחמורה של העור והקרום הרירי, או נמק רעילי של שכבת העור העליונה, מצב בו ישנה היפרדות של שכבה זו משכבות העור התחתונות.

אנטיביוטיקות ממשפחת קווינולונים עלולות לגרום לעלייה ברמת הסוכר בדם מעל לרמות התקינות (היפרגליקמיה), או להורדת רמות הסוכר בדם תחת רמות התקינות. במקרים חמורים המצב עלול להוביל לאיבוד הכרה (תסמנת היפוגליקמיה) (ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי"). הדבר חשוב לאנשים עם סוכרת. אם אתה סובל מסוכרת, רמת הסוכר בדם חייבת להיות מנוטרת בקפדנות.

ילדים ומתבגרים

אופולקסצין טבע אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים הנמצאים בשלבי גדילה.

בדיקות מעקב

ייתכן שהרופא ירצה שתעשה בדיקות דם לצורך מעקב, אם אתה נוטל אופולקסצין טבע יותר משבועיים.

אינטראקציות והתגובות בין-תרופתיות

- אם אתה לוקח או לוקחת האחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות לרא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:
 - נגדי קרישה (טבליות המונעות קרישת דם כגון וארפרין), כיוון שמשך הדיומים עלול להיות ארוך יותר.
 - רוג'ד' חומצה, סוכראלאפט, דיאדמוץ, תכשירי אלומיניום, ברזל, מגנזיום או אבץ (ראו סעיף 3 - "כיצד השתמש בתרופה").
 - תרופות לשליטה ברמות הסוכר בדם (כגון גליבנקלאמיד), כיוון שריכוזי תרופות אלו בדם עלולים לעלות ותן יהיו בעלות השפעה גדולה יותר.
 - תאופילין או תרופות נגודות דלקת ששן אטי סטרואידים (NSAIDs) כגון איבופרופן, דיקלופנאז או פנבופן, כיוון שאנשים מסוימים סובלים מפרכוסים כאשר הם נוטלים תרופות אלו עם אופולקסצין.
 - תרופות העוללות להשפיע על תפקוד הכליות (כגון סימטידון, פורוסמיד, פרובנצייד או מתורטקסאט), כיוון שתרופות אלו עלולות לעיתים להעלות את רמות האופולקסצין בדם.
- עליו לייעד את הרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות עלולות לישנות את קצב הלב: תרופות השייכות לקבוצת נוגדי חלב (כגון כנידון, הדרוכינידן, דיזופימדיד, אמיואדורון, סוטלול, דופטיליד, איבוטילייד, פרוקאיאנימדיד, נוגדי דיכאון טריציקליים כגון אמרטיפטיילן, קלומיפראמין, אנטיביוטיקות מסוימות (השייכות לקבוצת האמולידים כגון אריתרומיצין או אזיתרומיצין), תרופות אנטי-פסיכיות מסוימות (כגון אולנפין, קוואטאפיין).

הריון, הנקה ופוריות

אין להשתמש באופולקסצין טבע אם את בהריון או מיניקה. קיים מידע מוגבל בניו השימוש באופולקסצין בנשים בהריון.

ידוע כי אופולקסצין מופרש בכמות קטנה בחלב האם.

הגיהה ושימוש במכונות

אופולקסצין טבע עלולה לגרום לך להרגיש ישנוני, מסוחרר או להשפיע על ראייתך, דברים העלולים להשפיע על יכולתך להתרכז. אם אתה מושפע, אין לנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

על המטופלים הסובלים מאי סבילות ל**לקטוז** לשים לב שטבליות אופולקסצין טבע מכילות כמות קטנה של לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו.

תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלוך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא ברבד.

אין ליטול את התכשיר למעלה מ-8 שבועות ברציפות.

לחולי כבד וחולים בעלי תפקוד כליתי לקוי יתאים הרופא את המינון בהתאם למצבם.

אין לעבור על המנה המומלצת.

נטילת התרופה

יש לבלוע הטבליות בשלמותן עם כוס מים מלאה.

אין ללעוס או לכתוש את הטבליות.

ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה לשתי מנות שוות.

נטילת אופולקסצין טבע בשילוב עם נוגדי חומצה, סוכראלאפט, תכשירי אלומיניום, ברזל, מגניזיום או אבץ:

יש לתכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת אופולקסצין טבע לבין נטילת כל אחת מהתרופות הנ"ל, אחרת אופולקסצין טבע עלולה לא לעבוד כראוי.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יותר או נטלת בטעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים. מינון יתר עלול לגרום לסחרחורת, בלבול, עויתות, איבוד הכרה, הארכת תיקט QT, תחושת נוכחות של עצם כאשר העצם אינו קיים, נענוע בלתי רצוני של הגוף והגפיים, בחילה ובעיות חמורות בקיבה.

אנא הבא לבית חולים או לרופא את העלון, הטבליות שנשארו ואריזת התכשיר כדי שניתן יהיה לדעת אלו טבליות נצרכו.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול טבליה, יש ליטול אותה מיד כשזכרכת, אלא אם כן זה בסמיכות לזמן הנטילה של הטבליה הבאה. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

יש להמתיז טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. אם לא תעשה זאת, התסמינים עלולים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושרך לדוק להותיות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקיימים אם הניך קצב למה.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באופולקסצין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא הסכול מאף אחת מהן.

מפועות תופעות הלוואי הבאות, הפסק את השימוש באופולקסצין טבע ופנה מיד לרופא או לבית החולים:

תגובה אלרגית, לעיתים אף לאחר נטילת המנה הראשונה, אשר עלולה לכלול נפיחות בשפתים, הפנים או הצוואר ולגרום לקשישי נשימה חמורים, פריחה עורית או סרפדת, קצב לב מהיר, לחץ דם נמוך, חום, צריבה בעיניים, גירוי בגרון, שיעול, צפצפונים, הלם או בעיות בדם.
בעיות בעור שמקורן בתגובה אלרגית או זיהום (drug eruption), הצטברות נוזלים הנראית לעין בתוך או מתחת לעור (פריחה שלפוחינית), פריחה עורית כתוצאה מאור השמש (תגובה פוטוסנסיטיבית). פריחה עורית דלקתית (אריתמה מולטיפורמה).

- דלקת והתקייבות הפה, העיניים, המעי ואיברי המין. אלו עלולים להיות עקב תסמונת סטיבנס-ג'ונסון או טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס שהן מחלות חמורות. אי נוחות בגיד כולל דלקת או קרע, במיוחד אם אתה קשיש או גם נוטל קורטיקוסטרואידים, כגון פרדניזולון.
- עויתות, אי שקט, סינוי לילה, חרדה, דיכאון, הזיות, הרגשת רצון לפגוע בעצמך או הפרעות נפש אחרות, בלבול, צלצולים באוזניים, חוסר יציבות, רעד, הפרעות תחושה, חוסר תחושה, תחושת "דקירות ועקוצים", ראייה מטושטשת, אראייה כפולה או ראיית צבעים משונים, בעיות עם או אובדן שמיעה, חוש הטעם והריח. שלשול המכיל דם.
- דלקת כבד שעלולה להיות חמורה. אובדן תיאבון, הצהבת העור והעיניים, שתן צבע כהה, גירוי או גרישות בבטן. כל אלו עלולים להיות סימנים של בעיות כבד העלולים לכלול אי-ספיקת כבד קטלנית.

תופעות הלוואי הבאות דוחו בשכיחותי היחסית כמתואר מטה:

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-11 משתמשים מתוך 1,000:

- זיהומים פטריטיים, עמידות לפתוגנים.
- כאב ראש, סחרחורת, הפרעות שינה ואי-שקט.
- גירוי בעין, תחושת סחרור (טריגו), שיעול, דלקת באף.
- בחילה או הקאה, שלשול, כאב בטן.
- פריחה בעור, גרד.

תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב-10-11 משתמשים מתוך 10,000:

- מקרים נדירים של תופעות לוואי ממושכת (חודשים או שנים) או קבועות קשורות לנטילת אנטיביוטיקות ממשפחת קווינולונים או פלואורוקווינולונים. תופעות לוואי אלו עלולות לכלול דלקת בגיד, קרע של גיד, כאב במפרק, כאב בגפיים, קושי בהליכה, תחושות חריגות כגון תחושת "דקירות ועקוצים", עייפות, עקצוץ, דגדגו, תחושת שריפה, חוסר תחושה או כאב (ניורופתיה), עייפות, הפרעות שינה, פגיעה בזיכרון, השפעות על בריאות הנפש העלולות לכלול, אך לא בהכרח מוגבלות לחדרה, התקפי חרדה, בלבול, או דיכאון. כמו גם פגיעה בשמיעה, בראייה ובחוש הטעם והריח. אין תרופות שנמצאו כיעילות לטיפול בתסמינים של תופעות לוואי מתמשכות או משביתות הקשורות לנטילת הפלואורוקווינולונים.

- אובדן תיאבון.
- קצב לב מהיר יותר (טכיקרדיה).
- לחץ דם נמוך.
- קשיי נשימה או צפצפונים, קוצר נשימה.
- דלקת בעל העלולה לגרום לדימום.
- ליקוי בתפקוד הכבד עם תוצאות בדיקת דם לא תקינות.
- סרפדת (חרלת).
- הפרעות בווסת (כגון גלי חום), הזעת יתר, פריחה מוגלתית.
- רמות קואבטציה גבוהות בדם.
- דליריום (מצב חד של בלבול).

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) - תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:

- אנמיה (ירידה בכמות תאי הדם האדומים הגורמת לעור חיור או צהוב, לעייפות או לחולשה לא רגילות).
- הפרעות זכר אחרות כאשר מספר סוגי תאים שונים בדם עלול לרדת. התסמינים יכולים לכלול חום, צמרמורת, כאב גרון, כיבים בפה ובגרון, דימום לא רגיל או חבורות בלתי מוסברות.
- חלומות לא רגילים או מחלות נפשיות.
- הפרעות בתנועת רצועות כגון רעד, טיקים. שינויים בטונוס השרירים, איטיות בתנועה.
- תגובה אלרגית בעין או בעור מסביב לעין.
- כשל בזרימת הדם בגוף.
- הסמקה.
- חבורות דמויות פריחה.
- דלקת כלי דם, לעיתים קרובות עם פריחה עורית.
- חולשת שרירים, כאבי מפרקים ושרירים.
- השפעה על תפקודי הכליות העלולה להוביל לאי-ספיקת כליות.
- הליכה לא מאוזנת.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

ירידה חמורה במספר תנאי ירידה הלבנים המעלה את הסבירות לזיהומים.
איבוד הכרה כתוצאה מירידה חמורה ברמות הסוכר בדם (תדרמת היפוגליקמית).
ראה סעיף 2.

קצב לב מהיר חריג, קצב לב לא סדיר המסכן חיים, שינוי בקצב הלב (הנקרא "מארצת מקטע QT", הנראה ב-א.ק.ג., רישום הפעילות החשמלית של הלב).
דלקת ריאות הגורמת לקוצר נשימה, שיעול וחום גבוה (דלקת ריאות אלרגית).
קוצר נשימה חמור.

- פוסטולוים תפרחתית מפושטת חדה (אזור אדום נפוח עם מוגליות קטנות מרובות).
- כאב או חולשת שרירים, פירוק שרירים חריג העלול להוביל לבעיות בכליות.
- קרע חלקי או מלא של שריר.
- דלקת כליות העלולה לגרום לנפיחות בקרסוליים או ללחץ דם גבוה.
- אופולקסצין עלול לעורר התקף של פופרייה אצל מטופלים רגישים.
- עלייה ברמות הסוכר בדם (במיוחד אצל חולי סוכרת).
- עצבנות.

- נענוע לא רצוני של הגוף או תנועה לא מבוקרת של פלג הגוף העליון או של הגפיים התחתונות.
- איבוד תפקוד הטעם של הלשון.
- איבוד הכרה זמני הנגרם כתוצאה מירידה בלחץ דם.
- חום.

תתליך עיכול כואב, קשה או מופרע, העלול להיות מלווה בתסמינים כגון בחילה והקאה, צרבת, נפיחות ואי נוחות בבטן, הצטברות גזים במערכת העיכול, כאב במתן צואה, דלקת בלבול.

- דלקת הפה והשפתים.
- דלקת ונוקשות המפרקים.
- אובדן או חוסר חזק גופני ההולל כאבי גב, חזה וגפיים.
- כשל של מח העצם עלול להוביל לנפיצטופניה (מצב רפואי בו יש ירידה במספר תאי הדם האדומים והלבנים עם) של הטיות).
- דלקת של העין (אבאטיס).
- אדמומיות נרחבת בעור (דארמטיטיס אקספוליאטיבית).

אצל מטופלים העוסלים פלואורוקווינולונים בדם של מקרים של הגדלה או החלשות של דופן אבי העורקים או קרע חלקי דופן אבי העורקים (מפרצת או ביותר), העלולים להוביל לקרע מלא ולהיות קטלניים, ועל מקרים של דליפת מסתמי הלב.
ראה סעיף 2.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עלוך להתייעץ עם הרופא.

ידוע על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לתוסף המוקנון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il