

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירט) התשא"ז- 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פלוטיפורם® 5/5

פלוטיפורם® 125/5

פלוטיפורם® 250/10

תרחיף לשאיפה

החומרים הפעילים:

כל מנה מדוזה לשאיפה של **פלוטיפורם 5/5** מכילה:

50 מк"ג פלוטיקאזוֹן פרופיונאַט (fluticasone propionate) ו- 5 מק"ג פורמוטרול פומארט די-הידראט (formoterol fumarate dihydrate).

כל מנה מדוזה לשאיפה של **פלוטיפורם 125/5** מכילה:

125 מק"ג פלוטיקאזוֹן פרופיונאַט (fluticasone propionate) ו- 5 מק"ג פורמוטרול פומארט די-הידראט (formoterol fumarate dihydrate).

כל מנה מדוזה לשאיפה של **פלוטיפורם 250/10** מכילה:

250 מק"ג פלוטיקאזוֹן פרופיונאַט (fluticasone propionate) ו- 10 מק"ג פורמוטרול פומארט די-הידראט (formoterol fumarate dihydrate).

לרשימת המרכיבים הנוספים ראה סעיף 6.

ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרא בעין את העلون עד סוף בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

השימוש ב**פלוטיפורם 5/5** אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 5.

השימוש ב**פלוטיפורם 125/5** אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12.

השימוש ב**פלוטיפורם 250/10** אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בחולי אסתמה, במקרים המתאים לטיפול משולב בקורטיקואיסטרואיד ובטא אגונייט בעל פעילות ממושכת בשאיפה.

פלוטיקאזוֹן פרופיונאַט מסיע בהפחחת הנפיחות והדלקת בריאות.

פורמוטרול פומארט די-הידראט הינו מרחב סימפונות אחר טווח המשמייע בשמרית מעבר האויר לריאות פתוחים ומקל על הנשימה.

קבוצות רפואיות:

פלוטיקאזוֹן פרופיונאַט: קורטיקואיסטרואידים.

פורמוטרול פומארט די-הידראט: בטא אגונייט (בעל פעולה ממושכת).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל התכשיר (לרשימה המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6).

ازהרות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופת:

לפני הטיפול בפלוטיפורם (ובמהלכו) ספר לרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר מ-:

- שחתות: התסמים נטולים שיעול מתמשך לרוב עם ליחת דמית, חום, עייפות, חוסר תיאבון, ירידת משקל, הצעת לילה.
- זיהום בריאות או בדרכי הנשימה (חיזיקי, נגיף, פטריטי או אחר).
- בעיות לב ברגע: בעיות באדרמת הדם ללוב או היצרות אחד מסתמי הלב (המסתמ הוותיני/aortic valve), אי ספיקת לב (עלולה לגרום לקוצר נשימה /או נפיחות בקרטולימ), מצב בו שריר הלב מוגדל, אי סדרות בעוימות הלב, או אם נאמר לך כי רישומי הלב שלך אינם תקין (הארכת מקטע QTc).
- התרחבות לא רגילה של דופן כלי דם (מפרצת).
- סוכרת
- לחץ דם גבוה
- פעילות יתר של בלוטת התריס שעשויה לגרום לתיאבון מוגבר, ירידת משקל או הצעה.
- רמות נמוכות של אשלגן (פוטסיום) בדם, שיכלות לגרום לחולשת שרירים, עוויתות או קצב לב לא סדר.
- תפוקוד לקי של בלוטת האדרנלן (אם בלוטת האדרנלן שרך לא מתפקדת כנדרש, אתה עלול לחוות תסמים נגון: כאבי ראש, חולשה, עייפות, כאב בטן, חוסר תיאבון, ירידת משקל, סחרחות, לחץ דם מאוד נמוך, שלשול, בחילות, הקאות או פרכוסים) או גידול של בלוטת האדרנלן (פאוכורומוציטומה).
- בעיות בכבד.

ازהרות נוספת:

- אם אתה עומד לעבור ניתוח, או מצוי במצב של מתחת קיצוני, יש להודיע לרופא, שכן יתכן ותצטרכו תוספת טיפול בסטרואידים כדי לאזן את האסתמה שלך.
- פלוטיפורם אינו מיועד לטיפול בהתקף אסתמה פתאומי. יש לשמור בהישג יד משאף המיועד להקלת מידית של התקף אסתמה.
- יש לפנות לרופא אם אתה חווה טשטוש ראייה או בעיות ראייה אחרות.

שימוש בילדים:

השימוש בפלוטיפורם 5/50 איננו מיועד לילדים מתחת לגיל 5.
 השימוש בפלוטיפורם 125/5 איננו מיועד לילדים מתחת לגיל 12.
 השימוש בפלוטיפורם 250/10 איננו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות ומעקב:

- הרופא יעקוב אחר תסמיני האסתמה שלך ותגובהך לטיפול.
- בחולן סוכרת - יתכן ויהיה צריך במעקב צמוד יותר.
- במקרים מסוימים יתכן והרופא יבודק את רמות האשלגן בדם.
- ילדים מעל גיל 5 המשתמשים בתroppה לתקופה ממושכת - מומלץ לבצע מעקב גידלה.

תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקחת או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקחת:

- תרופות משפחת חוסמי בטא, כגון: אטנולול, פרופרנולול, סוטולול או מטופרולול (טיפול בחץ דם ובעיות לב), טימולול (המצוי למשל בטיפול עניינים לטיפול בגלואקומה).
- תרופות מסוימות לטיפול באסתמה ובעיות נשימה, כגון: תיאופילין או אמינופילין.
- תרופות המכילות אדרנלין או חומרים דומים (כולל תרופות בטא אгонיסטיות אחרות כגון סלבוטומול או תרופות בטא אנטגוניסטיות, כולל אטנולול, מטופרולול, פרופרנולול, טימולול). אין להשתמש בתרופות בטא² אгонיסטיות נוספת

- בעלות פעילות ממושכת בעת השימוש במשאף. אם ישנה החמרה באסתמה בין מנת פלוטיפורם אחת לשניה, יש להשתמש במשאף המועד להקלת מידית של התקפי אסתמה.
- **אנטיהיסטמינים (לטיפול באלהגיה).**
 - **תרופות משתנות (לטיפול בחץدم גבוה או בחצברות נזלים).**
 - **תרופות לטיפול בעיות קצב לב, כגון: קינידין, דיסופירמיד, פרוקאנאמיד.**
 - **תרופות לטיפול בתסמיני דיכאון או הפרעות נפשיות, כגון: מעכבי מונואמין אוקסידאץ (לדוגמה: פנליין, איזוקרבוקסאציד), נוגדי דיכאון טריציקלים (לדוגמה: אמיטריפטילין, אימיפרמן). יש לידע את הרופא גם אם נטלת תרופות כלשהן מסווג אלו במהלך השימוש האחוריים.**
 - **תרופות לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות או נפשיות (כגון, פנותיאזינים או תרופות אנטיפסיכוטיות).**
 - **תרופות אחרות המכילות סטרואידים.**
 - **תרופות נגד פטריות כגון: קטוקונאצול, איטרקונאצול.**
 - **תרופות מסוימות עלולות להגבר את ההשפעה של פלוטיפורם, וייתכן שהרופא ירצה לעקב אחר מצבך ביתר זהירות, אם אתה נטל תרופות אלו במהלך לטוטיפורם. תרופות אלו כוללות בין היתר תרופות מסוימות לטיפול באידס/נגד נגיף ה-HIV, כגון: ריטונאביר, אטازאנאביר, אינדינאביר, נלפינאביר, סאקוינאביר, קוביסיסטאט.**
 - **תרופות אנטיביוטיות כגון: קלריטרומיצין, טליתרומיצין, פוראזוילידן.**
 - **לבודופה (טיפול בפרקנסון).**
 - **לבוטירוקסין (טיפול בתת פעילות של בלוטת התריס).**
 - **אוקסיטוצין (תרופה לזרוע לידה).**
 - **פרוקארבאזין (טיפול במחלת הוג'קין).**
 - **חומר הרדמה (המשמשים בניווחים). במידה והן מתוכן עברו ניתוח תחת הרדמה כללית, יש לידע את הרופא בבית החולים שאתה משתמש בתכשיר זה.**

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול: התיעץ עם הרופא.

הרין והנקה:

אם את בהריון, חושבת שאת בהריון, מתכנתת הרין או מניקה יש להיעזר ברופא לפני השימוש בתרופה.

ניגזה ושימוש במכנות:

לא סביר שתרופה זו תשפיע על יכולת הנהוג או להשתמש במכנות.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- פלוטיפורם מכיל 2 מ"ג של אתנוול (אלכוהול) בכל מנת טיפול (2 שאיפות). הכמות בכל מנת שווה ערך לפחות מ-1 מ"ל בירה או 1 מ"ל יין. לכמות הקטנה של אלכוהול בתכשיר זה לא תהיה השפעה ניכרת.
- פלוטיפורם מכיל כמות קטנה של סודיום קרומוגליקאט. אם אתה משתמש בתכשיר נוספת המכיל קרומוגליקאט (המשמש לטיפול באסתמה, נזלת אלרגית ודלקת אלרגית של הלחמית) אפשר להשתמש בו כרגע.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הרופא ירשום את המנה הנדרשת לטיפול באסתמה שלך.

המינון המקובל בדרך כלל **במבוגרים ומתבוגרים וילדים מעל גיל 5**: שתי שאיפות בבוקר ושתי שאיפות בערב.


השימוש בפלוטיפורם במינון הגבוה ביותר (פלוטיפורם 10/250) מיועד רק למבוגרים. אין להשתמש בפלוטיפורם 10/250 בילדים וממתבוגרים מתחת לגיל 18.

השימוש בפלוטיפורם במינון הביניים (פלוטיפורם 5/125) מיועד רק למבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12. אין להשתמש בפלוטיפורם 125/5 בילדים מתחת לגיל 12. השימוש בפלוטיפורם במינון הנמוך (פלוטיפורם 50/5) מיועד רק לילדים, מתבגרים ומבוגרים מגיל 5 ומעלה. אין להשתמש בפלוטיפורם 50/5 בילדים מתחת לגיל 5.

אין לעבור על המנה המומלצת.
שים לב! תרופה זו מיועדת לשאייפה בלבד!

הוראות השימוש:

התרופה מציה בכל ארצות לחץ, המצוי בתוך מעתפת פלסטי (המשאף). המשאף כולל מד מנות, שטראה כמה מנות מדומות לשאייפה עוד נשארו במשאף, לאחר טעינתו (ראה איור 1). מד המנות מקודד לפי צבעים: הוא מתחילה כירוק; כשנשארות פחות מ-50 מנות מדומות הוא משתנה לצהוב; וכשנשארות פחות מ-30 מנות מדומות הוא משתנה לאדום. מד המנות סופר מטה מ-120 ל-60 במרוחחים של 10, ומ-60 עד 0 במרוחחים של 5. כאשר מד המנות מתקרב לאפס, עליך לפנות לרופא, כדי לקבל מרשם למשאף חדש. אין להשתמש במשאף כshed המנות מורה על אףו.



הכנת המשאף:

- לפני השימוש במשאף בפעם הראשונה, או במידה והמשאף לא היה בשימוש יותר מ-3 ימים, יש לטעון אותו, כדי להבטיח שהוא עובד כראוי ומשחרר את המנה הנכונה.
- אם המשאף נחשף לטמפרטורות מקריות, יש להניח לו להתחכם בטמפרטורת החדר ל-30 דקות, ולאחר מכן לטעון אותו, כדי להבטיח שהוא עובד כראוי ומשחרר את המנה הנכונה.


בכדי לטעון את המשאף:

- יש להסיר את מכסה הפיה ולנעער את המשאף היבט.
 - יש לכூן את הפיה הרחק מפה ולשחרר לחיצה אחת לחיל האוור, באמצעות לחיצה כלפי מטה על מכל התרופה. יש לבצע שלב זה 4 פעמים.
- יש תמיד לנער את המשאף לפני השימוש.

השימוש במשאף:

אם במהלך השימוש במשאף, אתה מרגיש קוצר נשימה, צפופים, או קשיים בנשימה, יש להפסיק את השימוש בפלוטיפורם ולפנות לרופא בהקדם האפשרי, היות שייתכן ותצטרך טיפול נוסף.

יש לבצע את השלבים הבאים, תוך הקפדה על ביצוע שלבים 2 עד 5 באיטיות:
1. הסר את מכסה הפיה (ראה איור 2) ובודק שהמשאף נקי ולא אבק.



2. יש לנער את המשאף מיד לפני השחרור של כל כמות מדודה לשאייפה, כדי להבטיח אחידות בתוכנות המשאף.
3. שב זקוף או עומד. נשוף החוצה נשיפה איטית ועמוקה ככל יכולתך.
4. החזק את המשאף בצורה אנכית וישראל (כפי שמודגם באיור 3) עם האגדול בבסיס המשאף תחת הפיה והאצבע המורה בראש המשאף. הכנס את הפיה לתוך הפה תוך הידוק השפטים סביבה. אין לנשור את הפיה.
5. שאף עמוק ובייטיות פנימה דרך הפה ובו זמנית לחץ מטה על מכל התרופה כדי לשחרר כמות מדודה אחת לשאייפה. המשך לשאוף שאיפה קבועה ועמוקה פנימה (באופן אידיאלי למשך כ-2 עד 3 שניות בלבדים ו-4 עד 5 שניות במוגרים).



6. הוציא את פיית המשאף מפייך תוך כדי החזקה נשימתך. המשך להחזיק את נשימתך ככל שתוכל ונשוף החוצה בייטיות. אין לנשוף לתוך המשאף.
7. להוצאת הכמות המדודה לשאייפה השנייה, החזק את המשאף בצורה אנכית וישראל וחזור על שלבים 2 עד 6.
8. לאחר השימוש, החזר את מכסה הפיה למקוםו.

אתה יכול להתאמן בשימוש מול מראה.
אם אתה רואה "רְסָס" יוצא מחלקן העליון של המשאף או סביב פיר, כאשרה משתמש במשאף, יתכן שלא שافت את התרופה כראוי. קח מנה נוספת, תור חזרה על השלבים מ-2 ואילך.

- לאחר השימוש במשאף, יש לשטוף את הפה, לגירג עם מים או לצחצח שניינים ולירוק את השארית. פעולות אלו יכולות לתרום להפחתת הסיכון להתקפות פטרת, כאבים בפה וברגרן או צרידות.
- אם יDIR חילשות, יתכן יהיה לך יותר להחזיק את המשאף בשתי ידיים, ולהניח את שתי האצבעות המורות על מכל התרופה ואת שני האגדולים על בסיס המשאף.
- במידת הצורך, ובהתאם עצצת עם הרופא או הרוקח, ניתן להשתמש בספייסר (AeroChamber Plus). למכשיר זה יצורפו הוראות שימוש ונקיוי ועליר לקרוא אותן בעיון.

ניקוי המשאף:

יש לנוקות את המשאף פעם בשבועו ולהקפיד על הוראות הניקוי:

- הסר את מכסה הפיה. אל תוציא את מכל התרופה מעטפת הפלסטייק.
- נגב את הצד הפנימי והחיצוני של הפיה ואת מעטפת הפלסטייק עם מטלית יבשה ונקייה או טישו.

- החזר את מכסה הפיה.
- אין להביא את מכל המתקת ב מגע עם מים.

אם השתמשה במינון גבוה יותר, פנה לרופא להתייעצות.

אם מופיעים תסמינים חמורים של מינון יתר או אם בטעותILD השתמש בתרופה או בעל ממנה, **פנה מיד לרופא** או לחדר מין של בית חולים לקבלת עזרה רפואי. יש להביא את אריזת התרופה איתך. תסמיני מנת יתר כוללים: כאב חרום בחזה, לחץ דם גבוה או נמוך, כאב ראש, התכווצות שרירים, קשי' שינה, עצבנות, יובש בפה, אובדן תיאבון, עוויתות, פרכוסים, רעד, סחרור, עילפון, עיפות, תחוחת חול'י והרגשה כללית רעה. יתכונו גם הפרעות ושינויים בקצב פעימות הלב, רמת אשלאן נמוכה בدم, עליה או ירידה בכמות הסוכר בדם, כאב בטן, בחילות, הקאות, ירידת משקל, ירידת ברמת ההכרה (יכול להתבטא בישנויות או בלבול).

אם השתמשת במנון גבואה מהומלץ, לאורך תקופה ממושכת, יש להתייעץ עם הרופא היוט שמנונות גבואה, עלולות לגרום לירידה בכמות ההורמוניים הסטראודים שנוצרים באופן רגיל בגוף (ראה סעיף 'תופעות לוואי').

אם שכחת לשמש במשאף בזמן הקצוב, יש לקחת את המנה מיד כשנצרת. אם הגיע הזמן למננה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אין לקחת מנה כפולה כדי לפצוץ על המנה שנשכחה.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה: חשוב להקפיד על שימוש במשאף כל יום, לפי הוראות הרופא ב כדי לשלווט באסתמה, אפילו אם אתה מרגיש טוב. אם ברצונך להפסיק לשמש במשאף, התיעץ עם הרופא. הרופא יחליט על הדרך לעשות זאת, בדרך כלל על ידי הורדה הדרגתית של המין על מנת שלא יגרם התקף אסתמה.

אין ליטול או לשמש בתרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם שהינך משתמש בתרופה.** הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפלוטיפורם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואין. יתכן ולא תסבול מ一封 אחת מהן. הרופא ירשום לך את המנה הנמוכה ביותר ההכרחית לטיפול באסתמה שלך, כדי להוריד את הסיכון לתופעות לוואי.

פנה לרופא מיד בהופיע התופעות הבאות:

- **תגובה אלרגית.** תגובה אלרגית חמורה היא נדירה. **תסמינים של תגובה אלרגית כוללים:** התנפחות פתאומית של העפעפים, הפנים, האגן, הלשון או השפטים, פריחה או גירוד (במיוחד כאשר המערבים את הגוף כלו), סחרחות, סחרור, עילפון, שינוי פתאומי בדף הנשימה, כגון: הגברת הצפופים או קוצר הנשימה.
- טשטוש ראייה או בעיות ראייה אחרות.

הפסיק לשמש במשאף ופנה לרופא, אם מיד לאחר השימוש בפלוטיפורם אתה חש בהגברת של הצפופים וקוצר הנשימה. במקרה זה, השתמש במשאף מהיר הפעולה שיש לך למקרים בהם אתה זקוק להקלת מידית ופנה לרופא מיד. הרופא יבצע הערקה של מצבך וייתכן כי ישנה את הטיפול שלך. עליך לשאת איתך את המשאף מהיר הפעולה, המנקה הקללה מידית, בכל עת.

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות ב 10-1 מטופלים מתוך 1,000):

- החמרת האסתמה.

- כאב ראש, רעד, קצב לב לא סדר או דפוקות לב חזקיות (פלפיטזיות); סחרחוורת; קשיים בשינה, נדודי שינה; שינויים בקול, קול צרוד; יובש בפה, גרון כאב או מגורה; פריחה.

תופעות לוואי נדירות (מופעות ב 10-1 משנתמשים מתוך 10,000):

- עליה ברמת הסוכר בדם. אם אתה סובל מסוכרת, יתכן וצטרך לבדוק את רמות הסוכר לעתים תכופות יותר ולהתאים את הטיפול בסוכרת. יתרון והרופא יבצע מעקב תכוף יותר.
- פטרת בפה ובגרון; דלקת השינועים (סינוסיטיס); דפוקות לב מהירות; כאב בחזה הקשור במחלת לב; התכווצויות שריריים; שיעול או קוצר נשימה; שלשול; הפרעות בעיכול; שינויים בחוש הטעם; תחושת שחור (רטיגו); חלומות בלתי רגילים; אי שקט; גרד בעור; לחץ דם גבוה; תחושת חולשה בלתי רגילה; התנפחות הידיים, הקרטוזים או כפות הרגליים (בצקת).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- ראייה מטושטשת.
- בעיות שינה, תחושת דאגה או דיכאון, תוקפנות, חרדה, חוסר מנוחה, עצבנות, התרגשות יתר, רגונות. שכיחות תופעות אלו גבוהה יותר בילדים.
- התופעות הבאות הקשורות לשימוש בפורומוטROL פומארט: רמות אשלגן נמוכות בדם (עלול לגרום לחולשת שרירים, עוויתות, קצב לב לא רגיל), הארכת מקטע QT ברישום לב, רמה גבוהה של חומצה לקטית בדם, בחילות, כאבי שרירים.

- השימוש בסטרואידים בשאייפה, עלול להשפיע על הייצור התקין של הורמוניים סטרואידים בגוף, במיוחד בשימוש בגין גובה לאורך זמן. התופעות כוללות: שינוי בCAFPOUT העצומות (דילול עצם), קטרקט, גלאוקומה (עליה בלחץ תוך עיני), חבורות בעור או הידקקות העור; עליה בסיכון להידבק בזיהומיים, האטה בקצב הגדילה בילדים ומתבגרים, פנים עגולות ("פני ירח"), השפעה על בלוטת האדרנל (בלוטה הממוקמת בקרבת הכליות) שעשויה להתבטא ב: חולשה, עייפות, קושי להתמודד עם מצב לחץ, כאב בטן, איבוד תיאבון, ירידת משקל, כאב ראש, סחרחוורת, לחץ דם נמוך מאוד, שלשול, בחילות, הקאות או פרוכומים.

لتופעות אלו סבירות נמוכה יותר לקרות בשימוש בסטרואידים בשאייפה מאשר בשימוש בסטרואידים בטבליות. אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה מחייבת, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלו, עליך להתיעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגובה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון שלוותו.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל- $C^{\circ}25$. אין לאחסן במקرار או להקפיא.
- אם המשאף נחשף לטמפרטורות מkapיאות, יש להניח לו להתחם בטמפרטורת החדר ל-30 דקות, ולטען אותו לפני השימוש (ראה סעיף 3 'יכיז' תשמש בתרופה?').
- אין להשתמש יותר מ-3 חודשים לאחר הוצאת המשאף משקיק האלומיניום, או אם מד המנות מראה את הספירה "0" (אפס).
- אין לחשוף לטמפרטורות העולות על $C^{\circ}50$. מכל התרופה מכיל נוזל בלחץ لكن לנקב, לשבר או לשറוף את המכלי אפילו כשהוא נראה ריק.

6. מידע נוסף

- **נוסך על החומרים הפעילים התכשיר מכיל גם את המרכיבים הבאים:**
Sodium cromoglicate, ethanol, hydrofluoroalkane (HFA 227)
- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?**
המשאף כולל את מכל התרופה המכיל תרחיף לבן, המצויה בתוך מעתפה פלסטיק בצלבים לבן ואפור. מכסה הפיה הינה אפור בהיר.
כל משאף מכיל 120 מנות מדודות (שאייפות).
בכל אריזה משאף אחד.

בעל הרישום: מעבדות רפואי בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301, ישראל.
היצרן: رسיפארם CH בע"מ, צ'שייר, אנגליה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פלוטיפורם 50/5 : 150 62 33812
פלוטיפורם 125/5 : 150 63 33813
פלוטיפורם 250/10 : 150 64 33814

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

העלון נערך בפברואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.