

עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים  
(תקנירם) התשמ"ו - 1986

התרופה משוקת ללא מרשם רפואי

## רקטוצורין<sup>®</sup>

### משחה

הרכב

אבק אוקסיד	10.0%
ביסמוט אוקסילוריד	8.0%
בנומוקאן	4.0%
תימול בי- יודיד	2.0%
מנטול	0.25%
Zinc oxide	10.0%
Bismuth oxychloride	8.0%
Benzocaine	4.0%
Thymol biiodide	2.0%
Menthol	0.25%

## רקטוצורין<sup>®</sup>

### פטילות

הרכב

כל פtilella מכילה:

תימול בי- יודיד	150 מ"ג
ביסמוט סבגאלט	100 מ"ג
אבק אוקסיד	100 מ"ג
בנומוקאן	100 מ"ג
chromatza טאנית	20 מ"ג
מנטול	5 מ"ג
Thymol biiodide	150 mg
Bismuth subgallate	100 mg
Zinc oxide	100 mg
Benzocaine	100 mg
Tannic acid	20 mg
Menthol	5 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים

ואלרגניים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלקי המרכיבים של התרופה" וסעיף

6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העlon עד סופו בטרם

תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע

המצוי על התרופה. אם יש לך שאלות

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות

בסעיף 3 בעlon זה. היועץ ברוקח אם

אתה זוקק למידע נוספת. עליך לפנות

לרופא אם תסmini המחללה (סימפטומים)

מחקרים או אין מושג מעתיפים.

התרופה אינה מיועדת למטופלים מתחת

לגיל 18 שנים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

הקלה בכאבי טוחרים.

### קבוצה רפואיית

תגובות לטיפול בטוחרים לשימוש בפי

הטבעת (שימוש רקטאלי).

### 2. לפני השימוש בתרופה

אין לשמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, ראה סעיף 6 – "מידע נוספת".
- אתה רגיש למאלチשים מוקומיים (פרוקאין, בוטאקאן [butacaine]) או לחומצה פרא-אמינובנזואית, לפראבנינים או ל-Paraphenylenediamine (PPD) או לצבעי שיער. ראה סעיף 6 – "מידע נוספת".
- מדובר בשטיח עור גודלים, בפרירה עורית, בכוכיות שם, בעור פגום או מודלק או בפה או בעיניים.
- יש לך קצב לב איטי או לא סדר.
- יש לך היסטוריה או חשד לרמות פיגמנט (צבע) בدم לא תקין.
- יש שילוב עם תרופות מסווג-סולפונamideים או מעכבי כולין-אסטרואז.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול ברקטוצורין ספר לרופא אם:

את בהירון, או אם את מניקה.  
יש לך דימום מפני הטבעת (דימום רקטאל), דם בצוואה או אם אתה חושש שמקור הדימום שאתה חווה אינו בטוחרים.

יש לך גרד כלילי בכל הגוף.

אתה מתחת לגיל 18 שנים.

אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

אתה רגיש ליריד.

אין לשמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכתibli להיוועץ ברופא.

### ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת למטופלים מתחת

לגיל 18 שנים.

### תגובה בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות לא-

מרשם ותוספי תזונה, ספר על כר

לרופא או לרוקח.

### הירון, הנקה ופוריות

אין לשמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את

בhirion או מניקה.

### נהיגה ושימוש במכונות

רקטוצורין משחה ופטילות אין בעלות השפעה על יכולת הנהיגה והשימוש

במכונות.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של

התרופה

רקטוצורין משחה מכילה לנולין (wool fat) העולול לגרום לתגובה מקומית

בעור (כגון דלקת עור מגע).

### 3. כיצד תשמש בתרופה?

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

פטילות אחת בבוקר ובערב וכן לאחר

כל יציאה (פעולות מעיים).

משחה:

יש לזרום את המשחה באוזור פי הטבעת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה (פעולות מעיים).

אין לעור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר

ימים יש לפנות לרופא.

### אופן השימוש

אין לבולו! תרופה זו מיועדת לשימוש

בפי הטבעת (רקטום) בלבד.

התרופה אינה מועדת מתחת לגיל

18 שנים.

### משחה:

רחץ ויבש בעדינות באוזור פי

הטבעת.

• מרוח כמהות קטנה של המשחה ועסה בעדינות.

• סגור היטב את השפורה.

• רחץ יידר.

אם לפוי הוראות הרופא יש להחדיר את המשחה לתוך פי הטבעת, נוגה כדלקמן:

• לחבר את האפליקטור (מוליר) לקצה השפורה הפתוחה.

• החדר בעדינות את קצה האפליקטור לתוך פי הטבעת.

• לחץ בעדינות על השפורה להוציאת המשחה.

• בסיום, הפרד את האפליקטור (מוליר) מהשפורה ורחץ אותו היטב במים חמים וסבון.

• סגור היטב השפורה ורחץ אותו היטב.

**פטילות:** • רחץ ויבש בעדינות באוזור פי הטבעת.

• הראות פטייחה: הפרד פtilella אחת

מסרט הפטילו. להסרת עטיפת הפטילו הפלסטי, הפרד הלשונית בחלק השטוח של עטיפת הפלסטי ומשור.

לצדדים עד יציאת הפtilella מהעטיפה.

ניתן להרטיב את הפtilella במעט מים להקלת החדרה (ראה העירה מטה).

שכב על צידר והחדר הפtilella עמוק.

בסיום, הרחץ את הפtilella בדוק.

הערה: אם הפtilella רכה מדי, ניתן לצננה

במקרר במשך כ- 30 דקות או לצננה חחת מים קרים לפני הסרת עטיפת הפלסטי.

אם נטלת מנתית יתר או אם בטונות בעלת

או בעל ילד מן התרופה, יש לפנווות מיד

לרופא או לחדר מין של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה אליו. אל

תגרום להקה לאלא הוראה מפורשת מהרופא!

**אם שכחת ליטול את התרופה, כת**

את המנה הבאה לפוי הוצרך. אין ליטול

מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשחה.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק

התוויות והמנה בככל **עמם** שאתה גוטל

תרופה. הרכב **משקפיים** אם אתה

זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בקשר

לשימוש הלוואי, היועץ ברופא או ברופא

ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברקטוצורין

עלול לגרום לתופעות בכלי הדם

המשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת

תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה

מתופעות הלוואי חמירות או כאשר

אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה

בעlon, עליך לדווח ל הרפואי עם הרופא.

**דיווח על תופעות לוואי:**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד

הבריאות באמצעות לחיצת על הקישור

"דיווח על תופעות לוואי" שמצא בדף הבית של אתר

משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il))

המפנה לטופס המקון לדיווח על תופעות

לוואי, או על ידי כניסה לכניסה

<https://sideeffects.health.gov.il>

**5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה

אחרת יש לשמור במקומות סגור מחוץ

להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים

/או תינוקות ועל-ידי כך תמן

הרעלת הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך.

אלא תסבב בפה או בעיניים.

אלא תסבב בעור או בעיניים.</