

עלון לצרcn לפי תקנות הרווחחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טאגריסוTM 40 מ"ג

טאגריסוTM 80 מ"ג

טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה:

オスימרטיניב (c-메סילאט) 40 mg 40 מ"ג

オスימרטיניב (c-메סילאט) 80 mg 80 מ"ג

למרכיבים בלתי פעילים אנא ראה סעיף 6 – " מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטראם תשמש בתרופה.

שמור את העلون אולי תצטרך אותו בשנית.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18.

1. מהי טאגריסו ולמה היא מיועדת?

טאגריסו מיועדת לטיפול משלים לאחר כריתה גידול במטופלים מבוגרים עם סרטן ריאה מסווג תאים שאינם קטנים (NSCLC), בו הגידול נושא מוטציה ב EGFR מסווג חוסר באקסון 19 (exon19 deletion) או מוטציה 858L באקסון 21

טאגריסו לטיפול מונותרפי מיועדת ל:

- לטיפול קו ראשון במובגרים עם סרטן ריאה מסווג תאים שאינם קטנים non-small cell lung cancer (NSCLC) מאקטבטה (EGFR activating mutation) ב-
- טיפול במובגרים עם סרטן ריאה מסווג תאים שאינם קטנים, לטיפול מתקדם מקומי או גורומי, שלמחלתם יש מוטציה epidermal growth factor receptor (EGFR) T790M ב-
- לטיפול מתקדם מקומי או גורומי, לטיפול מתקדם non-small cell lung cancer (NSCLC) epidermal growth factor receptor (EGFR) B-

קבוצה תרפואיית

תרופות לטיפול בסרטן, מעכב של פרוטאין קינאז.

התרופה תירשם על ידי רופא המנosa בטיפול רפואי הסרטן.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- יש לך רגשות ותיר למרכיב הפעיל או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6 - "מידע נוספת" מטה).
- הינך צריך במקביל את ה- St. John's Wort (היפריקום פרפורטום).

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בטאגריסו:

לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של דלקת בריאות הנקרת מחלת ריאות אינטרסטיציאלית (interstitial lung disease).
- הייתה לך אי פעם בעיה לב, יתכן ותצטרכך השגחה רפואי.
- יש לך היסטוריה של בעיות עיניים.

אם אחד מהלן נוגע לך (או אם אין לך בטוח), אנא התיעץ עם הרופא או הרוקח לפני התחלת השימוש.

ספר לרופא מיד כאשר אתה משתמש בתרופה זו אם:

- יש לך קושי פתואמי בנשימה בלבד עם שיעול או חום.
- יש לך קילוף חמור של העור.
- יש לך פעימות לב מהירות או לא סדירות, סחרחות, תחושת סחרור, חוסר נוחות בחזה, קוצר נשימה ועילפון.
- אתה מפתח עיניים דומות, רגשות לאור, כאבי עיניים, עיניים אדומות או שינויים בראיה. למידע נוספת, ראה גם תופעות לוואי המחייבות התיחסות מיוחדת בסעיף 4 בעлон זה.
- אתה מפתח חום ממושך, חבורות או דימום ביתר קלות, עייפות מוגברת, עור חיוך וziehom .
- אתה מפתח חום ממושך, חבורות או דימום ביתר קלות, עייפות מוגברת, עור חיוך וziehom . למידע נוספת, ראה גם תופעות לוואי המחייבות התיחסות מיוחדת בסעיף 4 בעлон זה.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כיון שתאגריסו יכולה להשפיע על אופן פעולתן של תרופות אחרות, גם מספר תרופות אחרות יכולות להשפיע על אופן הפעולה של טאגריסו.

ספר לרופא שלך לפני נטילת טאגריסו אם הינך נוטל תרופה כלשהי מבין התרופות הבאות:

- התרופות הבאות עלולות להפחית את הפעילות של טאגריסו:
- פניטואין, קארבאמאזפין או פנובארביטאל - לשימוש למחלת הנפילה (אפילפסיה) והתקפי התכווצויות.
 - ריפאבטין או ריפאמפיצין - לשחפת.
 - St. John's Wort (היפריקום פרפורטום) – תרפה מקור צמחי המשמש לטיפול בדיכאון.

טאגריסו יכולה להשפיע על פעילותן של התרופות הבאות, ו/או יכולה להגביר את תופעות הלוואי של התרופות הבאות:

- רוזובסטטין - להורדת רמת הcolesterol.
- גלולות הורמונליות למניעת הירינו.
- בוסנטן – תרופה המשמשת לטיפול ביתר לחץ דם רפואי.
- אפאבירנן ואטראבירנן – לטיפול בוירוס החסוני האנושי/איידס.
- מודפיניל – משמש לביעות שינה.

- דיביגטרן - משמש למניעת היוצרות קרישי דם.
- דיגוקסין - לטיפול באירוע ספיקת לב והפרעות קצב.
- אליסקירן - לטיפול ביתר לחץ דם.

אם הימך נוטל אחת מהתרופות לעיל, תידע את הרופא המטפל לפני נטילת טאגריסו. הרופא שלך יבחן אפשרויות טיפול מתאיימות עבורך.

הריוון, מניעת היריוון והנקה - מידע לנשים ולגברים

- אם הימך בהריוון, חשוב שתהימך בהריוון או מתכוננת להיכנס להריוון, תידע את הרופא לפני נטילת תרופה זו. אם נכנסת להריוון בעת נטילת התרופה, אנא תידע את הרופא מיד.
- הרופא שלך יחליט יחד איתך אם להמשיך את הטיפול בטאגריסו.
- אין להיכנס להריוון בעת נטילת התרופה, עליך להשתמש באמצעות מניעה ייעילים בעת נטילת התרופה. אנא ראי "מניעת הריוון – מידע לנשים ולגברים" מטה.
- אם הימך מתכוננת להיכנס להריוון לאחר נטילת המנה האחרונה של תרופה זו, תתייעצֵי עם הרופא שלך, כיון שהתרופה יכולה עדין להישאר בגוףך זמן מה לאחר סיום נטילת התרופה (ראי סעיף מניעת הריוון מטה).

הריוון - מידע לגברים

- אם בת הזוג שלך נכנסת להריוון בעת שאתה נוטל טאגריסו, תידע את הרופא שלך מיד.
- **מניעת הריוון - מידע לנשים ולגברים**
- יש להשתמש באמצעות מנעה ייעילים בתקופת הטיפול בטאגריסו.
- טאגריסו יכולה להפריע לפעילותן של גלולות הורמונליות למניעת הריוון. יש להתייעץ עם הרופא לגבי אמצעי מניעת מתאיימים.
- טאגריסו יכולה לעבור לזרע, לכן חשוב שגם גברים ישתמשו באמצעות מניעת.

לאחר סיום הטיפול בטאגריסו יש לנוהג על-פי ההוראות הבאות:

- **נשים** - להמשיך להשתמש באמצעות מנעה חודשיות נוספות נוספים לאחר הפסקת הטיפול בטאגריסו.
- **גברים** - להמשיך להשתמש באמצעות מנעה ארבעה חודשים נוספות נוספים לאחר הפסקת הטיפול בטאגריסו.

הנקה

אין להיניק בעת נטילת התרופה, מכיוון שלא ידוע אם קיים סיכון לתינוקך.

נהייה ושימוש במכונות

לא ידועה השפעה של טאגריסו על יכולת לנוהג או להפעיל מכונות מסוכנות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טאגריסו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל טבליה, ולמעשה נחשבת לנוטלת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אין בטוח.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון

- המינון המקובל בדרך כלל הוא טבילה אחת של 80 מ"ג בכל יום.
- במידה הצורך, הרופא יוריד את המינון היומי שלך לטבילה אחת של 40 מ"ג ליום.
אין לעבור על המנה המומלצת

אופן הנטילה

- יש לבלוע את הטבילה בשלמותה עם מים. אין לכתחש, לחצות, או ללעוס את הטבילה.
- יש ליטול בכל יום בערך באותה השעה.
- ניתן ליטול את התרופה עם אוכל או על קיבת ריקה.
- אם יש לך קושי בבליעת הטבילה, ניתן לערבב אותה במים:
 - יש לשים את הטבילה בכוס.
 - הוסף 50 מ"ל מים (לא תוספים) – אין להשתמש באף נוזל אחר.
 - ערבע את המים עד שהטבילה תתפרק לחתיכות קטנות – הטבילה לא תימס לחлотין.
 - יש לשתו את הנוזל מיד.
- כדי להבטיח שנטלת את כל התרופה, תשטווף את הכוס היטב עם 50 מ"ל נוספים של מים ושתה.

אם נטلت בטיעות מינון גבוהה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול מנה, קח אותה מיד כאשר תיזכר. אך אם נותרו פחות מ- 12 שעות עד לניטילת המנה הבאה, דלג על המנה ששכחת, וקח את המנה הבאה בהתאם בזמן הרגיל בו אתה נוטל את התרופה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם היינר מפסיק לחתת את התרופה

אין להפסיק טיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. חשוב לחתת את התרופה כל יום, לתקופה שהרופא שלך רשם עבורך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהיינר נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם היינר זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטאגיריסו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת הלואוי. ייתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי המחייבות התיעיחסות מיוחדת:

יש לפנות מידית לרופא אם אתה מבחין באחת מתופעות הלואוי החמורויות הבאות (ראה גם בסעיף 2):

- קושי נשימה פתאומי עם שיעול או עם חום. אלו יכולים להיות סימנים של דלקת ריאות הנקראת מחלת ריאות אינטרסטיציאלית 'interstitial lung disease', ניתן לטפל ברוב המקרים אך חלקם עלולים להיות מסכני חיים. הרופא יכול להפסיק לך את הטיפול בטאגיריסו בהופעת תופעת לוואי זו. תופעת לוואי זו הינה שכיחה (משפיעה על עד 1 מתוך 10 משתמשים). אם אתה מפתח עיניים דומות, רגשות לאור, כאבי עיניים, עיניים אדומות או שינויים בראיה. תופעת לוואי זו אינה שכיחה (משפיעה על עד 1 מתוך 100 משתמשים).
- שינויים בפעולות החשמלית של הלב (הארכת מקטע QT) כגון פגימות לב מהירות או לא סדרות, סחרחות, תחושת סחרור, חוסר נוחות בחזה, קוצר נשימה וטלפון. תופעת לוואי זו אינה שכיחה (משפיעה על עד 1 מתוך 100 משתמשים).
- תסמונת סטיבנס-ג'ונסון או TEN (toxic epidermal necrolysis), יכולה להופיע ככתמים אדמדמים דמווי מטרה (נגעים דמווי לוח מטרה) או כתמים עגולים, מלאווים לעיתים קרובות בשלפוחיות בגוף (מרכז הגוף חלק הגוף ללא הגפיים והראש), קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין או בעיניים, ולה קודמים חום ותסמניהם דמווי שפעת. תסמונת סטיבנס-ג'ונסון הינה תופעת לוואי נדירה (משפיעה על עד 1 מתוך 1,000 משתמשים). אני ראה גם סעיף 2. שכיחות הופעת תופעת הלוואי TEN אינה יכולה להיקבע כיון שדווחו מקרים רק לאחר תחילת שיווק טאגיריסו.
- בעיה בדם הנקראת אנמיה אפלסטיית, כאשר מה העצם מפסיק לייצר תא דם חדשים – סימנים המעידים על בעיה זו יכולים לכלול חום ממושך, חבורות או דימומים ביתר קלות, עייפות מוגברת וירידה ביכולת הגוף להילחם בזיהומיים. תופעת לוואי זו הינה נדירה (משפיעה על עד 1 מתוך 1,000 משתמשים).
- מצב בו הלב אינו מזרים מספיק דם בכל פערמה כפי שאמור, מצב העולל לגורם לקוצר נשימה, עייפות ונפיחות בקרסוליים (מעיד על אי ספיקת לב או ירידת בתפקת חדר שמאל לב).

אם מופיעות תופעות הלוואי החומרות הרשומות מעלה, יש לידע את הרופא מיד.

תופעות לוואי אחרות:

توفעות לוואי שכיחות מודג (משפיעות על יותר ממשתמש אחד מעשרה):

- שלשול - יכול להופיע ולהעלם במהלך הטיפול. יש לידע את הרופא אם השלול שלא נעלם או חמmir.
- בעיות בעור ובציפוריניים - הסימנים יכולים להיות כאב, גירוד, עור יבש, פריחה, אודם סביב הציפורניים בידים. התופעה שכיחה יותר באזורי החשופים לשמש. שימוש בקרם לחות על העור ועל הציפורניים באופן רגיל יכול לסייע בכך. יש לידע את הרופא אם הביעות בעור ובציפוריניים חממירות.
- דלקת של הריריות בחלל הפה או היוצרות כיבים בפה (סטומטיטיס).
- איבוד תיאבן.
- ירידת במספר תא הדם הלבנים (LOYKOZYTİM, LYMFOCİTİM או NOİTROFİLİM).
- ירידת במספר טסיות הדם.

توفעות לוואי שכיחות (משפיעות על עד ממשתמש אחד מעשרה):

- דימום מהאף (איפיסטקסייס)
- דילול שיער (אלופסיה)
- חרפת (אורטיקרייה) – כתמים מגדריים, מורמים על פני העור, עשויים להיות ורודים או אדומים ועגולים בצורתם. יש לידע את הרופא אם אתה מבחין בתופעת לוואי זו.

- תסמונת כף היד והרגל (Hand-foot syndrome) – תופעה זו עלולה לכלול אדמנומיות, נפיחות, תחושת עקצוץ או בעירה עם סדקים של העור בכפות הידיים ו/או בכפות הרגליים.
- עליה בקריאטיניןدم (חומר המיוצר בגוף ומפונה על ידי הכליות).
- עליה בחומר الدم הנקרא קריאטין פוספוקינאז (אנזים המשחרר לדם כאשר השリー נזוק)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמויפות בעד משתמש 1 מתוך 100):

- שינוי צבע העור לאפור או התכהות העור (היפרpigמנטציה)
- נגעים בצורה מטרה, שהינם תgebות עוריות המופיעות בצורה טבعت (עלול להעיד על אדמנת

רב-צורתית Erythema multiforme

- דלקת ברכי הדם בעור. יתכן שיראה כחברה או כתמים של פריחה על העור (פריחה על העור
שaina מלבינה כתוצאה מהפעלת לחץ non-blanching rash)

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמויפות בעד משתמש 1 מתוך 1,000):

- דלקת בשיריר אשר עלולה לגרום לחולשה או כאבי שרירים

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חממירה או כאשר רינק סובל מתופעת לוואי
שלא צוינה בעلون, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות
לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווה
ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה
مفורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך
התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין להשתמש בתרופה אם האריזה פגומה או נחבלת.
- יש לאחסן מתחת ל- -30°C , באריזה המקורית.

6. מידע נוספת

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
תכולת הטבלייה:

Mannitol

Microcrystalline cellulose

Low-substituted hydroxypropyl cellulose

Sodium stearyl fumarate

מעטפת הטבלייה:

Polyvinyl alcohol

Titanium dioxide

Macrogol 3350

Talc

Yellow iron oxide

Red iron oxide

Black iron oxide

• **כיצד נראה התרופה?**

אריזת התכשיר מכילה 30 טבליות.

טאגריסו 40 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע בז' מסומנות מצד אחד עם 'AZ ו- '40' וללא סימון מצד השני.

טאגריסו 80 מ"ג: טבליות מצופות, אליפסיות, קמורות משני צידיהן, בצבע בז' מסומנות מצד אחד עם 'AZ ו- '80' וללא סימון מצד השני.

يُصرَف:

אסטרהזניתקה A.B, סודרטליה, שבדיה.

בעל הרישום:

אסטרהזניתקה (ישראל) בע"מ,
רחוב עתירי ידע 1, כפר סבא 4464301

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

טאגריסו 80 מ"ג: 155-87-34654-00

טאגריסו 40 מ"ג: 155-86-34627-00

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

.2024 נערך באפריל