

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירטם) התשמ"ו - 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

אמביין סי. אר 6.25 מ"ג
אמביין סי. אר 12.5 מ"ג
טబליות בשחרור מושהה

חומר פעיל וكمותו:

כל טבליה של אմביין סי. אר 6.25 מ"ג מכילה: זולפידם טרטראט 6.25 מ"ג
Zolpidem Tartrate 6.25 mg

כל טבליה של אמביין סי. אר 12.5 מ"ג מכילה: זולפידם טרטראט 12.5 מ"ג
Zolpidem Tartrate 12.5 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול קצר טוח בנדודי שינוי המתחברים בקשן הרדמות /או קושי בשמירה על רצף שינה.

קבוצה רפואייתית: חומרים היפנוטיים ומרגיעים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- חוות אי פעם התנהגות לא מודעת במהלך השינה (כגון נהיגה במכונית, הכנת ואכילת מזון, דיבור בטלפון או קיום יחסי מין בזמן שאין לך חולוטון) אחרי נתילת אמביין סי. אר ("ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה").
- אתה רגש (אלרג) לחומר הפעיל בתרופה (золפידם) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לתרופות המכילות זולפידם. תסמינים של תגובה אלרגית חמורה לзолפידם יכולים לכלול: התנפחות הפנים, השפטים והגרון שיר שעולה לגרום לקושי בנשימה או בבליעה.
- הנך סובל מאין ספיקת כבד חמורה.
- שתית אלכוהול בעבר או לפני השינה.
- אין אפשרות לישון שנתי לילה מלאה אחרי נתילת התרופה (8-7 שעות) לפני שעלייך לחזור להיות פעיל שוב.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין ליטול יותר אמביין סי. אר ממה שנרשם.
- יש ליטול אמביין סי. אר מיד לפני השינה;
- אין להשתמש בתרופה יותר מארבעה שבועות ברציפות; אמביין סי. אר מיועד לשימוש לטוח קצר בלבד. הטיפול באמביין סי. אר צריך להיות קצר ככל האפשר מכיוון שהסתיכון לתלות גדול כל הזמן הטיפול ממושך יותר.
- בדיונה לתקנירים אחרים לשינה, הפסיק טיפול בלתי מבוקרת עלולה להיות מלאה לעתים נדירות בתופעות גmilלה, כגון התכווצויות בגוף ובשרירים, רעד, חזרת נדודי שינה, הקאות, בחילות, הצעה, פרכוסים, הבלבול (דילירום, הבלבול חריף);
- אמביין סי. אר עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל התנהגוויות לא מודעות במהלך השינה. אחריו נתילת אמביין סי. אר אתה עלול לקום מהמיתה כאשר אין לך חולוטין ולעסוק בפעולות שאינן

יודע שאתה עושה. למחרת בבוקר אתה עלול לאזכור שעשית משהו בלילה. פעולות אלו יכולות להתרחש עם אמביין ס. אר בין אם אתה שותה או לא שותה אלכוהול או לוקח תרופות אחרות שגורמות לך להיות ישנוני. חלק מהתנהגויות לא מודעות אלה גורמו לפיצעה חמורה ומוות.

אנשים שלוקחים אמביין ס. אר דיווחו על:

- הליכה מתוך שינה;
- נהיגה במכונית ("נהיגה בשינה") מתוך שינה;
- הכנת ואכילת מזון;
- דיבור בטלפון;
- קיום יחס מיין

יש להפסיק ליטול אמביין ס. אר ולדוח מיד לרופא אם גילית שביצעת אחת מהפעולות המתוירות מעלה לאחר נטילת אמביין ס. אר.

- שמר את אמביין ס. אר במקום בטוח על מנת למנוע שימוש לא נכון לשימוש לרעה. ספר לרופא שלך אם בערך השתמשת לרעה או פיתחת תלוות באלכוהול, תרופות מרשם או סמים; • אם התפתחה תגובה אלרגית חריפה לתרופה המתבטאת כאנגיואדמה [בקצף בלשון, בגלוטיס (פתח הקנה), בלרינקס (בית הקול)], אין להשתמש שנית בתרופה זו;
- כיוון שאמביין ס. אר פוגעת בעורנות, מטופלים, ובעיקר קשישים, נמצאים בסיכון גבוהה יותר לנפילה;
- רצוי מינון מופחת (6.25 מג') בקשישים, בניים ובמטופלים עם בעיות בתפקוד החבד, ראה סעיף 3.
- שימוש באמביין ס. אר יחד עם תרופות אחרות בעלות השפעה מרגיעה (כגון תרופות ממושחת הבנזודיאזפינים, אופיאידים, נוגדי דיכאון מסויימים, אלכוהול), כולל שימוש במהלך היום, מגביר את הסיכון לדיכוי מערכת העצבים המרכזית. אם אמביין ס. אר נלקח יחד עם תרופות אלה, על הרופא המטפל לשקול התאמת מינון של התרופות. אין ליטול אמביין ס. אר יחד עם תרופות בעלות השפעה היפונטיית מרגיעה (כולל תרופות אחרות המכילות זולפידים) לפני שינה או בלילה, אלא אם רופא הרה כר;
- הסיכון של הפרעה פסיקומוטורית בבוקר שלמחרת נטילת אמביין ס. אר, כולל פגיעה ביכולת הנהיגה, עולה אם נוטלים את התרופה לפני השינה ללא אפשרות שינה של 7-8 שעות, אם נוטלים מינון גבוה מהמומולץ על ידי הרופא, אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית או אלכוהול, או אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות שעשוות להעלות רמות זולפידים בדם;
- אין לשותות אלכוהול או ליטול אופיאידים או תרופות אחרות שעשוות לגרום לך לישנוונות או לשחרחות במהלך נטילת אמביין ס. אר בלי להיוועץ ברופא קודם. כאשר אמביין ס. אר ניתלת עם אלכוהול או תרופות אחרות שגורמות לשינויות או לשחרחות, היא עלולה להחמיר מאוד את היישנוונות או השחרחות שלך.

לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של דיכאון, מחלות נפש, או מחשבות או פעולות אובדןיות;
- יש לך היסטוריה של שימוש לרעה או התמכרות לאלכוהול או לסמים;
- יש לך מחלת כליה או מחלת כבד;
- יש לך מחלת ריאות או בעיות נשימה;
- הנrk סובל מודם נשימה בשינה;
- הנrk סובל מחלת שרירים בשם myasthenia gravis;
- הנrk בהירין, מתכונת ההינק (ראי "הירין, הנקה ופוריות").

ילדים ותתבגרים:

הטבילות אינן מומלצות לטיפול בילדים ותתבגרים מתחת לגיל 18 שנים מאוחר ולא הוכחו יעילות ובתייחות בשימוש בגילאים אלה.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופות:

אם אמביין ס. אר ותרופות אחרות עשוות להגיב זו עם זו ולגרום לתופעות לוואי חמורות (ראה סעיף אזהרות מיוחדות הנגעות לשימוש בתרופה). אמביין ס. אר עשוי להשפיע על הדרך שבה תרופות אחרות פועלות, ותרופות אחרות עשוות להשפיע על הדרכם של אמביין ס. אר פועלות.

אם אתה לוקח, אם לך תחתית לאחרונה או אתה מתכוון לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקט. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה:

- לוקח תרופות ממушחת הבנזודיאזפינים;

- לוקח אופיאידים, כיוון שהדבר עשוי להגבר את הסיכון לביעות נשימה (דיכי נשימת);
 - לוקח נוגדי דיכאון טריציקלים;
 - לוקח תרופות אחרות שעשויות לגרום לך לשמנויות או להשפיע על הנשימה שלך (כולל תרופות אחרות המכילות זולפידם);
 - שותה אלכוהול.
 - סרטראליין, פלאוקסטין, פלובוקסמין - נוגדי דיכאון.
 - קלורפרומאזין, הלופרידול - לטיפול במחלות نفس.
 - St. John's wort (היפריקום).
 - ריפאמפין, ציפורפלוקסצין - לטיפול בזיהומיים.
 - קטוקונזול - לטיפול בפטריות.
- ניתן לבקש מהרופא רשימת תרופות שימושיות עם אמביין סי.אר.
- הכר את התרופות שהן נוטל. שמו רשימה של התרופות שלך על מנת להראות לרופא שלך ולרוקח כשאתה מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומדוז

אין ליטול את התרופה עם הארוחה או מיד לאחר ארוחה. אמביין סי.אר עשויה לעזור לך להירדם מהר יותר אם היא נלקחת על קיבת ריקה.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשותות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

הירiox, הנקה ופוריות

אם הנך בהירiox או מתכנתת ההירiox, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. שימוש באמביין סי.אר בשליש השלישי של ההירiox עלול לגרום לך לעובה. ספרי לרופא שלך אם נכנסת להירiox או אם אתה מתכונת להירiox במהלך הטיפול עם אמביין סי.אר.

בתינוקות שנולדים לנשים שנוטלות אמביין סי.אר במהלך השלישי של ההירiox עלולים להתפתח תסמנינים של בעיות נשימה וטשטוש (כגון ישמניות או מתח שריר נמור). אם הנך מניקה או מתכנתת להניק, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. אמביין סי.אר עבר לחלב האם שלך. היוועץ ברופא לגבי הדרכ המיטבית להזין את תינוקך במהלך השימוש שלך באמביין סי.אר.

היגיה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה עלול לפגום בעורנות ועל-כן מחיב זהירות בהנήga ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות.

אין לנוהג, להפעיל מכונות או לבצע פעולות מסוכנות אחרות עד שאתה יודע איך אמביין סי.אר משפייע עליו. התרופה עלולה להשפיע על כושר הריכוז שלך ביום שלמחרת גם אם אתה מרגש ערני לגמרי.

הסיכון של הפרעה פסיקומוטורית, כולל פגיעה ביכולת הנήga, עללה אם נוטלים את התרופה לפני השינה ללא אפשרות שינה במשך 7-8 שעות, אם נוטלים מינון גובה מהמומלץ על ידי הרופא, אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית או אלכוהול, או אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות שעשוות להעלות את רמות הזולפידם בدم.

מי שנוהג ברכבומי שמשפע על מכונות צריך לדעת שכמו עם תרופות היפנוטיות אחרות (תרופות לשינה), עלול להיות סיכון אפשרי לתופעות לוואי הכוללות נמנום, זמן תגובה מוארך, סחרחות, ישמניות, ראייה מטופשת/כפולה, ערונות מופחתת ונוהga לקויה בוקר לאחר הטיפול. על מנת להפחית את הסיכון מומלצת שינה של לילה שלם (8-7 שעות).

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה **לקטווז**. היוועץ ברופאך לפני תחילת השימוש בתרופה אם הנך סובל מיי סבירות לסתורים מסוימים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בוגע למים ואופן הטיפול בתכשיר.
המים ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המים המקביל בדרך כלל הוא:
במידת הצורך, יש ליטול טבילה אחת בלבד של אמביין סי.אר בלבד, מיד לפני השינה.

המים הרגיל המתחלתי המקביל בדרך כלל הוא: נשים - טבילה של 6.25 מ"ג. לגברים - 6.25-12.5 מ"ג.
בקשיים ובמטופלים עם בעיות בתפקוד הכלבי, המים הינו טבילה של 6.25 מ"ג, פעם אחת בלבד בלילה, מיד לפני השינה. אין להשתמש אם מאובחתן אי ספיקת כבד חמורה.
אין לעבור על מים של 12.5 מ"ג פעמי יום, מיד לפני השינה.
יש לוודא שתוכל לישון לפחות 7-8 שעות לאחר נטילת התרופה.

אין לעبور על המנה המומלצת.

אל תיטול אמביין סי.אר אם שתית אלכוהול באותו ערב או לפני השינה.
אין ליטול אמביין סי.אר עם הארוחה או מיד אחריה. אמביין סי.אר יכול לעזור לך להירדם מהר יותר אם תיטול אותו על קיבת ריקה.

marsh הטיפול:

אמביין סי.אר מיועד לשימוש לטוחן קצר בלבד. הטיפול באמביין סי.אר צריך להיות קצר ככל האפשר מכיוון שהטיסיכון לתלות גdal ככל שזמן הטיפול ממושך יותר.
marsh הטיפול הרגיל בתרופה הוא יומיים עד ארבעה שבועות.

בחלק מהמטופלים, הרמות הגבוזות יותר של התרופה בדם בזקן, לאחר לקיחה של 12.5 מ"ג לפני השינה,
מגבירות את הסיכון לפגיעה בעורנות, ביכולת הנהיגה וביכולת להתרכחן.
פנה לרופא שלך אם מצב נדודי השינה שלך מחמיר או לא משתפר תוך 10-7 ימים. זה עשוי להעיד על כך שקיים מצב רפואי אחר שאורם בעיות השינה שלך.
התבליעות אין מיועדות לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

צורת הנטילה

יש לבולע את הטבילה בשלמותה. אין למלעס, לחצוט או לרסק את הטבילה. הטבילה מורכבת משתי שכבות, המשחררות את החומר הפעיל באופן אופני מושהה.
אם אין יכול לבולע את הטבילה של אמביין סי.אר בשלמותה, ספר על כך לרופא. יתכן ותצטרכ לך לקבל תרופה אחרת.

אם נטילת בטעות מין גבואה יותר או אם בטעות בלבד מלבד מתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה אחרת.

אם שכחת ליטול את התרופה:

יש ליטול את התרופה מיד לפני השינה רק אם תוכל לישון אחר כך לפחות 8-7 שעות. אם שכחת ליטול את התרופה לפני השינה אין ליטול מנה בזמן אחר כלשהו כי תיכון ותרגייש מנומנים, סחרחר ומובלבל בmarsh היום.
אין ליטול מנה כפולת כפיצו על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיעוץ ברופא.
יש להתميد טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול באמביין סי.אר ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח וגם אז רק באופן הדרגתי.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:

בימים או ימיים שלאחר הפסקת נטילת התרופה יתיכון ויפיעו התגובהות הבאות: בעיות בשינה, בחילה, הסמקה, סחרחרות, בכיכר נשלט, הקאה, התכווצויות בבטן, התקף חרדה, עצבנות וכאב באוזן הקיבת.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באמביין ס'iar עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

אמביין ס'iar עשוי לגרום לתופעות לוואי חמורות, כולל:

- יצאה מהמיתה בזמן שאתה ער למגרי וביצוע פעולות שאינך מודע לביצוען (ראה סעיף "ازהרות מיחוזת הנוגעות לשימוש בתרופה");
- **אמביין ס'iar עשוי לגרום לך לישנויות או לסתחרחות ועשוי להאט את החשיבה והכישורים המוטוריים שלך.** ישנווות ביום שלאחר נטילת התרופה היא נפוצה, אך עשויה להימצא בסיכון יותר לנפילה;
- **תגובהות אלרגיות חמורות.** התס敏ינים כוללים נפיחות של הלשון או הגרון, בעיות נשימה, בחילה והקאה. פנה לקבלת טיפול רפואי דחוף אם מופיעים התנאהות חרורתיות או גארסיבית יותר מהרגל, הבלבול (דילריהם, בלבול חריף), התנאהות מוזרה, אי שקט, היזיות, החמרות דיינן ומחשובות או פעולות אובדן;
- **סיכון להתקאות או החמרת דיכאון.** החמרת דיכאון כולל מחשובות ופעולות אובדן עלולים להתרחש במהלך טיפול עם תרופות כגון אמביין ס'iar. פנה לרופא שלך מיד אם אתה מפתה מחשובות כלשהן על התקאות, מות, או החמרת דיכאון במהלך הטיפול באםביין ס'iar;
- **בעיות נשימה (ראה גם "לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם"):** פנה לרופא שלך או לטיפול רפואי דחוף מיד אם אתה מפתה בעיות נשימה במהלך הטיפול באםביין ס'iar;
- **בעיות במערכת העצבים של הנגרמות ממחלה כבד חמורה (אנגולופטיה כבדית).**
- **תסמיini גמilia.** עשויים להיות לך תסמיini גמilia אם אתה מספיק ליטול אמביין ס'iar בפתאומיות. תסמיini גמilia עשויים להיות חמורים ולכלול התכווצויות בבטן ובשרירים, הקאה, הצעה, רעד, פרכוים ובלבול (דילריהם, בלבול חריף). שוחח עם הרופא שלך על הפסקה הדרגתית של אמביין ס'iar. אל על מנת להימנע מתשמיini גמilia;
- **אי-בוד זיכרון;**
- **חרדה.**

יש לזכור מיד קשר עם הרופא במידה והופעה כל אחת מתופעות הלואן המתוארות מעלה או תופעות לוואי אחרות שמדויגות אותך בזמן השימוש באםביין ס'iar.

תופעות לוואי שכיחות (משמעות על יותר מ- 1/100 מהמטופלים):
כאב ראש, ישנווות, יושב בפה, חולשה, הליכה בלתי יציבה (ataxia), בלבול, נמנום, תחושת ערוף (תחושה שהנקת השפעת סם), אופוריה, נדודי שינה, עייפות, סחרחות, רטיגו, שלשול, בעיות עיכול, שיוחקים, סינוסיטיס, ראייה כפולה, הפרעות בראייה, זיהומים בדרך השני.

תופעות לוואי לא שכיחות (משמעות על בין 1/100 ל- 1/1000 מהמטופלים):
הצעה מגברת, חיוורון, ירידת בלוץ הדם במעבר לעמידה, עילפון, כאבים בחזה, בעקמת, נפילות (הועלות לגורם פגימות חמורות), חום, הרגשה כללית רעה, טראומה, הפרעות בכלי הדם המוחיים, יתר לחץ דם, דופק מהיר, סערת נשף, ירידת בתפקוד המוח, תחושת נתקnak, קשי ריכוך, ליקי'ם בדיבור, חסור יציבות רגשית, היזיות, ירידת בתחושה, אשליות, התכווצויות שרירים ברגליים, מיגרנה, עצבות, נימול, שינה (לאחר נטילת התרופה ביום), הפרעות בדיבור, קרות חושים, רעד, איבוד תיאבן, עצירות, ליקי'ם בבלעה, נפיחות (גזים), דלקת בעורק, במערכת העיכול, זיהום, ליקי'ם בתפקוד הכבד ועליה ברמת האנדרים, צמא, דלקת פרקים, איסידירות במחזור החודשי, דלקת בנוירטיק, ברונכיטיס, שיעול, קשי נשימה, גרד, גירוי בעין, כאב בעין, דלקת בעין, שינוי בטעם, צלצלים באוזניים, דלקת בשלפוחית השתקן, חסור שליטה במثان שtan.

תופעות לוואי נדירות (משמעות על פחות מ- 1/1000 מהמטופלים):
הפרעות בראייה, שינוים ברוק, הסמקה, גלאוקומה, ירידת בלוץ דם, אין אונות, הפרשה מוגברת של רוק, תחושת שוא לצורך לשישית צרכים, תגובה אלרגית, החמרה באלרגיה, שוק אנפילקטטי, בצתת פנים, גל' חום, שקיעת דם מוחשת, כאב, תסמונת الرجل העצבנית, התקשות שרירים, עליה בסביבות לתרופה, ירידת משקל, תעוקת לב, אי סידרות בקצב הלב, דלקת בקצב הלב, בעיות במחזור הדם, פעימת יתר לב, החמרה בלוץ דם גבוה, התקף לב, דלקת ורידים, דיליות, תסחיף ריאתי, בצתת ריאות, טכיקרדייה חרידית, הפרעות בהליכה, מחשובות לא רגילים, תגובה תוקפנית, אדיות, עליה בתיאבן, ירידת בחשך מני, מחשובות שוא, דמנציה (שיטיון), שינוי בתפיסת "העצמי", הפרעות שפה (DISFAZIA), הרגשה מוזרה, הפרעות תונעה, טונוס שרירים נמוך, היסטריה, תחושת שכירות, תגובה מאנית, כאב עצבי, דלקת עצבים, טכיקרדייה חרידית, מחלת מערכת העצבים ההיפופית, הפרעה נוירוטית, התקפות פאניקה, שיתוק חלקי, הפרעות אישיות, סחרוריות (הליכה מתפרקת שינה), ניסיונות התקאות, כיווץ שרירים חמור, דלקת מעיים, פיהוקים, גיאוקים, התכווצות بواسט, דלקת בקיבה, טחרורם, חסימת מעיים, דימום מפני הטבעת, עששת, אנמיה, רמות המוגלובין גבוהות, ירידת בספירת דם לבנה,

בלוטת לימפה מוגדלת, אנמיה מקrozיטית, פריחה בצורת כתמים, פקקת (תרומבוזיס), מורסה (אבץ), הרופ, שלבקת חוגרת, דלקת באזון התיכונה או החיצונית, עליה ברמות בילירובי, עליה באנדמי כבד, שיגדו, רמות גבוהות של כולסטרול או שומנים בדם, הפרעות בתפקודו כליה, בעקבות סבב העיניים, מחלת מפרקים, חולשת שרירים, הקרנת כאב לרגל, דלקת בגיד, גידולים בשדיים, כאבים בשדיים, כיווץ סימפונות, דיכוי נשימת, דימום מהאף, ירידת לחמצין בדם, דלקת גרון, דלקת ריאות, אקנה, פריחה שלפוחיתית, דלקת עורית, פריחה מגולתית, רגשות לאור, אורתיקרייה, דלקת הלחמתית, כיב בקרנית העין, הפרעות בהפרשת הדמעות, הפרעה בזיהוי ריחות, הבזקי אור, כשל קליתי חמור, כאב או תכיפות בהטלה שנית, השנתנת לילה, עליה בכמות השתן, דלקת כליות, כאבי כליות, אכזרת שtan.

תופעות לוואי בשכיחות בלתי ידועה:
פגיעה חמורה בכבד עם או ללא צהבת, דלירים (בלבול חריף).

תופעות לוואי בהפסקת נטילת התרופה - ראה פירוט בסעיף 3.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת, או נמשכת יותר ממספר ימים או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלוון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Ambien CR 6.25 mg: lactose monohydrate 138.913 mg, microcrystalline cellulose, hypromellose, potassium hydrogen tartrate, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate, titanium dioxide, Macrogol 3350, colloidal anhydrous silica, red iron oxide.

Ambien CR 12.5 mg: lactose monohydrate 138.913 mg, microcrystalline cellulose, hypromellose, potassium hydrogen tartrate, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate, titanium dioxide, Macrogol 3350, indigotine (E132)-aluminium lake, colloidal anhydrous silica, yellow iron oxide.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

אמביין סי.אר 6.25 מ"ג טבליות בשחרור מושהה - טבליות עגולות בצעב ורוד.
אמביין סי.אר 12.5 מ"ג טבליות בשחרור מושהה - טבליות עגולות בצעב כחול.

ק"ימות אריזות של 14 או 28 טבליות אריזה. יתכן שלא כל גדל האrizה משווים.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלת כלשהי או אם אין לך בוטח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

בעל הרישום והיבואן וכותבו: סאנופי ישראל בע"מ, מתחם גרינורק, ת.ד. 47, יקום.

נערך באפריל 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

Ambien CR 6.25 mg: 1420531833

Ambien CR 12.5 mg: 1420631834

לשם הפשטות ולהקלת הקיריה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.