

ستريدين غير قابل للامتصاص، أفراس ليمون ستريدين برقتال خيول، السكر، أفراس

تركيبة المادة الفعالة ومكوناتها كالتالي:

فلازيبيروفين 8.75 ملل بـ 85 صمغ

Flurbiprofen 8.75 ملل بـ 85 صمغ

الوزن الكلي بعد العتاقلة: قطر القلعة في بند 6. نظر أيضاً للبناء "معلومات مهمة حول جزء من

مركبات الدواء"

أفراس التندرة يمانع حتى نهائياً قبل أن تستعمل الدواء. تحذوي هذه النشرة على معلومات

الخاصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

الأفراد المخصصين للبالغين والأطفال فوق 12 سنة. تحت هذا الجدل يجب التوجّه للطبيب.

عليك استعماله بشكل الصحيح. ابتشر الصيدلي إذا كانت بحاجة لتعليمات إضافية حول التوجّه

إلى الطبيب في حال تدهورت علامات المرض (الأعراض) أو أنها لا تتحسن بعد 3 إلى 7

أي. **غري: عرض الشخص المصاب**

1. يفرز شخص مصاب بالتهاب قصير الأمد لأعراض الالم الحلق مثل حران في الحلق والفتاح في

الحلق لدى الأطفال والأطفال فوق 12 سنة.

2. **التهاب اللوزجة:** عدالة الفعالة في فلو زيبيروفين. التي تشتمل لمجموعة من مستضادات

التهاب كبر ستريونيد (NSAIDs). يؤدي هذه المجموعة من المواد إلى تخفيف بوسامة تغيير

في رد فعل الجسم للألم، الانتفاخ والسخونة المرتفعة.

2. **في حال استعمال الدواء**

لا يجوز استعمال المستعمل اللوزجاء:

- 0 كنت حساساً (أرجح) للتأثير بربروفين أو أحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر بند 6).
- 0 كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قرحة هضمية معادة (حشيش أو أكثر من قرحة هضمية مثبته) أو زريف في الجهاز الهضمي.
- 0 عانيت في الماضي من جروح حساسية (مثل: ريو، تشنج العضلات، التهاب الأذن
- 0 عانيت من زريف أو التهاب في العيون، التهاب الحنجمة، التهاب فون زخم (التهاب في الأذنان) أو زريف أثناء تناول NSAIDs أخرى.
- 0 كنت تتناول NSAIDs أخرى (مثل سيليكوكيب، إيبروفين، كوفليكاس صروديم وما شابه ذلك) أو السبيرين جبرج زريف عن 75 ملغ في يوم.
- 0 كنت تعاني من فشل وديجي في القلب، فشل كل كديم أو فشل كلوي رخي.
- 0 أنت في حالة الأخر من 12 سنة.
- 0 كنت تحت علاج من 12 سنة.

0 **تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:**

قبل العلاج بربروفين، يجب استشارة الطبيب أولاً:

- 0 كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الربو أو كنت تعاني من حساسيات.
- 0 كنت تعاني من التهاب اللوزجاء أو كنت تعاني من التهاب جرومومي (بكتيريا) في الحلق (الذي يمكن علاجه بوسامة هضمية حتى في حالة التهاب في الكلية، أو في القلب، أو في الكبد).
- 0 كنت تعاني من مشاكل في الكلية، في القلب، أو في الكبد.
- 0 مرتبطة بشفة هضمية.
- 0 عانيت في الماضي من أمراض في الجهاز الهضمي مثل التهاب اللوزجاء اللوزجاء الحرقشي (ulcerative colitis)، مرض كرون.
- 0 كنت تعاني من مرض مناعي ذاتي مزمن (مثل التهاب خضامية متجمعة أو داء النسيج الضام المتعدد).
- 0 كنت فوق 65 لك أو كنت تعاني من احتمال أعلى لمعالجة الأعراض الجانبية التي تظهر في هذه النشرة.
- 0 كنت في الأشهر السنة الأولى من الحمل أو مرضعة.
- 0 إذا كنت تتناول أو إذا كنت في الأشهر الأخيرة: أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة
- 0 طبي وصفات أخرى: أفراس الطبيب أو الصيدلي. ينالك على الحضور بحسب إمداد الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ:
- 0 جرعة منخفضة من السبيرين (حتى جرعة 75 ملغ في اليوم).
- 0 أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع أو لوزية لملح قلب (أدوية ضد ضغط الدم الزائد
- 0 كإيكلوزيتات).
- 0 أدوية تنزلة (مثل أدوية من مجموعة الـ فورفات اللوزجاء).

أدوية لتبييض الدم (مضادات التخثر أو مضادات الصفائح).

أدوية للفرس (بروبينيدول، ستروبيدين، سيبروفين، سيبروفين).

مضادات التهاب غير ستريونيدية (NSAIDs) أخرى، أو كورتيكوستيروئيدات مثل: ميلوكسيكام، إيبروفين، كوفليكاس صروديم و بربروفين.

ميثيلستيرون (أدوية إيقاظ الحمل).

مضادات حيوية من مجموعة التتراسيكلين (مثل سفروكساسدين).

أدوية لتنشيط جهاز المناعة (مثل ميكلوسبورين، ميثال فلويدوس).

ميتوزينين (علاج الصرع).

ميثوزريكسات (علاج أمراض مناعة ذاتية أو سرطان).

ليثيوم أو أدوية من عائلة ميثيلات استروئيد الستيروئيدية (SSRIs) (علاج الاكتئاب).

أدوية ضد السكري التي تؤخذ عن طريق الفم (علاج السكري).

زيفودينين (علاج الإيدز).

0 **استعمال الدواء واستهلاك الكحول**

يجب الامتناع عن استهلاك الكحول خلال العلاج بحسب حيث أن الكحول يزيد من الاخطار

لزيف في المعدة أو في الأمعاء.

0 **الحمل والأرضاع**

لا يجوز تناول الدواء أثناء أشهر الحمل الثلاثة الأخيرة.

استشر الطبيب بخصوص استعمال ستريونيد أثناء أشهر الحمل الستة الأولى أو إذا كنت

مرضعة. ينبغي تجنب إرضاع لمجموعه لوزجاء في تسبب انخفاض موق في الحساسية إلى

النساء، هذا العرض قبل الكمن عند التوقف عن تناول الدواء. من غير المرجح أن الدواء الذي

يؤخذ عن طريق الفم، يورث على الرضع في حاله بلع الرغ من ثلك. أخري الطبيب قبل

تناول الدواء إذا كان يعرف بوجود مشاكل في الإدخال في الحبل.

0 **السيفلة واستعمال الآلات**

لا يجوز لخصن تأثير الدواء في الفترة على السيفلة واستعمال الآلات بالرغم من ذلك نودخة

وأصطبار الأريفة من أعراض جانبية محتملة. استعمال أدوية من عائلة مضادات التهاب غير

ستريونيدية (NSAIDs). إذا كنت تشرب بهذه الأعراض، تجنب السيفلة واستعمال الآلات.

0 **معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء**

ستريدين غير قابل للامتصاص:

كل قرص للمصن يحتوي على 1069 ملغ جلوكوز سائل، 1047 ملغ سوربوز سائل.

يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار في علاج مرضى السكري. لا ينبغي أخذ تلك تعدي من عدم

معد السكريات معينة، يجب تجنب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بربروفين.

يحتوي على ميتونين مغطى بمغلفة خاصة (تساق الفم) الموجود في الجلوكوز

السائل. يعتبر المتحضر "حساس من الجلوتين" ومن غير المحتمل أن يسبب المتحضر

أي مشاكل لمرضى الاضطراب البطني (ميدان).

لا يحتوي على صمغ الصمغ الراد على أكثر من 21.32 ميكروغرام من الجلوتين. لا تأخذ

المليون (0-1%) والذي من شأنه أن يسبب رد فعل جلدي موضعي (مثل التهاب الجلد -

ديرماتيتيس) أو تهييج المخاط الأغشائية الموضعي (مثل التهاب الجلد -

ستريدين غير قابل للامتصاص).

0 **ستريدين غير قابل للامتصاص:**

يحتوي على إيزرامك 329.29 ملل بـ 85 صمغ بالإضافة إلى الميتونين سائل 509.31

ملغ/صمغ. لمرض الحساسية يمكن أن يكون أكثر من 203 ملغ من تساق تساق. قيمة السرعة الحرارية

الميتونين أو إيزرامك: 2.3 كيلو سرعات حرارية/غرام.

إذا قبل لك بياك تعدي من عدم تحمل السكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل بدء

العلاج بربروفين.

يحتوي على مركب كيميائي مشتمل على Farnesol, d-Limonene, Citronell, Citral

المليون (0-1%) والذي من شأنه أن يسبب رد فعل جلدي موضعي (مثل التهاب الجلد -

ديرماتيتيس) أو تهييج المخاط الأغشائية الموضعي (مثل التهاب الجلد -

ستريدين غير قابل للامتصاص).

0 **علاج ضغط الدم:**

عليك أن تتفحص عن الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

0 **أقراس للمصن خلال فترة 24 ساعة:**

لا يجوز تجاوز الأريفة الوصية بها.

0 **هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال تحت 12 سنة:**

هذا الدواء المخصص للاستخدام للأطفال لا يمكن استخدامه للأطفال تحت 12 سنة.

الاستعمال لمدة الفترة القصيرة المطلوبة لتخفيف الأعراض. إذا كنت تشرب بتعليق في تخفيف

الغم يجب التوقف عن استعمال الدواء.

0 **لا يجوز تناول هذا الدواء أثناء فترة 3 أيام أو 3 أيام أو 3 أيام من الطبيب:**

إذا لم يطرأ تحسن على وضعت خلال 3 أيام أو إذا طرأ تدهور في حالتك، أو إذا كنت تعاني من

أعراض جانبية يجب التوجّه إلى الطبيب.

0 **إذا أوقفت عن طريق الخطأ في تناول الجرعة:** لا تشرب نديان أو غثان.

إذا أوقفت في تناول الجرعة أو إذا لم يطرأ عن طريق الخطأ، توجّه فوراً إلى الطبيب

أو إلى غرفة الطوارئ أو المستشفى واستشر الطبيب أو الصيدلي. حتى لو كنت تشرب على ما يرام.

0 **إذا تأخيت تناول هذا الدواء في وقت لاحق:** لا يجوز تناول جرعة مضاعفة، إذا الجرعة

التالية في الوقت المعتاد، ولا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

0 **إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء:** استشر الطبيب أو الصيدلي.

0 **4. الاحتياطات الجانبية:**

كما في كل قرص، قد يسبب استعمال ستريدين أعراضاً جانبية لدى جزء من المستعملين. لا تفرح

عن فرحة تناول الدواء الجانبية من الممكن أن لا تصاب بأي واحد منها.

0 **تأثير التوقف فوراً عن تناول الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:**

0 **ظهور علامات رد فعل تحسسي:** خديم مثل ريو، صفيح غير مر أو ضيق تنفس، حكة

رطخ رطخ في الجلد وما شابه ذلك.

0 **انتفاخ في الوجه، في الأطراف أو في اللسان:** في صفيح صغوية في التنفس، نبض قلب

سريع، وانخفاض في ضغط الدم الذي يؤدي لصدمة (قد تحدث هذه الحالة حتى عند

الاستعمال للأدوية).

0 **ردود فعل جلدية خطيرة مثل تشنج الجلد أو ظهور حويصلات على سطح الجلد:**

0 **يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:**

0 **أعراض جانبية شديدة (قد تؤثر على 1 من كل 10 مستخدم):**

- 0 نوار أو دمان
- 0 تهييج الحلق
- 0 تفرحات في الغم أو ألم في الغم
- 0 ألم حلق
- 0 مدمرحة أو شعور غريب في الغم (مثل شعور بنفء، حران، مثل خدران).
- 0 شابه ذلك
- 0 غثان وإسهال
- 0 احساس بنفخ وحكة في الجلد
- 0 أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على 1 من كل 100 مستخدم):
- 0 نوار
- 0 حويصلات في الغم أو الحلق، قبة شعور في الحلق، انتفاخ في البطن، ألم في البطن، غزات، إسهال، صعوبات في التهييج.
- 0 حذاني في الغم
- 0 شعور بحرارة في حاسة الذوق
- 0 طفح جلدي، حكة في الجلد
- 0 سخونة ألم
- 0 شعور بالغماس أو صعوبات في الحذر للوزم
- 0 تدهور الربو، صفيح تنفس
- 0 انخفاض للشعور في الحلق
- 0 أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على 1 من كل 1000 مستخدم):
- 0 تقلص تشنجي (رد فعل تحسسي صعب ومهدد للحياة الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
- 0 واضعظاد منخفض لدرجة خطيرة).
- 0 أعراض جانبية يورث عن معروف (لا يمكن تحديد نوعها من المعلومات المتوفرة):
- 0 فقر دم طة الشصيات (تعداد منخفض للصفائح في الدم الذي قد يزيد من الاخطار
- 0 لكدمات وإندثار)
- 0 انتفاخ (إدمة): ضغط دم مرتفع مثل قلب أو رئو قلبية
- 0 ردود فعل جلدية وخديمة مثل تساق تساق، تساق تساق، تساق تساق، تساق تساق
- 0 جرسون، متلازمة آلل وشكل أكثر شيوعاً الذي يسبب تحنر الجلد بنسب من 30% من
- 0 مساحة الجسم (تفتقر الأنسجة المتوترة البشريّة التسمي).
- 0 التهاب كبد (هيباتيس).
- 0 إذا ظهر عرض جانبي، أو أصبح أحد الأعراض الجانبية وخبيلاً، أو إذا كنت تعاني من عرض

جانبى لم يُذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية في أعقاب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- 0 تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- 0 لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المُلصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.
- 0 لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- 0 خزن تحت آل- 25 درجة مئوية، بالعبوة الأصلية.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:
ستريفين عسل ليمون:

Liquid Sucrose, Liquid Glucose, Honey, Macrogol 300, Lemon Flavour, Potassium Hydroxide, Levomenthol.

ستريفين برتقال خالي من السكر:

Macrogol 300 (Polyethylene glycol 300), Potassium hydroxide, Orange Flavor PHL-010300, Levomenthol, Acesulfame K, Liquid Maltitol, Isomalt.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص للمصّ ستريفين عسل ليمون هي دائرية، ذات لون مائل للأصفر حتى بني فاتح، مع علامة مطبوعة على جانبي القرص للمصّ.
الأقراص للمصّ معبأة ك- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 أو 24 قرصًا للمص في العبوة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوّقة.
أقراص للمصّ ستريفين برتقال خالي من السكر هي دائرية، ذات لون أبيض حتى أصفر فاتح،

مع علامة مطبوعة على جانبي القرص للمصّ.

الأقراص للمصّ معبأة ك- 16, 24 أو 36 قرصًا في العبوة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوّقة.

المنتج و عنوانه:

ريكيت بنكيزر هلنكير انترناشونال م.ض. نوتنغهام، إنجلترا.

صاحب التسجيل و عنوانه: ريكيت بنكيزر (نير ايست) م.ض. هنجار 6، هود هشارون، إسرائيل 4527704.

تم تحريرها في كانون الأول 2022 وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ستريفين عسل ليمون 00-31684-77-147

ستريفين برتقال خالي من السكر 00-34072-42-153

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.