تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- **قبل أن تأخذ نوروفن للأطفال أخبر الطبيب إذا:**
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق من **ارتفاع ضغط الدم, مشاكل قلبية أو جلطة دماغية**, لأنه هنالك ارتفاع طفيف في الخطورة لحدوث مشاكل في القلب عند استعمال إيبيبروفين.
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من عامل خطورة **لمشاكل قلبية, مثل السكري أو نسب كوليسترول مرتفعة.**
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من الربو أو من أي **مرض تحسسي في الرئتين.**
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق من **مشاكل في الكبد, الكلى, القلب أو الأمعاء.**
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من جفاف, لأنه هنالك خطورة لحدوث مشاكل في الكلى.
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من **الذئبة الحُمَامِيَّة المَجْمُوعِيَّة** (SLE- مرض متعلق بالمناعة الذاتية) أو من مرض مشابه آخر.
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من **مرض التهابي مزمن في الأمعاء** مثل داء كرون أو التهاب تقرحي في الأمعاء الغليظة (التهاب القولون التقرحي).
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من مشكلة وراثية بالتعامل مع الفروكتوز/سكر الفواكه (عدم تحمل وراثي للفروكتوز), لأن الجسم يستطيع أن ينتج القليل من الفركتوز من المركب مالتيتول.
- يوصى بتجنب استعمال الدواء خلال الفترة الزمنية التي يتواجد فيها الحُماق جدري (Varicella).
- هناك ثلوث لدى المتعالج حيث أن هذا الدواء قد يخفي علامات ثلوث مثل حمى وألم لذلك, قد يأخر هذا الدواء العلاج الملائم للثلوث, هذا قد يؤدي لخطر زائد لحدوث مضاعفات, شوهد هذا في التهاب الرئتين الناجم عن جراثيم وثلوثات جلد جرثومية المُتعَلِّقة بالحماق. إذا كنت تتناول هذا الدواء بينما لديك ثلوث وتستمر علامات الثلوث لديك أو تتفاقم, استشر الطبيب دون تأخير.

ردود فعل جلدية - تم الإبلاغ عن ردود فعل جلدية وخيمة فيما يتعلق بالعلاج بهذا الدواء. يجب عليك إيقاف تناول/إعطاء الدواء والتوجه فوراً لتلقي علاج طبي, إذا كنت تطور لديك أو لدى طفلك طفحاً في الجلد, آفات في الأغشية المخاطية, بثرات أو علامات أخرى للحساسية حيث يمكن أن تكون هذه العلامة الأولى على رد فعل جلدي وخيم جداً. أنظر للبند 4.

تحذيرات إضافية

التحذيرات التالية تتطرق بالأخص للكبار. على كل حال, قم بأخذها بعين الاعتبار قبل إعطاء أو تناول هذا الدواء:

- للأدوية مثل نوروفن قد تكون هنالك علاقة مع ارتفاع طفيف بخطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو جلطة دماغية. احتمالية أيّة خطورة تُرتفع مع تناول مقادير دوائية مرتفعة ومع العلاج المتواصل. لا يجوز تخطي المقدار الدوائي أو فترة العلاج الموصى بهما.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب, تعرضت لجلطة دماغية أو كنت تعتقد أنك عرضة لخطر حدوث هذه الحالات (مثلاً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم, من السكري أو من ارتفاع نسب الكوليسترول, أو إذا كنت مدخن), عليك التحدث مع الطبيب أو الصيدلي بما يتعلق بالعلاج.
- إذا كنت مسناً استشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يجب أن تُخبر الطبيب فوراً إذا:

- **لم تختفِ الأعراض لدى طفلك بشكل سريع أو إذا تفاقمت.**
- **لم تكن واثقاً بشأن مرض طفلك أو أن المرض مصحوب بطفح, صعوبات في التنفس, إسهال أو إرهاق زائد.**

تفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان, أو إذا تناولتما مؤخراً, أدوية أخرى بما فيه أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان:

- **أدوية أخرى التي تحتوي على إيبيبروفين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية**, يشمل تلك التي يمكنك الحصول عليها بدون وصفة طبيب.
- **أسبيرين بمقدار دوائي منخفض** (حتى 75 ملغ لليوم)
- **مدرّات البول** (تساعد في التبول)
- **مضادات التخثر** (أدوية مسيّلة للدم مثل وارفارين)
- **أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم** (مثل كابتوبريل, إينتولول, لوسارتان)
- **ليثيوم** (لاضطرابات المزاج)
- **ميتوتريكسات** (للصدفية, التهاب المفاصل أو انواع من السرطان)
- **زيدوفُدين** (لـ HIV, فيروس نقص المناعة البشري)
- **كورتيكوستيروئيدات** (دواء مضاد للالتهاب)
- **جليكوزيدات القلب** (لمشاكل القلب)
- **سيكلوسبورين أو تاكروليموس** (لمنع رفض الأعضاء بعد زرعها)
- **ميفيبريستون** (لإنهاء الحمل)
- **مضادات غير مضادة من مجموعة الكوينولونات** (للثلوثات)
- **أدوية مضادة للاكتئاب من مجموعة SSRI**
- **أدوية مضادة لتصنع الدم** مثل دبيبريداموِل, كلوبيدوجريل

إذا لم تكن واثقاً أيّة أصناف من الأدوية يتناول طفلك, أظهر الدواء للطبيب أو الصيدلي.

استعمال الدواء والطعام

لدى المتعالجين ذوي معدة حساسة, يمكن استعمال الدواء مع أو بعد الوجبة.

الحمل, الإرضاع والخصوبة:

الحمل:

لهذا المستحضر هناك عرض جانبي محتمل لضرر كلوي في الجنين وقلة السائل السلوي بدءاً من الأسبوع 20 للحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال مستحضرات من فصيلة ال - NSAIDs بدءاً من الأسبوع 20 للحمل وإستشارة عضو طاقم طبي عند الحاجة. يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء خلال الـ 3 شهور الأولى للحمل.

لا يجوز استعمال نوروفن للأطفال إذا كنت في الـ 3 شهور الأخيرة للحمل.

الإرضاع: في بحوث عدة, وجدت تركيزات منخفضة جداً من إيبيبروفين في حليب الأم. لكن ليس محتملاً أن يكون لهذه الكميات تأثير على الرضيع.

الخصوبية: يتسبب إيبيبروفين لضعيلة الأدوية التي قد تضر بالخصوبة لدى النساء. هذا الأمر منعكسًا مع التوقف عن استعمال الدواء. ليس من المحتمل أن يؤثر استعمال هذا الدواء من حين لآخر على احتماليات حصول الحمل لديك, مع ذلك, أخبري طبيبك قبل استعمال الدواء إذا كنت تعانين من صعوبات في الدخول في الحمل.

السيقة والسوائل المكانات: من غير المتوقع وجود تأثير على القدرة على السيقة واستعمال الماكنات بالمقادير الدوائية وبقرة العلاج الموصى بهما.

معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على مالتيتول. إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- يحتمل أن يسبب مالتيتول إسهالاً خفيفًا. قيمة السعرات الحرارية لمالتيتول: 2.3 كيلو سعرات حرارية/غرام.
- كل 5 ملل تحتوي على 9.08 ملغ صوديوم.

3. كيفية استعمال الدواء

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بشأن المقدار الدوائي وطريقة العلاج.

بالمستحضر. المقدار الدوائي الاعتيادي 5-10 ملغ للكغم كل 6 حتى 8 ساعات حتى وبفوارق زمنية ذات 4 ساعات على الأقل. يجوز تجاوز الجرعة الدوائية 04 ملغ للكغم القصوى فوق جبل 12 سنةً هي 1200 ملغ بشكل عام هو: حد أقصى 4 مرات في اليوم بين الجرعة والجرعة, لا في اليوم. الجرعة الدوائية لليوم.

جدول المقادير الدوائية وفقًا للوزن

وزن (كغم)	مقدار دوائي وفقًا لـ ملل لاستعمال محقنة قياس	عدد المرات خلال 24 ساعة
دون 5 كلغ	وفقًا لوصفة طبيب	
5-5.4	2 ملل	3-4
5.5-8.1	2.5 ملل	3-4
8.2-10.9	3.75 ملل	3-4
11-15	5 ملل	3-4
16-21	7.5 ملل	3-4
22-26	10 ملل	3-4
27-32	12.5 ملل	3-4
33-43	15 ملل	3-4

جدول مقادير دوائية وفقًا للعمر

العمر (أعوام)	مقدار دوائي وفقًا لـ ملل لاستعمال محقنة قياس	عدد المرات خلال 24 ساعة
3-6 شهور	وفقًا لوصفة طبيب	
6-11 شهور	2.5 ملل	3-4
12-23 شهر	3.75 ملل	3-4
2-3	5 ملل	3-4
4-5	7.5 ملل	3-4
6-8	10 ملل	3-4
9-10	12.5 ملل	3-4
11-12	15 ملل	3-4

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

الاستعمال دون عمر 6 شهور هو وفقًا لوصفة طبيب فقط.

فوق عمر 6 شهور - يُسوّق الدواء بدون وصفة طبيب.

نوروفن للأطفال توت 20 ملغ/1 ملل, معلّق

المادة الفعّالة وتركيزها: يحتوي كل 1 ملل على: إيبيبروفين (Ibuprofen) 20 ملغ

لقائمة المواد الغير فعّالة, أنظر من فصلك البند 6. أنظر أيضًا البند "معلومات هامة عن جزء من مركّبات الدواء".

إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك استعمال المستحضر وفقًا للتعليمات في بند المقدار الدوائي في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب, في حال تفاقم أعراض المرض أو عدم تحسنها بعد مرور 24 ساعة لدى الرضّع بعمر 3-6 شهور أو بعد مرور 3 أيام لدى الأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق.

هذا الدواء يلائم معظم الرضّع ما فوق عمر 3 شهور, والأطفال والمراهقين. الاستعمال لدى الرضّع بأعمار 3-6 شهور هو وفقًا لوصفة طبيب.

يجب التوجه للطبيب إذا كان طفلك يتناول الأسبيرين بمقدار دوائي فوق 75 ملغ في اليوم أو إذا تطوّر لدى طفلك طفح صعوبات في التنفس, إسهال أو إرهاق زائد.

1. لأي غرض يخصص الدواء؟

لخفض السخونة وتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة, لدى الرضّع والأطفال من عمر 3 شهور وحتى 12 سنة (الذين يزنون 40 كغم تقريبًا).

الفصيلة العلاجية: مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (NSAIDs).

2. قبل استعمال الدواء

يلائم هذا الدواء معظم الأشخاص لكن على أشخاص معينين الامتناع عن استعماله. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن واثقًا.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا أو كان طفلك حساسًا (ألِيرجي) لـ إيبيبروفين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر البند 6).
- كان لديك أو لدى طفلك ردود فعل تحسسية (مثل ربو, التهاب الأنف (Rhinitis), انتفاخات تحت جلدية (وذمة وعائية) أو شرى (urticaria)) نتيجة تناول إيبيبروفين, حمض الأسيتِيْل سالِيسيلِيك (أسبيرين) أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية (NSAIDs).
- كان لديك أو لدى طفلك أو سبق وكان لديك أو لدى طفلك قرحة/نزيف في المعدة (حدثان واضحان أو أكثر لتنقّب أو نزيف بارزين).
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من نزيف أو تثقّب في الجهاز الهضمي واللذان يتعلقان بعلاج سابق بأدوية مضادة للالتهاب لا ستيروئيدية (NSAIDs).
- كنت تعاني أو كان طفلك يعاني من قصور حاد في الكبد, في الكلى أو في القلب.
- كنت في الثلاثة شهور الأخيرة للحمل.

- **أدوية مضادة لتصنع الدم** مثل دبيبريداموِل, كلوبيدوجريل

إذا لم تكن واثقاً أيّة أصناف من الأدوية يتناول طفلك, أظهر الدواء للطبيب أو الصيدلي.

استعمال الدواء والطعام

لدى المتعالجين ذوي معدة حساسة, يمكن استعمال الدواء مع أو بعد الوجبة.

الحمل, الإرضاع والخصوبة:

الحمل:

لهذا المستحضر هناك عرض جانبي محتمل لضرر كلوي في الجنين وقلة السائل السلوي بدءاً من الأسبوع 20 للحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال مستحضرات من فصيلة ال - NSAIDs بدءاً من الأسبوع 20 للحمل وإستشارة عضو طاقم طبي عند الحاجة. يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء خلال الـ 3 شهور الأولى للحمل.

لا يجوز استعمال نوروفن للأطفال إذا كنت في الـ 3 شهور الأخيرة للحمل.

الإرضاع: في بحوث عدة, وجدت تركيزات منخفضة جداً من إيبيبروفين في حليب الأم. لكن ليس محتملاً أن يكون لهذه الكميات تأثير على الرضيع.

الخصوبية: يتسبب إيبيبروفين لضعيلة الأدوية التي قد تضر بالخصوبة لدى النساء. هذا الأمر منعكسًا مع التوقف عن استعمال الدواء. ليس من المحتمل أن يؤثر استعمال هذا الدواء من حين لآخر على احتماليات حصول الحمل لديك, مع ذلك, أخبري طبيبك قبل استعمال الدواء إذا كنت تعانين من صعوبات في الدخول في الحمل.

السيقة والسوائل المكانات: من غير المتوقع وجود تأثير على القدرة على السيقة واستعمال الماكنات بالمقادير الدوائية وبقرة العلاج الموصى بهما.

معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على مالتيتول. إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- يحتمل أن يسبب مالتيتول إسهالاً خفيفًا. قيمة السعرات الحرارية لمالتيتول: 2.3 كيلو سعرات حرارية/غرام.
- كل 5 ملل تحتوي على 9.08 ملغ صوديوم.

3. كيفية استعمال الدواء

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بشأن المقدار الدوائي وطريقة العلاج.

بالمستحضر. المقدار الدوائي الاعتيادي 5-10 ملغ للكغم كل 6 حتى 8 ساعات حتى وبفوارق زمنية ذات 4 ساعات على الأقل. يجوز تجاوز الجرعة الدوائية 04 ملغ للكغم القصوى فوق جبل 12 سنةً هي 1200 ملغ بشكل عام هو: حد أقصى 4 مرات في اليوم بين الجرعة والجرعة, لا في اليوم. الجرعة الدوائية لليوم.

جدول المقادير الدوائية وفقًا للوزن

وزن (كغم)	مقدار دوائي وفقًا لـ ملل لاستعمال محقنة قياس	عدد المرات خلال 24 ساعة
دون 5 كلغ	وفقًا لوصفة طبيب	
5-5.4	2 ملل	3-4
5.5-8.1	2.5 ملل	3-4
8.2-10.9	3.75 ملل	3-4
11-15	5 ملل	3-4
16-21	7.5 ملل	3-4
22-26	10 ملل	3-4
27-32	12.5 ملل	3-4
33-43	15 ملل	3-4

جدول مقادير دوائية وفقًا للعمر

العمر (أعوام)	مقدار دوائي وفقًا لـ ملل لاستعمال محقنة قياس	عدد المرات خلال 24 ساعة
3-6 شهور	وفقًا لوصفة طبيب	
6-11 شهور	2.5 ملل	3-4
12-23 شهر	3.75 ملل	3-4
2-3	5 ملل	3-4
4-5	7.5 ملل	3-4
6-8	10 ملل	3-4
9-10	12.5 ملل	3-4
11-12	15 ملل	3-4

لذلك يجب الالتزام بالنسبة لوزن الطفل وتحديد مقدار دوائي وفقًا لجدول الأوزان. فقط في حال عدم امكانية الاستفسار بشأن وزن الطفل يمكن تحديد المقدار الدوائي حسب هذا الجدول.

لا يجوز اعطاء الأطفال دون عمر 3 شهور.

الاستعمال لدى الرضع بأعمار 3-6 شهور أو دون 5 كغم هو وفقًا لوصفة طبيب. الاستعمال من عمر 6 شهور فما فوق هو بدون وصفة طبيب.

إذا كنت تعرف وزن الطفل – يجب أن تعطيه المقدار الدوائي كما هو ظاهر في جدول الوزن الذي يشير إلى المقدار الدوائي وفقًا للوزن.

فقط في حال لم تعرف وزن الطفل – يحدد المقدار الدوائي بحسب العمر كما يظهر في جدول الأعمار الذي يشير إلى المقدار الدوائي وفقًا لعمر الطفل.

تحذير: لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

مدة العلاج: للاستعمال للمدى القصير فقط.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 24 ساعة لدى الرضع بأعمار 3-6 شهور. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة أو إذا تفاقمت, يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 3 أيام لدى الأطفال من عمر 6 شهور فما فوق. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت, يجب استشارة الطبيب.

يجب تناول الجرعة الأكثر إنخفاضًا والفترة الزمنية الأقصر للتخفيف من الأعراض.

إستشر الطبيب دون تأخير إذا كان طفلك يأخذ هذا الدواء أثناء إصابته بالعدوى وإستمرت أعراض العدوى أو تفاقمت.

طريقة التناول:

يجب دائمًا خضّ القنينة جيدًا قبل الاستعمال.

تعليمات الفتح: من أجل إزالة الغطاء, يجب الضغط عليه نحو الأسفل, وتدويره بعكس عقارب الساعة.

الأغطية المقاومة للفتح من قِبل الأطفال قُلّت بشكل ملحوظ عند حالات التسمم الناجمة عن الأدوية كل سنة. لكن, إذا كنت تستصعب عملية فتح العبوة, بإمكانك التوجه للصيدلي بطلب إزالة آلية الأمان للغطاء وتحويله لغطاء عادي, سهل الفتح.

طريقة الاستعمال: تحتوي العبوة على محقنة لقياس جرعة دوائية حتى 5 ملل.

عليك استعمال المحقنة المعدّة لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. في حال لم يتم تزويد العبوة بمحقنة, استشر الصيدلي. لا يجوز استعمال ملعقة صغيرة بيتية, من أجل قياس كمية الدواء. الملاعق الصغيرة البيتية تختلف بأحجامها ويحتمل أن لا تتلاءم كمية الدواء الصحيحة.

1. أدخل المحقنة بفوهة داخل الفوهة في عنق القنينة.
2. لتعبئة المحقنة, إقلب القنينة, اسحب المكبس بلطف نحو الأسفل بينما أنت تثبّت المحقنة في مكانها, لسحب الدواء حتى الإشارة الملائمة على ظهر المحقنة, أنظر جداول المقادير الدوائية.
3. إقلب القنينة مجدداً, أخرج المحقنة من فوهة القنينة بواسطة لفّ المحقنة بلطف.
4. أدخل طرف المحقنة لفم الطفل واضغط بلطف على أسفل المكبس لإخراج الدواء ببطء وبلطف.
5. بعد الاستعمال, أغلق القنينة بواسطة الغطاء. إغسل المحقنة بالماء الساخن وأتركها لتجف.

إذا استعملت أو أعطيت لطفلك مقدارًا دوائيًا أكبر

إذا تناولت أو إذا تناول طفلك جرعة دوائية أكبر من المطلوب أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء, توجه دائمًا للطبيب أو للمستشفى الأقرب من أجل تلقي وجهة نظر حول الخطورة والاستشارة بشأن التصرف الذي يجب اتخاذه. قد تشمل الأعراض عُثيان, ألم في البطن, تقيؤ (قد تظهر كمية قليلة من الدم), صداع, رنين في الأذنين, ارتباك وحركة عينين نضنيّة.

بمقادير دوائية مرتفعة تم التبليغ عن نعاس, ألم في الصدر, نبض قلب قوي, فقدان الوعي, تشنجات (خصوصًا لدى الأطفال), وهن ودوار, دم في البول, الشعور بالبرد في الجسم ومشاكل في التنفس.

إذا نسيت أن تستعمل الدواء إذا نسيت أن تعطي أو تتناول جرعة دوائية, أعطِ أو تناول الجرعة الدوائية التالية بحسب الحاجة, بشرط أن تكون قد مضت 4 ساعات من موعد تناول الجرعة السابقة. **لا يجوز إعطاء أو تناول جرعة دوائية مضاعفة.**

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! تحقّق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجتها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء, إن استعمال نوروفن للأطفال قد يسبب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستعملين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. يحتمل ألا تعاني أيًا منها.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا هي تهيّج في المعدة التي يمكنه التسبب بمشاكل مثل صعوبة في الهضم وحرقة.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار الطبيب فوراً في حالات مثل:

- دم في البراز • براز زقي أسود
- تقيؤ دموي أو جزيئات غامقة التي تبدو كحبيبات قهوة
- صفير غير مفسّر, ربو, ضيق في التنفس, طفح جلدي (الذي قد يكون وخيمًا ومصحوب بحويصلات أو تقشر الجلد), حكة أو كدمات, ردود فعل جلدية وخيمة تشمل متلازمة ستيڤن جونسون, نظم قلب سريع, حصر سوائل (كإحلال منتفخان أو انخفاض في كمية البول)
- رقية منصلية, صداع, عُثيان, تقيؤ, سخونة, وتوهان
- انتفاخ الوجه, اللسان أو الحلق (قد تكون هذه مؤشرات لردود فعل تحسسية وخيمة)
- رد فعل جلدي وخيم المعروف بمتلازمة DRESS (متلازمة رد الفعل الدوائي مع كثرة اليوزينيّات وأعراض جهازيّة).

تشمل أعراض (DRESS): طفح جلدي, سخونة, انتفاخ الغدد الليمفاوية وارتفاع عدد اليوزينيّات (نوع من خلايا الدم البيضاء).

- طفح جلدي أحمر, مع حراشف مُمتّد, ومع نتوءات تحت الجلد وبثرات المركزة بشكل رئيسي في طيات الجلد, مركز الجسم والأطراف العلوية, المصحوب بسخونة في بداية العلاج (بُثار طفحي حادّ مُتعمّم AGEP). (شيوع غير معروف). أنظر للبند 2.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار الطبيب في حالات مثل:

- ألم غير مفسّر في البطن, صعوبات في الهضم, حرقة, عُثيان أو تقيؤ
- إصفرار العينين, براز شاحب وبول غامق (قد تكون هذه مؤشرات لمشاكل في الكلى أو الكبد)
- ألم وخيم في الحلق المصحوب بسخونة عالية
- كمات أو نزيف غير مفسّر, إرهاق, الإصابة بأكثر تلوثات من العادة مثل تقرّحات في الفم, رشح, ألم في الحلق, سخونة (قد تكون هذه مؤشرات لفقر دم أو اضطرابات دموية أخرى).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية غير شائعة: • صداع

أعراض جانبية نادرة:

- إسهال, انتفاخ أو إمساك, أخبر الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لعدة أيام أو إذا كانت مزعجة.

أعراض جانبية نادرة جداً:

- مشاكل في الكلى أو الكبد قد تحدث عند استعمال إيبيبروفين.
- جلطة دماغية أو مشاكل في القلب قد تحدث عند استعمال إيبيبروفين. الاحتمالية لذلك منخفضة بمستوى المقادير الدوائية التي تعطى للأطفال.
- تفاقم التهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون colitis) وداء كرون.
- ارتفاع ضغط الدم.
- قرحة في المعدة, نزيف في المعدة, التهاب في مخاطية المعدة.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف:

- في حالات شاذة, حدثت ثلوثات وخيمة في الجلد والأنسجة الرخوة خلال ظهور الحُماق (Varicella). • يصبح الجلد حساساً للضوء.

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية, أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيفية تخزين الدواء

- تجنّب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العلبة والقنينة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **ظروف التخزين:** قم بالتخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

يمكن استعمال المستحضر لمدة 6 شهور بعد فتح القنينة للمرة الأولى.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعّالة على:

Xanthan gum, Sodium citrate, Citric acid monohydrate, Strawberry flavor 500244E, Sodium saccharin, Sodium chloride, Maltitol liquid, Domiphen bromide, Glycerol, Polysorbate 80, Purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: نوروفن للأطفال توت: معلّق بطعم التوت بلون الحليب. المسوّق في عبوات ذات 100 ملل, 150 ملل و- 200 ملل – من الجائز ألا تسوق جميع أحجام العلب.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: ريكيت بنكيزر (نيو إيست) م.ض, شارع هنڤار 6, هود هشارون 4527704.

اسم المنتج وعنوانه: ريكيت بنكيزر هيلث كير اينترناشيونال م.ض, هل, إنجلترا.

تم تنقيح النشرة في أيار 2023.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

نوروفن للأطفال توت: 00-31635-05-138

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.