

سوتيكتو 6 ملغ**أقراص مطليّة**

المادة الفعالة وكميّتها:

يحتوي كل قرص مطلي على 6 ملغ ديوكرافسيتنيب (deucravacitinib) مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر. انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوّجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلاني. هذا الدواء وصف للعلاج من أجلك. لا تعطه للأخرين. لأنّه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لمَ أَعْدَ هَذَا الدَّوَاء؟

يُسْتَطِبُ بـ سوتينكتو لعلاج الصدفية اللوبيجية (plaque psoriasis) المتوسطة حتى الشديدة، لدى البالغين المرشحين للعلاج الجاهزي.

المجموعة العلاجية: مثبطات جهاز المناعة الانتقائية

بحسب سوتينكتو على المادة الفعالة ديوكرافسيتنيب، التي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات التيروزين كيناز 2 (TYK2)، والتي تساعد على تقليل الالتهاب المرتبط بالصدفية (psoriasis).

الصدفية اللوبيجية هي حالة التهابية تؤثر على الجلد ويمكن أن تسبب بقع حمراء، حرشفيّة، سميكّة، مثيرة للحكّة ومؤلمة على الجلد وتؤثّر أيضًا على فروة الرأس والأظافر، راحتي اليدين والقدمين.

كيف يُعمل سوتينكتو

يُحجب سوتينكتو بشكل انتقائي نشاط الإنزيم المسمى TYK2 والذي يشارك في العملية الالتهابية. بواسطة الحد من نشاط هذا الإنزيم، سوتينكتو يمكن أن يساعد في السيطرة على الالتهاب المرتبط بالصدفية اللوبيجية وبالتالي يقلل من العلامات (جلد جاف، متشقّق، مع قشرة، متساقط أو متقدّر، أحمر ونارّف) ولذلك يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض مثل الحكة، الألم، الشعور بحرقان، وخز وشعور بشد في الجلد.

أظهر سوتينكتو أيضًا تحسناً في جودة حياة المعالجين المصابين بالصدفية. وهذا يعني أن حالة المرض يجب أن يكون لها تأثير أقل على الأنشطة اليومية للمعالج، العلاقات بين الأشخاص والعوامل الأخرى وذلك مقارنة بالتأثير في الماضي.

2. قبل استعمال الدواء**يُمنع استعمال الدواء إذا:**

- وجدت لديك حساسية (أرجية) لـ ديوكرافسيتنيب أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (كما هو مفصل في الفصل 6).
- إذا كنت تعاني من عدوى يعتقد الطبيب أنها ذات أهمية، بما في ذلك مرض سل نشط ((tuberculosis (TB)).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
قبل العلاج بـ سوتينكتو، أخبر الطبيب أو الصيدلاني إذا:

- وجدت لديك عدوى لا تزول أو تتكرر

• يوجد لديك أو كان لديك مرض السل ((tuberculosis (TB)))
• كان لديك سرطان، وذلك لأنّ الطبيب سيحتاج أن يقرر ما إذا كان لا يزال بالإمكان إعطاؤك سوتينكتو
• يوجد لديك مشاكل في القلب أو حالة طيبة تزيد من احتمال تطور مرض قلبي - ليس من الواضح ما إذا كان سوتينكتو يزيد من خطر الإصابة بمرض قلب
• كنت مصاباً أو معرضاً لخطر الإصابة بخثرات دموية في أوردة الرجلين (خثار الأوردة العميقة) أو في الرئتين (انصمام رئوي). أخبر الطبيب إذا يوجد لديك انتفاخ مؤلم في الرجل، ألم في الصدر أو ضيق في التنفس لأن هذه يمكن أن تكون علامات لحدوث خثرات دموية في الأوردة. ليس واضحاً ما إذا كان سوتينكتو يزيد من خطر الإصابة بخثرات دموية
• تلقّيت لقاً متأخراً أو تخطّط لتقاي لقاح

إذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تتطّبيق عليك، أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال سوتينكتو.

الأطفال والمراهقون

سوتيكتو غير معد للأطفال والمراهقين تحت عمر 18 سنة. لا توجد معلومات بالنسبة لسلامة ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو تتناولت مؤخراً، أو من شأنك أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- إذا تلقّيت لقاً متأخراً أو تخطّط لتقاي لقاح أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا يُفترض أن تلقّي لقاحات من نوع معين (لقاحات حيّة) عندما تستعمل سوتينكتو.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول القرص مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع**الحمل:**

إذا كنت حاملاً أو تعتدين أنك قد تكوني حاملاً أو تخططين لتحملّي، استشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء. وذلك لأنّه من غير المعروف فيما إذا كان سوتينكتو يؤثّر على الجنين.

الإرضاع:

من غير المعروف ما إذا كان سوتينكتو يطرح في حليب الأم، وبالتالي يمكن استبعاد وجود خطر على الرضيع أو الطفل الصغير الذي يرضع. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، استشيري الطبيب فيما إذا كان عليك التوقف عن الإرضاع أو الامتناع عن تناول العلاج.

السيّاحة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثّر سوتينكتو على القدرة على السيّاحة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء**يحتوي سوتينكتو على الالكتور**

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي سوتينكتو على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم لكل قرص، أي أنه عملياً "خلٍ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة وطريقة العلاج سيحدّدهما الطبيب، فقط. الجرعة المُتبعة، عادة، هي

قرص واحد (6 ملغ) كل يوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

• يجب ابتلاع القرص بشكله الكامل

• يمكن تناول القرص مع أو بدون طعام

• يُمنع سحق، شطر أو مضغ الأقراص

مدة العلاج

سوف يقرّر الطبيب المدة الزمنية لاستعمال سوتينكتو.

إذا لم تتحسن حالتك بعد 6 أشهر من العلاج، تحدث مع الطبيب.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى من سوتينكتو، أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوّجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

من الجائز أن تعايش بعض الأعراض الجانبية المفصّلة في البند 4.

إذا نسيت تناول سوتينكتو، يجب تناول الجرعة الاعتيادية في اليوم. يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتدعيم عن الجرعة المنسية.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:
• مركبات غير فعالة (لب القرص):

Microcrystalline cellulose (PH-102), anhydrous lactose, hypromellose acetate succinate, croscarmellose sodium, silica colloidal hydrated, magnesium stearate.

• يحتوي طلاء القرص على:
Polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol, talc, iron oxide red, iron oxide yellow.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة

سوتيكتو هو قرص مطلي باللون الوردي، مستدير ومحبب مطبوع عليه "BMS 895" وـ "6mg" في سطرين على جانب واحد من القرص وبدون طباعة على الجانب الآخر.

الأقراص المطلية معبأة في أشرطة ذات 7 أو 14 قرصاً.
تحتوي كل عبوة على 28 قرصاً مطلياً.

صاحب التسجيل وعنوانه

بريسنول-مايرس سكوب (إسرائيل) م.ض.
شارع أهaron بارت 18، ص.ب. 3361
كريات أريه،
پيتون تكفا

اسم المنتج وعنوانه

Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 & Province Line Road, Princeton,
New Jersey 08543, USA

تم تحريرها في نيسان 2024

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
سوتيكتو 6 ملغ: 99-37671-175-38-37671

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسييلها ورد النص بصيغة المذكورة. مع هذا فالدواء
معد لكلا الجنسين.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء
بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول سوتينكتو

يُمنع التوقف عن تناول سوتينكتو دون التحدث أولاً مع الطبيب. إذا تم إيقاف العلاج، قد تعود أعراض الصدفية.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواع. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كميّع الأدوية، قد يسبّب استعمال سوتينكتو أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدشّن عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل الآتي من أي منها:

أعراض جانبية شائعة جدًا - (**very common**) أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

• حالات عدوى في الطرق التنفسية العلوية (أنف وحنجرة) مع أعراض مثل آلم الحنجرة واحتقان الأنف.

أعراض جانبية شائعة - (**common**) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• عدوى فيروسيّة في الفم (مثل قروح البرد)
• ارتفاع في مستوى إنزيم في الدم يسمى فوسفوكيناز الكرياتين (CPK)
• تقرحات في الفم
• طفح جلدي يشبه حب الشباب
• التهاب جريبات الشعر

أعراض جانبية غير شائعة - (**uncommon**) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• القوباء المنطقية (الهربس النطقي)
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للت bliغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبّب التفقيء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الشريط وعبوة الكرتون. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

• يُمنع التخزين في درجة حرارة تزيد عن 30°C.

يُمنع استعمال الدواء إذا لاحظت ضررًا في الأقراص أو علامات فتح للعبوة. يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.