

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986** התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## טרזוסין טבע 5 מ"ג טבליות

**הרכב:** כל טבליה מכילה:

טרזוסין (כהידרוכלוריד דיהידרט) 5 מ"ג Terazosin (as hydrochloride dihydrate) 5 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגיים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, לא תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

טרזוסין טבע 5 מ"ג מיועד לטיפול סימפטומטי בחסימה של דרכי השתן כתוצאה מהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית (BPH) ולטיפול ביתר לחץ דם קל עד בינוני.

### קבוצה תרופית

חוסם סלקטיבי לוקולטן האדרנרגי (אדרנורצפטור) אלפא-1.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- הינך רגיש (אלרגי) לטרזוסין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראה סעיף/ 6 "מידע נוסף" (תגובות אלרגיות כלולות תסמינים קלים כגון גרד /או פריחה. תסמינים חמורים יותר כוללים להתנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון עם קושי בלביעה או בשנמה).
- הינך רגיש לכל אחת מהתרופות הבאות: אלפוזוסין, אינדוראמין, פרוזוסין, טמסולוסין, דוקטוזול
- אי פעם נפלטת או התעלפת בזמן הטלת שתן

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

**לפני נטילת התרופה ספר לרופא אם:**

- הינך נוטל תרופות אחרות ללחץ דם גבוה. אם התחלת ליטול תרופה ללחץ דם גבוה בזמן שהינך נוטל טרזוסין טבע 5 מ"ג, ייתכן שהרופא יצטרך להתאים את המינון של טרזוסין טבע 5 מ"ג
- יש לך בעיות כלשהן בלב
- הינך נוטל תרופות אלו אונות (לדוגמה טאדלאפיל, סילדנאפיל, וארדנאפיל)
- הינך מתכנן לעבור ניתוח להסרת קטקט

יש להשתמש בטרזוסין טבע 5 מ"ג לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית (BPH), רק לאחר שלילת סיבות אחרות לזרימת שתן חריגה/מקוטעת בדרכי השתן.

טרזוסין טבע 5 מ"ג עלול לגרום להתעלפות או ללחץ דם נמוך, בדרך-כלל לאחר המנה הראשונה או לאחר מספר מנות ראשונות. השפעות אלה עלולות לקרות גם אם אתה מופסיק ליטול טרזוסין טבע 5 מ"ג ולאחר מכן מתחיל מחדש. אין להתחיל טיפול בטיפול חדש או לחדש טיפול לאחר הפסקה אם לא ניתן להגיע למינון של 1 מ"ג ו-2 מ"ג.

טרזוסין טבע 5 מ"ג עלול לגרום גם לירידה בערכי מעבדה מסוימים, כמו תאי דם אדומים או תאי דם לבנים.

אם אחד מהמצבים הנכרים מעלה חל עליך, או אם אינך בטוח, ספר לרופא לפני נטילת התרופה.

### ילדים ומתבגרים

טרזוסין טבע 5 מ"ג אינו מומלץ לשימוש בילדים.

### אינטראקציות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ולא מרשם ונתופי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תרופות אחרות לטיפול בלחץ דם גבוה, כולל מעכבי ACE ותרופות משתנות תרופות לאיין-אונות (כגון: סילדנאפיל, סילדנאפיל, וארדנאפיל, אוונפיל) חלק מהמטופלים הנוטלים חוסמי-אלפא (משפחת התרופות שאליה משתייך טרזוסין) לטיפול בלחץ דם גבוה או בהגדלת ערמונית, עלולים לחוות סחרחורת או הרגשת סחרור, העלולים להיגרם על-ידי לחץ דם נמוך כשהם מתישבים או נעמדים במהירות.

### התרופות שאורומות ללחץ דם נמוך עם חוסמי-אלפא כוללות:

- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה – חוסמי נירון אדרנרגי (לדוגמה גואנטדין))
- אלכוהול
- תרופות לטיפול בטרסון (לדוגמה אלדסלאקוין))
- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה (לדוגמה: חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין-II, חוסמי בטא, חוסמי תעלות סידן, קלונידין, מוקסונידין, טיזאנידין, דיאזקסיד, הידלדאזין, ניטרטים, סודיום ניטרופרוסיד)
- תרופות לטיפול בכפיזופריה (אנטיספייכוטיות)
- תרופות לטיפול בהתכווצות שרירים (לדוגמה בקלופן)
- תרופות נוגדות דלקת כגון קורטיקוסטרואידים
- תרופות המשמשות להרדמה כללית לפני ניתוח
- תרופות להתקרחות (מינוקסידיל)
- תרופות לטיפול בפרקינסון (לדוגמה לבודופה ומתילדופה)
- תרופות לטיפול בדיכאון (מעכבי מונאמיין אוקסידאז)
- תרופות לכאבים בחזה (ניטרטים)
- משככי כאבים
- הורמון המין הנשי (אסטרוגן)

מטופלים מסוימים חוו תסמינים אלה בזמן נטילת תרופות לאיין-אונות (אימפוטנציה) עם חוסמי-אלפא. תרופות אלה כוללות אלפרוסטיל ומוקסיסיליט.

על-מנת להפחית את הסבירות להתרחשות תסמינים אלה, עליך ליטול מנה נמוכה קבועה של חוסמי-אלפא, לפני שאתה מתחיל ליטול תרופות לאיין-אונות.

אם אתה עומד לעבור הרדמה כללית, עליך לומר לרופא האחראי או לרופא השיניים האחראי, כי הינך נוטל טרזוסין טבע 5 מ"ג.

אם אתה עובר ניתוח עיניים עקב קטקט (עכירות של העדשה), אנא עדכן את רופא העיניים שלך לפני הניתוח כי אתה נוטל או נטלת בעבר טרזוסין טבע 5 מ"ג. זאת מכיוון שטרזוסין טבע 5 מ"ג עלול לגרום לסיבוכים במהלך הניתוח, הניתנים לשליטה, במידה שרופא העיניים שלך יהיה מוכן לכך מראש.

### שימוש בתרופה נמוזן

ניתן ליטול טבליות טרזוסין טבע עם או בלי אוכל.

### שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בטרזוסין טבע כיוון שאלכוהול עלול להגביר את הסיכון לסחרחורת, הרגשת סחרור או לינמונם.

### היריון הנקה ופוריות

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שהינך בהריון או מתכננת להיכנס להריון, התייעץ עם הרופא או הרוקח, לפני נטילת תרופה זו.

### היריון

אין להשתמש בטרזוסין טבע 5 מ"ג במהלך היריון, אלא אם הרופא הורה לך ליטול את התרופה.

### הנקה

לא ידוע אם טרזוסין עובר לחלב אם.

### פוריות

אין נתונים זמינים בנוגע לפוריות בבני אדם. ירידה בפוריות ניוון אשכים נצפו בחולדות במתן חורר של מינונים פי 30-20 מהמינון המקסימלי המומלץ לבני אדם.

### נהיגה ושימוש במכוונת

חשוב להימנע מנהיגה, שימוש במכוונת או במיצוע משימות ממוכונות במשך 12 שעות לאחר נטילת הטבליה הראשונה, מאחר שאתה עלול לחוות סחרחורת, הרגשת סחרור או מנמום.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל טבליה של טרזוסין טבע 5 מ"ג מכילה 115-5 מ"ג לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא כי יש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין להתחיל טיפול במטופל חדש במידה שלא ניתן להגיע למינון של 1 ו-2 מ"ג.

אם אינך בטוח מתי ליטול את הטבליות שלך, עליך להתייעץ עם הרופא.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

### משך הטיפול

עליך להמשיך ליטול את הטבליות שלך, אלא אם הרופא אומר לך להפסיק. **אל תפסיק** רק בגלל שאתה מרגיש טוב יותר.

### צורת הנטילה

יש ליטול את הטבליה דרך הפה, באותה השעה בכל יום, לפני השינה.

אין לחצות, לכתוש או ללעוס את הטבליה, מכיוון שלא קיים לגבי כך מידע.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר,** צור קשר עם הרופא מייד.

אם נטלת מנת יתר (יותר מטבליה אחת ביום) או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא איתך את אריזת התרופה ואת כל הטבליות שנותרו.

סימנים של מנת יתר כוללים לחץ דם נמוך, סחרחורת, הרגשת סחרור, התעלפויות, דופק מהיר או לא סדיר ובחילה.

### אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הנדרש

אם שכחת ליטול מנה, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. **אל** ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. אם לא נטלת טבליה במשך מספר ימים, **אסור** לך להמשיך להשתמש באותן טבליות, אלא עליך לחזור לרופא, שישתן לך מרשם למינון התחלתי של טרזוסין 1 מ"ג. אין להתחיל מחדש טיפול במידה ולא ניתן להגיע למינון של 1 מ"ג ו-2 מ"ג.

**יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.**

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושיך בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא איתך את אריזת **אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

**כמו בכל תרופה, השימוש בטרזוסין טבע 5 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.**

הפסק ליטול את התרופה ופנה לקבלת יעוץ רפואי מייד, אם אתה מבחין בתופעות הלוואי הבאות (עלולות להוות סימנים לתגובה אלרגית):

- גרד או פריחות בעור
- נפיחות של הפנים, השפתיים או הגרון
- קושי בנשימה או צפצופים

**כאשר נוטלים טרזוסין טבע 5 מ"ג בפעם הראשונה או כאשר מתחילים ליטול טבליות במינון גבוה יותר,** עלולים להופיע סחרחורת, הרגשת סחרור או עיילפון. תופעות אלו עלולות להופיע גם כאשר נעמדים במהירות ממצב של שכביה או ישיבה. אם אתה מושפע מכך, עליך לשכב עד שתרגיש טוב יותר, ולאחר מכן עליך לשבת מספר דקות לפני שאתה נעמד שוב. על מנת למנוע חזרתן של תופעות אלה. תופעות לוואי אלה בדרך כלל חולפות ולא אמורות לחזור לאחר שהתרגלת לתרופה.

### תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהמידע הקיים):

- ספירה נמוכה של תסיות בדם
- חולשה, סחרחורת
- דופק מהיר או לא אחיד
- בחילה
- נפיחות של כפות הידיים וכפות הרגליים
- חולשה (ירידה בחוזק השרירים)
- ישנוניות
- אף סתום
- טשטוש ראייה
- כאבי גב, כאב צוואר, כאב בכתף
- כאבים בכפות הידיים ובכפות הרגליים, תחושת עקצוץ ("סיכות ומחטים") כאב ראש

- קצב לב מוגבר, קצב לב לא סדיר
- לחץ דם נמוך אשר עלול לגרום לסחרחורת או עיילפון כשנעמדים
- אובדן הכרה
- התרחבות של כלי דם
- עלייה במשקל
- עצבנות, דיכאון, חרדה
- קוצר נשימה או קושי לנשום
- ירידה בחשק המיני, אין חנוות, קצפה מתמשכת וכואבת
- ורטיגו (בעיות בשיויון משקל שיכולות לגרום לתחושות של סחרחורת או בחילה – במיוחד בעמידה)

- כאבים בחזה
- נפיחות בפנים, הסמקה
- כאב בטן, לקקול קיבה
- בחילה, עצירות, שלשול, גזים
- יובש בפה
- דלקת או כאבים במפרקים או בשרירים
- קושי לישון
- ברונכיטיס (דלקת של הריאות)
- סינוסיטיס (דלקת של מעברי האף)
- ריניטיס (גירוי ונפיחות של הקרום היררי באף)
- דימומים מהאף
- תסמינים דמויי שפעת, כאב וגירוי של הגרון, כאב גרון, שיעול
- פריחות בעור וגרד
- הזעה
- בעיות ראייה ודלקת הלחמית
- צלצולים באוזניים
- עלייה בתדירות מנת שתן, זיהום בדרכי השתן, חוסר שליטה בשלפוחית השתן
- ספירה נמוכה של תאי דם, חריגה בבדיקות מעבדה
- חלק מהמטופלים חוו חבורות בלתי צפויות, וזמן הקרישה של הדם שלהם היה ארוך יותר מהרגיל לאחר חתך בעור.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דייווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**יש** לישמר **תרופה זו במקום יבש וחשוך, מתחת ל-25°C.**

אין להשליך תרופות לביוב או לנחל אשפה ביתי. שאל את הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, starch, crosopovidone, talc, povidone, magnesium stearate, iron oxide red and yellow.

### כיצד נראית התרופה מנה וטוּן האריזה

טבליה עגולה בצבע חום-צהבהב, "93" מוטבע בצד אחת ו-"762" בצד השני. האריזה מכילה 30 טבליות.

### יצרן ובעל הרישום וכתובות:

רח' דבורה הבינאית 124, תל אביב 6944020.

**מספר רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 138.82.31457

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**העלון נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**