

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

پاکسلو فید™
أقراص مطليّة

تحتوي پاکسلو فید على نوعين من الأقراص مع المقادير الفعالة التالية:

- يحتوي كل قرص مطلي وردي على:
نيرماتريلفير 150 mg

- يحتوي كل قرص مطلي بلون أبيض حتى كريمي (off-white) على:
ريتونافير 100 mg

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف من أجلك. لا تعطيه لآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

پاکسلو فید معدّل لعلاج مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) المُشخص لدى البالغين الذين لا يحتاجون إلى إضافة أكسجين والذين هم معرضون لخطورة متزايدة لحدوث نفاقم إلى مرض كوفيد-19 شديد.

المجموعة العلاجية: مضاد للفيروسات.

مرض كوفيد-19 ينجم عن فيروس يُسمى فيروس كورونا. يوقف پاکسلو فید تكاثر الفيروس في الخلايا، الأمر الذي يمنع تكاثر الفيروس في الجسم. يمكن لذلك أن يساعد الجسم على التغلب على العدوى الفيروسية، ويمكن أن يمنع تطور مرض خطير.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمواد الفعالة نيرماتريلفير، ريتونافير أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت تتناول أيّاً من الأدوية التالية، فإن تناول پاکسلو فید مع هذه الأدوية قد يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية شديدة أو تشكّل خطراً على الحياة أو يؤثّر على عمل پاکسلو فید:
 - الغوزوسين (العلاج أعراض تضخم البروستات)
 - رانولازين (العلاج آلام الصدر المزمنة [الذبحة الصدرية])
 - درونيدارون، بروپافينون، كينيدين (العلاج أمراض القلب وتصحيح نظم القلب غير المنتظم)
 - ريفامبيسين، ريفابينتين (العلاج حالات العدوى الجرثومية)
 - أيلوتاميد، نيراتينيب، فينيتوكلakis (العلاج السرطان)
 - كاربامازيبين، فينوباربิตال، فينيتوين، بريميدون (المنع والسيطرة على الاختلالات)
 - كولشيسين (العلاج القرص)
 - تيرفينادين (العلاج الحساسية)
 - لوراسيدون (العلاج الفصام)
 - بيموزيد، كوبتيابين (العلاج الفصام، اضطراب ثنائي القطب، اكتئاب شديد وأفكار أو مشاعر غير عادية)
 - سيلودوسين (العلاج تضخم غدة البروستات)
 - إيليرينون، إيقابرادين (العلاج مشاكل القلب وأو الأوعية الدموية).
 - ثائي هيدروأرجوتامين وإرجوتامين (العلاج حالات الصداع نتيجة الشقيقة)
 - أرجونوفين وميثيل إرجونوفين (يُستخدم لوقف التزيف المتزايد الذي قد يحدث نتيجة الولادة أو الإجهاض)

-	سيساپرید (لتخفيف بعض مشاكل المعدة)
-	St. John's wort (هيبيربوم بيرفوراتوم) (مستحضر عشبي يستعمل لعلاج الاكتئاب والقلق)
-	فوكلوسيورين (العلاج اضطرابات مناعية)
-	لوفاستاتين، سيمفاستاتين، لوميتاپيد (الخفض الكوليستيرون)
-	إنتريبتان (العلاج حالات صداع الشقيقة)
-	لوماكافتور/إيفاكافتور (العلاج التأثير الكيسى)
-	فينيرنون (العلاج مرض الكلى المزمن المرتبط بمرض السكري TYPE II)
-	نالوكسيچول (العلاج الإمساك نتيجة استخدام المواد الأفيونية)
-	أثانافيل، فاردينافيل (العلاج مشاكل الانتصاب [المعروف أيضاً بالعجز الجنسي])
-	سيلينافيل، تادالافيل (العلاج مشاكل الانتصاب [المعروف أيضاً بالعجز الجنسي] أو ارتفاع ضغط الدم الشريري الرئوي)
-	كلورازيبات، ديزيبام، أسيتازولام، فلورازيبام، تريازولام، ميدازولام عن طريق الفم (تُستعمل لتخفيف القلق وأو مشاكل النوم)
-	تولفابتان يستخدم لعلاج نقص صوديوم الدم (انخفاض مستويات الصوديوم في الدم)

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

ردود فعل تحسسية - بما في ذلك ردود فعل تحسسية شديدة (المعروفة باسم 'تأق') وردود فعل جلدية شديدة (المعروفة باسم 'انحلال البشرة الخري السمي' [toxic epidermal necrolysis] [المعروف أيضًا بالعجز الجنسي-جونسون 'Stevens-Johnson syndrome'])، يمكن أن تحدث لدى الأشخاص الذين يتناولون باكسليوفيد، حتى بعد تناول جرعة واحدة فقط. توقف عن تناول باكسليوفيد واتصل بالطبيب على الفور إذا ظهرت عليك أي من علامات الحساسية التالية:

- صعوبة في البلع أو التنفس
- انفاسان اللسان، الفم والوجه
- تضيق في الحنجرة
- بحة في الصوت
- حكة
- طفح جلدي
- احمرار وألم في الجلد
- حويصلات وتقرحات الجلد
- حويصلات أو تقرحات في الفم أو الشفتيين

خطورة لتطوير مقاومة لفيروس HIV-1 - إذا كانت لديك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية HIV غير معالجة و/أو غير مضبوطة، فقد يؤدي باكسليوفيد إلى عدم عمل بعض الأدوية لـ HIV بنفس القدر في المستقبل.

قبل العلاج به باكسليوفيد، أخبر الطبيب إذا:

يوجد لديك أو كان لديك في الماضي مرض كبد. حدثت اضطرابات في إنزيمات الكبد، التهاب الكبد (hepatitis) (hepatitis) وبرقان لدى المرضى الذين تلقوا ريتونافير.

يوجد لديك أو كان لديك مرض في الكلى.

يوجد لديك ضغط دم مرتفع. قد يحتاج الطبيب إلى فحص ضغط دمك قبل تناول باكسليوفيد وأنشاء تناولك لهذا الدواء.

كانت هناك تقارير عن ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون باكسليوفيد، وخاصة لدى كبار السن.

الأطفال والمراهقون
يُمنع إعطاء باكسليوفيد للأطفال والراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لأنه لا توجد معلومات بشأن سلامة ونجاعة الاستعمال لدى الأطفال والراهقين.

ردود فعل بين الأدوية
إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

هناك أدوية أخرى يُمنع تناولها مع باكسليوفيد. انظر البند يُمنع استعمال الدواء إذا. كذلك أخبر الطبيب أيضًا إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. بالأخص أخبر عن:

- الأدوية المستعملة لعلاج السرطان، مثل أفاتينيب، أبيماسيكلوب، سيريتينيب، داساتينيب، إنكورافينب، فوساتامينيب، إيروتينيب، إيوسيدينيب، نيلوتينيب، فينبلاستين وفينكريسين
- الأدوية المستعملة لتجميع الدم (مضادات التخثر)، مثل وارفارين، ريفاروكسابان، دابيجاتران وأبيكسابان
- الأدوية المستعملة لعلاج الاختلاجات مثل ديكالپرويكس،لاموتريجين وكلونازيبام
- الأدوية المستعملة للإقلاع عن التدخين مثل بوپروپيرون
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات الحساسية مثل فيكسيوفينادين ولوراتادين
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات العدوى الفطرية (مضادات الفطريات)، مثل إيتراكونازول وفوريكونازول
- الأدوية المستعملة لعلاج متلازمة كوشينج – عندما ينتج الجسم كمية زائدة من الكورتيزول – مثل أفراد كيتوكونازول.
- الأدوية المستعملة لعلاج عدو HIV، مثل إيفاخيرينز، مارافirok، رالتیچرافیر، زیدوفوئین وبيكتیچرافیر/امتریسیتابین/تینوفوپیر
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات العدوى (مثل المضادات الحيوية ومضادات المتفطرات)، مثل أتوفاکوین، کلاریثرومیسین، إریثرومیسین، حمض الفوسیديك (بالاعطاء عن طريق الفم أو عن طريق الوريد IV)، بیداکویلین، ریفابوتین، دیلامانید وسلفامیٹوکسازول/تریمیٹوپیریم
- الأدوية المستعملة لعلاج الفحاص والأفكار أو المشاعر غير العادية، مثل کلوزاپین
- الأدوية المستعملة لعلاج اضطرابات النفسية أو المزاجية، مثل هالوپریدول، ریسپیریدون وشیوریدازین
- الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية الرئوية، مثل بوستنان وریوسیچوات
- الأدوية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)، مثل املودیپین، دیلتیازیم، فیلودیپین، لیرکانیدیپین، نیکاردیپین، نیفیدیپین وفیراپمیل
- الأدوية المستعملة لعلاج مشاكل القلب وأو الأوعية الدموية، مثل الیسکیرین، تیکاچریلور، سیلوستازول وکلوبپروچریل
- الأدوية المستعملة لعلاج أمراض القلب وتصحيح عدم انتظام ضربات القلب، مثل دیچوکسین أمیودارون، فلیکاٹینید ودیسوپیرامید
- أدوية لعلاج التليف الكيسي، مثل إیڤاکافتور، إلیکساکافتور/تیزاکافتور/ایڤاکافتور وتیزاکافتور/ایڤاکافتور
- الأدوية المستعملة لعلاج مرض السكري مثل ساکساچیپین
- الأدوية المستعملة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي (التهاب الكبد C)، مثل چلیکاپریقیر/پیرینتسافیر وسووفوسیوپیر/فلیپاتسافیر/فوکسیلاپریقیر
- الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول في الدم، مثل انورفاستاتین، فلوفاستاتین، پروفاستاتین وروسوفاستاتين.
- الأدوية المستعملة لعلاج حالات صداع الشقيقة مثل ریمچیپانت
- الأدوية المستعملة لعلاج سلس البول، مثل داریفیناسین وسولفیفناسین
- الأدوية المستعملة لعلاج المشاكل النفسية، مثل أریبیپرازول، ب瑞کسپیرازول وکاربپرازین
- الأدوية المستعملة لتنشيط الجهاز المناعي، مثل سیکلولسپورین، ایپیروتیموس، سیرولیموس وتاکرولیموس
- الأدوية المستعملة لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الصدفي أو التهاب القولون التقرحي، مثل توافاسیتینیپ واوپاداسیتینیپ
- الأدوية المستعملة لعلاج الألم الشديد، مثل مورفين، فنتانیل، اوکسیکوکون، میಥادون، بوپرینورفین، أدوية أخرى شبيهة بالمورفين، پیثیدین وپیروکسیکام
- الأدوية المستعملة كأدبية مهدئة، منومة وتحث على النوم مثل آپرازولام، بوسپیرون وزولپیدم
- الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب نقص الانتباھ أو اضطراب النوم المسمى النوم الانتقائي، مثل أمفیتامینات ستیروئیدات بما في ذلك الكورتیکوستیروئیدات المستعملة لعلاج الالتهاب، مثل بودیزونید، دیکسامیثائزون، فلوتیکاسون، پریدنیزولون وتریامسینولون
- الأدوية المستعملة لعلاج الربو والمشاكل الأخرى المتعلقة بالرئتين مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، مثل سالمیتیرول وثیوفیلین
- الأدوية المستعملة لعلاج الاكتئاب مثل أمیترپیتیلین، فلوکستین، ایمپیرامین، نورتریپیتیلین، پاروکستین وسیرترالین
- الأدوية المستعملة كعلاج بداع للغدة الدرقية، مثل لیوثیروکسین
- الأدوية المستعملة لعلاج تضخم البروستات، مثل تامسولوسین
- أي من الأدوية التالية:
- وسائل منع الحمل الفموية أو اللصقة التي تحتوي على إیثینیل إستراديول المستعملة لمنع الحمل
 - میدازولام بالحقن (بُستعمل للتهدئة/للترکین [حالة يقطة لكن هادئة جدًا من السكون أو النعاس أثناء القيام بفحص أو إجراء طبي] أو تخدیر)

لپاکسلوفید ردود فعل بين الأدوية مع العديد من الأدوية. احتفظ بقائمة أدويتك لعرضها على الطبيب أو الصيدلي. لا تبدأ بتناول دواء جديد دون إخبار الطبيب. يمكن للطبيب أن يقدم لك استشارة إذا كان من الآمن تناول پاکسلوفید مع أدوية أخرى.

استعمال الدواء والغذاء
يمكن تناول باكسولوفيد مع أو بدون الطعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل تناول الدواء.
لا توجد معلومات كافية عن أن باكسولوفيد آمن للاستعمال أثناء الحمل. إذا كنت حاملاً، فلا يُوصى باستعمال باكسولوفيد إلا
إذا كانت حالتك الطبية تتطلب هذا العلاج.

يُوصى بتجنب النشاط الجنسي أو استعمال وسيلة لمنع الحمل أثناء تناول باكسولوفيد ولمدة 7 أيام بعد انتهاء تناول
باكسولوفيد كإجراء وقائي. إذا كنت تستعملين وسائل هرمونية لمنع الحمل، فمن الموصى به استعمال الواقي الذكري أو
غيره من وسائل منع الحمل غير الهرمونية الأخرى، لأن باكسولوفيد قد يقلل من نجاعة وسائل منع الحمل الهرمونية.
سوف ينصحك الطبيب بشأن مدة الملاعبة اللازمة لوسائل منع الحمل.

لا توجد معلومات حول استعمال باكسولوفيد أثناء الإرضاع. كإجراء وقائي، يُمنع إرضاع رضيعك أثناء تناول باكسولوفيد
ولمدة 7 أيام بعد انتهاء تناوله.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يكون لباكسولوفيد تأثير على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مرّكبات الدواء
يحتوي باكسولوفيد على لاكتوز - إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل
استعمال المستحضر.
يحتوي باكسولوفيد على الصوديوم - تحتوي كل من أقراص نيرماتريلفير وريتونافير على كمية أقل من 1 مليمول (23
ملغ) من الصوديوم لكل جرعة، مما يعني أنها تعتبر 'خالية من الصوديوم'.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.
يجب عليك الشخص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

الجرعة وطريقة الاستعمال المتبعة عادة هي:

يتكون باكسولوفيد من دوائين: نيرماتريلفير وريتونافير. الجرعة الموصى بها هي قرصين من نيرماتريلفير (أقراص
وردية) مع قرص واحد من ريتونافير (قرص أبيض) عن طريق الفم، مرتين كل يوم (صباحاً ومساءً).

يحتوي كل شريط (بليستر) على 4 أقراص نيرماتريلفير (150 ملغ كل واحد) وقرصين ريتونافير (100 ملغ كل واحد)
ووصف الأقراص التي يجب تناولها في الصباح وفي المساء (وفقاً لألوان الخلافية المختلفة).
مدة العلاج 5 أيام. لكل جرعة، يجب تناول الأقراص الثلاثة معاً في نفس الوقت.

إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن بعد 5 أيام، استشر الطبيب.

إذا يوجد لديك مرض في الكلى، يرجى التحدث مع الطبيب حول تلقى جرعة باكسولوفيد الملائمة.

يجب بلع القرص كاملاً مع الطعام أو بدونه. يُمنع مضغ، شطر أو سحق الأقراص لأنه لم يتم فحص تأثير الإعطاء بهذه
الطريقة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا تناولت جرعة أعلى من باكسولوفيد أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه، فوراً إلى الطبيب
أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول باكسليوفيد

إذا فاتتك جرعة من باكسليوفيد في نطاق 8 ساعات من الوقت المعتمد لتناولها، تناولها بمجرد أن تذكرها. إذا فاتتك الجرعة لأكثر من 8 ساعات، تخطِّي الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتمد. يُمنع تناول جرعتين من باكسليوفيد في نفس الوقت.

يُمنع تناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول باكسليوفيد

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال باكسليوفيد أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدesh عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحمّل ألا تعاني من أيٍ منها.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1-10% من مستعملين من بين 100):

- إسهال
- نقiro
- غثيان
- تغير في حاسة التذوق (مثل طعم معدني، مر)
- صداع

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 1,000):

- رد فعل تحسسي
- ضغط دم مرتفع
- ألم بطن
- ألم عضلات
- طفح في الجلد (تم الإبلاغ عنه أيضًا كجزء من رد فعل تحسسي)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 10,000):

- رد فعل تحسسي شديد يعرف باسم 'ناق' (مثل انفاسان، الفم والوجه، صعوبة في البلع أو التنفس، تضيق الحنجرة أو بحة في الصوت)
- ردود فعل جلدية خطيرة تعرف باسم 'انحلال البشرة النخري السمي' [toxic epidermal necrolysis] (مثل احمرار وألم في الجلد، ومتلازمة ستيفنس-جونسون) [Stevens-Johnson syndrome] (مثل احمرار وألم في الجلد، حويصلات وتقرّب الجلد، حويصلات أو تقرّحات في الفم أو الشفتين).
- شعور عام سيء
- حكة (تم التبليغ عنها أيضًا كجزء من رد فعل تحسسي)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية جراء علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي و المجال روئية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقوّي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- لا توجد شروط تخزين خاصة. يوصى بالتخزين في درجة حرارة الغرفة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

قرص نيرماتريليفير:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, sodium stearyl fumarate
طلاء (Opadry Pink)
HPMC 2910/Hypromellose, titanium dioxide, macrogol/PEG, iron oxide red

قرص ريتونافير:

copovidone, calcium hydrogen phosphate, sorbitan laurate, sodium stearyl fumarate, silica, colloidal anhydrous, ethanol (It will not appear in the final product except in trace)

طلاء (Opadry white)

HPMC 2910/Hypromellose 6cp (E464), titanium dioxide (E171), macrogol /PEG, MW 400 (E1521), hydroxypropyl cellulose (E463), talc (E553b), macrogol/PEG, MW 3350, MACROGOL 4000 (E1521), silica, colloidal anhydrous (E551), polysorbate 80 (E433)

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

تحتوي عبوة بaklıلو فيد على 30 قرصاً مطلياً مقسمة في 5 لوائح شريطية (بليستر) معبأة في كرتون.

يحتوي كل شريط على 4 أقراص نيرماتريليفير (150 ملغ كل واحد) وقرصين ريتونافير (100 ملغ كل واحد) ووصف الأقراص التي يجب تناولها في الصباح وفي المساء (وفقاً لأنواع الخلفية المختلفة).

قرص مطلى من نيرماتريليفير 150 ملغ: قرص وردي، بيضاوي الشكل مع ختم 'PFE' على جانب واحد و-'3CL' من الجانب الآخر.

قرص مطلى من ريتونافير 100 ملغ: قرص ذو لون أبيض حتى كريمي (off-white)، على شكل كبسولة مع ختم 'H' على جانب واحد و-'R9' على الجانب الآخر.

صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتواخ 46725

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 99-37720-58-175

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.

تم تحريرها في 02/2024.