

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986 سُوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

فينيليفرين فيجن 10% قطرات عيون (محلول)

المادة الفعالة:

كل 1 مل من فينيليفرين فيجن 10% يحتوي على 100 ملغ من المادة الفعالة: Phenylephrine Hydrochloride.

المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر - أنظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

أقرأ هذه النشرة باهتمام حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لعلاجك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدأ لك أن وضعهم الصحيح يمتثل.

1. لأي غرض مُخصَّص الدواء؟

فينيليفرين فيجن 10% يستعمل لتوسيع حدقة العين وتضييق الأوعية الدموية. الفصيلة العلاجية: محاكيات الودية (باستثناء المستحضرات المضادة للجلوكوما).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت أرجحاً (حساساً) للمادة الفعالة فينيليفرين هيدروكلوريد أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر بند 6 - "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من الجلوكوما.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء:

يجب عدم استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعة.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من ضعف وظائف القلب و/أو الأوعية الدموية.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من عيب في العينين.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من ضعف في الغدة الدرقية (التايروئيد)
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من السكري.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من ضغط الدم المرتفع.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو دواء، عليك إبلاغ طبيبك قبل تناول الدواء.

الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء ليس مخصصاً عادة للأطفال والرضع.

التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية أيًا كانت حول استعمال هذا المنتج، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. أعراض جانبية

كما في أي دواء، قد يؤدي استعمال فينيليفرين فيجن 10% لأعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تعاني من أي منها.

بالإضافة للفعالية المطلوبة للدواء، قد تظهر أثناء الاستعمال أعراض جانبية مثل: الصداع، حساسية العينين للضوء والوخز في العينين. إذا استمرت هذه الأعراض و/أو إذا كانت مزعجة، يجب التوجه للطبيب.

أعراض تتطلب اهتماماً خاصاً: علامات امتصاص جهازى- ارتعاش، ضربات قلب سريعة، عدم انتظام ضربات القلب، ألم في العينين، التورق الزائد، تهيج، طفح جلدي أو التهاب محلي (الذي لم يكن موجوداً قبل استخدام المستحضر). عند ظهور أحد هذه الأعراض، توقف عن العلاج وتوجه للطبيب.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أي واحد من الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

يمكن تبليغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على الرابط "تدوين على مرفوض لوزا، عكب سىول المرفوض"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة إلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمس! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان آمن، بعيداً عن متناول

خاصة إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية:

- أدوية مضادة للاكتئاب من المجموعة ثلاثية الحلقات ومن مجموعة MAOI (وخلال 21 يوماً من انتهاء استعمالها).
- جوانثيديين (Guanethidine)
- متيل دوبا (Methyldopa)
- ريسرپين (Reserpine)
- محصرات بيتا (لارتفاع ضغط الدم والقلب).

الحمل، الرضاعة:

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:

يحتوي هذا الدواء على 0.1 ملغ من بنزلكونيم كلوريد في كل 1 مل. بنزلكونيم كلوريد يمكن امتصاصه بواسطة العدسات اللاصقة اللينة وبالتالي يمكن أن يغير لونها. يجب عليك إزالة العدسات اللاصقة قبل استعمال هذا الدواء ووضعها مرة أخرى بعد 15 دقيقة. بنزلكونيم كلوريد يمكن أن يسبب تهيجاً في العينين، خاصة إذا كنت تعاني من جفاف في العينين أو من مشاكل في القرنية (الطبقة الشفافة في مقدمة العين). تحدث إلى الطبيب إذا شعرت بأحاسيس غير عادية في العين، حرقة أو ألم في العين بعد استعمال الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب.

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة وطريقة العلاج تُحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة كما حدد الطبيب المعالج.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال خارجي فقط.

1. اغسل يديك جيداً.
2. قم بإمالة رأسك إلى الخلف، أو استلقِ على السرير وبمساعدة أصبعك أبعده جفك السفلي قليلاً عن العين.
3. في المساحة الناتجة قم بتطبيق الدواء واعمض عينيك لمدة 1-2 دقائق. لا ترمش. لمنع تلوث المحلول تأكد من أن فوهة القنينة لا تتلامس مع أي سطح، بما في ذلك الإصبع أو العين واحفظ بالقنينة مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر أو إذا بلع طفل من هذا الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد يجب تناول الجرعة فور تذكرك واستشر طبيبك، لكن لا يجوز أبداً تناول جرعتين معاً! يجب الاستمرار على العلاج كما أوصى الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بهذا الدواء بدون استشارة الطبيب.

أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال نظره، وبهذا تتجنب حدوث تسمم. لا يجوز التسبب بالتقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

شروط التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة تحت 25°C، لا يجوز التجميد. بعد فتح القنينة لأول مرة: بالإمكان استعمال الدواء لمدة 28 يوماً، يجب حفظ الدواء مغلقاً بإحكام في درجة حرارة دون 25°C.

6. معلومات إضافية

إضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Sodium metabisulfite, Benzalkonium chloride, Disodium edetate, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Water for injections.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة بلاستيكية بيضاء بسعة 5 مل مع قطارة تحتوي على محلول صافٍ.

اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه: راز روكوت م.ض، شارع جيشر هميتس 31، المنطقة الصناعية، عيمك حيفر.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 175-11-37583-99

تم التفتيح في كانون الأول 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.