

אופן השימוש:

לא לבלעו! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

1. רחץ היטב את ידיך.
2. הטו ראשך לאחור, או שכב על מיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין.
3. לתוך המרווח שיווצר טפטף את התרופה ועצום את העיניים למשך 1-2 דקות. אל תעפעף.

למניעת זיהום התמיסה הקפד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו. כולל האצבע או העין ושומר את הבקבוק סגור היטב כאשר אינו בשימוש.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרת והיועץ ברופא, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהיך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפנילאפרין וזין 10% עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסובל מאף אחת מהן.
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: כאב ראש, רגישות העיניים לאור ועקצוץ בעיניים. אם התופעות הללו מתמשכות או/ו מטרידות יש לפנות לרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: סימנים של ספיגה סיסטמית - רעד, דפיקות לב מואצות, הפרשות בקצב הלב, כאב עיניים, הזעת יתר, גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר).
בהופעת אחת מהתופעות הפסק את הטיפול ופנה לרופא.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C. אין להקפיא.
לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה: ניתן להשתמש בתרופה במשך 28 ימים. יש לשמור את התרופה סגורה היטב בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium metabisulfite, Benzalkonium chloride, Disodium edetate, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוק פלסטיק לבן בנפח של 5 מ"ל עם טפטפת המכיל תמיסה צלולה.

שם היבואן ובעל הרישום וכתובתו: רר רוקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות, עמק חפר.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
175-11-37583-99

נערך בדצמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם השפוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

פנילאפרין וזין 10% טיפות עיניים (תמיסה)

חומר פעיל:

כל 1 מ"ל של פנילאפרין וזין 10% מכיל 100 מ"ג של החומר הפעיל: Phenylephrine Hydrochloride.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

פנילאפרין וזין 10% משמש להרחבת האישון והצרת כלי דם.
קבוצה תרופית: סימפאומימטית (לא כולל תכשירים נגד גלאוקומה).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פנילאפרין הידרוכלוריד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- הינך סובל מגלאוקומה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה זו מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי דם.
- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בעיניים.
- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בבלוטת התריס (תירואיד).
- הינך סובל או סבלת בעבר מסכרת.
- הינך סובל או סבלת בעבר מיתר לחץ דם.
- הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם וטופסי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה נוטל תרופות מהקבוצות הבאות:

- תרופות נגד דיכאון מקבוצת טריציקלינים ומקבוצת MAOI (ובתוך 21 יום מתום השימוש בהם).
- גואנתדין (Guanethidine)
- מתיל דופה (Methyldopa)
- רסרפין (Reserpine)
- חוסמי ביטא (ליתר לחץ דם וולב).

הריון, הנקה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

תרופה זו מכילה 0.1 מ"ג של בנזלקוניום כלוריד בכל 1 מ"ל. בנזלקוניום כלוריד יכול להיפגע בעדשות מגע וכתו יכול לשנות את צבען. עליך להסיר את עדשות המגע לפני השימוש בתרופה זו ולהרכיב אותן בחזרה לאחר 15 דקות. בנזלקוניום כלוריד יכול בנוסף לגרום לגירוי בעיניים, בייחוד אם יש לך עיניים יבשות או לרעידות בקרנית (השכבה השקופה בקדמת העין). דבר עם רופא אם אתה מרגיש תחושה לא רגילה בעין, צריבה או כאב בעין לאחר שימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אין לעבור על המנה המומלצת.