

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

# הקסידיל דנטל ג'ל

ג'ל לשימוש בחלל הפה

החומר הפעיל יריזולון: דיגלורקסידין כלורהקסידין 1% w/w

Chlorhexidine Digluconate 1% w/w

רשימת החומרים הבלתי פעילים מפורטת בסעיף 6 ובסעיף 2 תחת הכותרת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף 3 בעלון זה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

## 1. למה מיועדת התרופה?

לעיסוב היווצרות פלאק.

- כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'ינגיטיס).
  - כעזר בשמירה על היגיינת הפה.
  - לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים.
  - לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפסטרות בפה.
  - כעזר למניעה של עששת לנמצאים בסיכון גבוה, בנוסף לפלואוריד.
- החומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונט הוא חומר אנטיביוטי-אנטי-המפחית את היווצרות הפלאק.

## 2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

**אתה רגיש (אלרגי)** לחומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

## אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- **אין להשתמש בתרופה ביולדים מתחת לגיל 12 שנים,** אלא בהמלצת רופא שיניים.
- **אין להשתמש בתרופה בכל מקום אחר למעט בפה שלך.** שטוף ביסודיות את התכשיר בא במגע עם העיניים או עם האוזניים שלך.
- **אין להשתמש בתרופה מיד לאחר צחצוח השיניים שלך.** משחת השיניים יכולה לפגוע בפעילות התכשיר. לאחר צחצוח השיניים יש לשתוף את הפה ביסודיות במים ולהמתין 5 דקות בטרם השימוש בהקסידיל דנטל ג'ל. להימנע יתן להשתמש בהקסידיל דנטל ג'ל בזמן אחר במהלך היום.
- **הפסק את השימוש בהקסידיל דנטל ג'ל ופנה לסייע רפואי דחוף אם הנך חווה תגובה אלרגית קשה.** ראה מידע נוסף בסעיף 4.
- **ייתכן הכתמה זמנית של השיניים ושל הלשון.** ראה מידע נוסף בסעיף 4.
- הנך עלול להבחין בשינוי בתחושת הטעם או בתחושת צריבה. ראה מידע נוסף בסעיף 4.
- **אין להלביץ בדיש שהיו במגע עם הג'ל.**
- **תגובות בין תרופתיות:**
- **אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**
- **הריון, הנקה ופוריות:**

אין עדות לפגיעה בעובר בשימוש עם הקסידיל דנטל ג'ל. הנך יכולה להשתמש בהקסידיל דנטל ג'ל אם את בהריון או מניקה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

הקסידיל דנטל ג'ל מכיל את הרכיב PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (Macrogolglycerol Hydroxystearate) (Macrogolglycerol Hydroxystearate) (הוא נקרא גם: Castor Oil) העלול לגרום לגירוי בעור.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

**המינון המומלץ הוא:**

• **דלקת חניכיים:** צמצם את שיניך למשך דקה אחת לפחות, פעם או פעמיים ביום תוך שימוש ב-2 ס"מ של ג'ל. המשך בטיפול למשך כחודש אחד.

• **כיבים בפה ופסטרות בפה:** מרח ג'ל ישירות על האזורים הכואבים באמצעות קצה האצבע שלך או מקלון צמר גפן פעם או פעמיים ביום למשך דקה אחת לפחות. המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר הריפוי.

• **דלקות פה בעקבות שיניים תותבות:** לפני הכנסת התותבות, מרח בעדינות הקסידיל דנטל ג'ל על התותבות באזורי המגע עם החניכיים.

• **כעזר למניעה של עששת או לאחר ניתוחים דנטליים:** השתמש לפי הוראות רופא השיניים שלך.

אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא שלך.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

אין לשימוש מקומי בחלל הפה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הממועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהקסידיל דנטל ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

• **הפסק להשתמש בהקסידיל דנטל ג'ל ופנה מיד לעזרה רפואית** אם מופיעות אצלך פריחה, **נפיחות של השפתיים, הלשון, הגרון או הנפיש** או אם יש לך **קשיי נשימה**. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה ונדירה מאוד.

• **הפסק להשתמש בג'ל ופנה לרופא השיניים שלך** אם מופיעים אצלך **גירוי, כאב או נפיחות בפה.**

**תופעות לוואי אחרות שיכולות להתרחש:**

תופעות לוואי ששייכותן אינה ידועה (תופעות ששייכותן טרם נקבעה):

- **הכתמה זמנית של הלשון.** ההכתמה נעלמת עם הפסקת הטיפול.
  - **הכתמה זמנית של השיניים.** הכתמה זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול להימנע מהכתמה באמצעות הימנעות משתיית תה, קפה או יין אדום, במיוחד בשעה שלאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה סעיף 3). אם ההכתמה נותרת, היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השינינית. אתה יכול לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות.
  - ייתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם או בתחושת צריבה כאשר אתה משתמש בג'ל לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול.
- אם הופיעה תופעת לוואי, או אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי כשנצויה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות ליחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. איך לאחסן את התרופה

- מנע הרגליהם תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ילדו וטווח אריזתו של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרת תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- **חיי מדף אחרת פתיחה ראשונה:** לאחר פתיחה ראשונה יש להשתמש בתוך 6 חודשים.

## 6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Purified Water, Isopropyl Alcohol, Hydroxypropyl Cellulose, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (Macrogolglycerol Hydroxystearate), Sodium Acetate Anhydrous, Levomenthol, Peppermint Oil.
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** שפופרת ממתכת עם פקק הברגה, אריזה בקופסת קרטון. השפופרת מכילה ג'ל שקוף בטעם מנטה ובעל ריח אופייני למנטה.
- **גודל האריזה:** שפופרת המכילה 60 גרם ג'ל.
- **יצרן ובעל הרישום:** בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. 2017400.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 175-39-36041-00
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
- עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך 01/2024.