

Lanton 15,30 – עדכוני עלונים

131-08-30988, 129-25-30761

אנו מבקשים להביא לידיעתכם שעודכנו העלון לצרכן והעלון לרופא

מרכיב פעיל : Lansoprazole

חוזק: 15mg,30mg

התוויה:

- Treatment of duodenal and gastric ulcer
- Treatment of reflux oesophagitis
- Prophylaxis of reflux oesophagitis
- Eradication of Helicobacter pylori (H. pylori) concurrently given with appropriate antibiotic therapy for treatment of H. Pylori-associated ulcers
- Treatment of NSAID-associated benign gastric and duodenal ulcers in patients requiring continued NSAID treatment
- Prophylaxis of NSAID-associated gastric ulcers and duodenal ulcers in patients at risk requiring continued therapy
- Symptomatic gastroesophageal reflux disease
- Zollinger-Ellison syndrome.

עלון לרופא:

העלון לרופא הוכן במתכונת אימוץ רפרנס העלון לרופא כלשונו בהתאם לתנאי הרישום בישראל והפורמט, ככל הנדרש.

העדכונים העיקריים שבוצעו בעלון לצרכן:

עדכונים בפרקים : אזהרות, אזהרות מיוחדות

- אם אתה נוטל לנטון במשך יותר משלושה חודשים, ייתכן שרמות המגנזיום בדם שלך עלולות לרדת. תסמינים של רמות מגנזיום נמוכות: עייפות, התכווצויות שרירים לא רצוניות, חוסר התמצאות/בלבול, עוויתות, סחרחורת, עלייה בקצב לב. אם אתה מבחין באחד מהתסמינים הללו, אנא ספר לרופא שלך בהקדם. רמות נמוכות של מגנזיום יכולות להוביל גם להפחתה ברמות האשלגן או הסידן בדם. הרופא שלך עשוי להחליט לבצע בדיקות דם סדירות כדי לעקוב אחר רמות המגנזיום בדם שלך.
- לנטון עלול להשפיע על יעילות ספיגת ויטמין B12 במיוחד בנטילה ממושכת. עליך ליצור קשר עם הרופא המטפל אם אתה מבחין באחד מהתסמינים הבאים, העלולים להצביע על רמות נמוכות של ויטמין B12:
 - עייפות קיצונית או חוסר אנרגיה
 - תחושת עקצוץ ונימול
 - כאב או אדמומיות בלשון, כיבים בפה
 - חולשת שרירים
 - הפרעות בראייה
 - בעיות עם זיכרון, בלבול, דיכאון
- תגובות עור חמורות כולל תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידמי רעלני, תגובת תרופה עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים (DRESS) דווחו בקשר לטיפול בלנטון....
- בעת נטילת לנטון, עלולה להיווצר דלקת בכליות. התסמינים הינם- ירידה בנפח השתן, דם בשתן, תגובות רגישות יתר המתבטא בחום, פריחה ונוקשות מפרקים. יש לדווח על תסמינים אלו לרופא.

עדכון בפרק תופעות לוואי

תופעות לוואי נדירות: אנמיה- עילפון, נימול(פראסתזיה) , בעיות בכליות (דלקת, שינויים במתן שתן, דם בשתן)...

תופעות לוואי נדירות מאוד: היפונתרמיה- ירידה ברמתנתרן (תסמינים כוללים בחילות הקאות, כאבי ראש, נמנום ועייפות, בלבול, חולשת שרירים או עוויתות, עצבנות, התקפים ותרדמת), עליה ברמת כולסטרול וטריגליצרידים. קוליטיס קולגנית..

בנוסף נעשו עדכוני עריכה וניסוח קלים.

למידע המלא יש לעיין בעלונים בשלמותם להלן קישור לעלונים הסופיים.
העלונים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות (www.health.gov.il), וניתן גם לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת מעבדות רפא בע"מ בטל': 02-5893939 או בכתובת דוא"ל RA@rafa.co.il.

בכבוד רב,
מגר' חנה הירש
רוקחת ממונה
מעבדות רפא בע"מ

