



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

نوكتورنو 3.75 نوكتورنو فورته 7.5 أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من نوكتورنو **3.75** على:

زوبيكلون **3.75** ملغ

يحتوي كل قرص من نوكتورنو فورته **7.5** على:

Zopiclone 3.75 mg

Zopiclone 7.5 mg

لمعلومات عن المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر:
أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من آجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

نوكتورنو مخصص لمعالجة الحالات التالية من إضطرابات النوم الشديدة:
أ. الأرق المؤقت.
ب. الأرق قصير الأمد.

2) الفصيلة العلاجية: منوم ومخدر من مجموعة سيكلوبيرلونات.

قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألبرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من مركبات الدواء الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- علامات رد الفعل التحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- كنت تعاني من مرض يسبب ضعف عضلي شديد (وهن عضلي وبيبل).
- كنت تعاني من مشكلة في الأداء الوظيفي للرنين (قصور تنفسي).
- كنت تعاني من مشكلة تتوقف في أعقابها عن التنفس لافترات زمنية قصيرة أثناء الليل (إنقطاع التنفس أثناء النوم).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت ما دون عمر 18 سنة، لأنه لم تُحدد بعد نجاعة وسلامة **نوكتورنو** لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.
- تأسيب في الماضي من السير خلال النوم أو من أي سلوك شاذ آخر (مثل السيقاة، تناول الطعام، إجراء مكالمة هاتفية أو ممارسة علاقات جنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يقظاً بشكل تام بعد تناول **نوكتورنو**.

لا تتناول هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات التي ذُكرت سابقاً تنطبق عليك.
إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول **نوكتورنو**.

إذا كنت مقبلاً على إجراء فحوص الدم، من المهم إبلاغ طبيبك بأنك تتناول **نوكتورنو**.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ نوكتورنو، إحك لطبيبك إذا:

- كنت تعاني من أية مشاكل في الكبد (أنظر أيضاً الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا") من الجائز أن يضطر الطبيب إلى أن يعطيك مقدارا دوائيا مُخفّضاً من **نوكتورنو**.

- كنت تعاني من أية مشاكل في الكلى، من الجائز أن يضطر الطبيب إلى أن يعطيك مقدارا دوائيا مُخفّضاً من **نوكتورنو**.

- كنت تعاني من مشاكل بسيطة في التنفس. يقرر الطبيب فيما إذا توجب عليك تلقي **نوكتورنو** (أنظر أيضاً الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").

- وُجد لديك في الماضي إضطراب نفسي (بما في ذلك إكتئاب وإضطراب في الشخصية) أو أسأت إستعمال أو تعلقت بالكحول أو بالمخدرات.
- إستعملت مؤخراً **نوكتورنو** أو أدوية أخرى مشابهة لفترة أكثر من 4 أسابيع.

خطورة إساءة الإستعمال والتعلق

إن إستعمال **نوكتورنو** قد يؤدي إلى تطور إساءة الإستعمال و/أو التعلق الجسدي والنفسي. تزداد خطورة التعلق مع المقدار الدوائي ومع مدة العلاج وتكون أكبر عندما تكون مدة العلاج بـ **نوكتورنو** أكثر من 4 أسابيع، ولدى متعاطييه لديهم سابقة لإضطرابات نفسية و/أو إساءة إستعمال الكحول، المواد غير القانونية أو المخدرات.

الدواء غير مخصص لمعالجة الإكتئاب.

نوكتورنو والصحّة النفسية

قد يقاسي بعض الأشخاص الذين يتلقون علاج بـ **نوكتورنو** من مشاكل في الصحّة النفسية مثل أفكار غير واقعية (أوهام)، رؤية أو سماع أشياء غير واقعية (هلوسة)، الشعور بإرتباك أو توهم (هذيان)، غضب، عصبية، قلة راحة أو إكتئاب.

بالإضافة لذلك، أظهرت عدة أبحاث وجود خطورة زائدة لحدوث أفكار إنتحارية، محاولة الإنتحار والإنتحار لدى متعاطييه يتناولون أدوية معينة للتهنئة وأدوية لمعالجة مشاكل النوم، بما في ذلك هذا الدواء. لكن، لم يُحدد فيما إذا نجح ذلك من الدواء أو من الجائز أن هناك أسباب أخرى. إذا وُجدت لديك **أفكار إنتحارية**، راجع طبيبك بأسرع ما يمكن لتلقي **إستشارة طبية إضافية**.

نوكتورنو وسلوك شاذ

قد يؤدي **نوكتورنو** إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السيقاة، تناول الطعام، إجراء مكالمة هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يقظاً بشكل تام. في صباح اليوم التالي من الجائز ألا تتذكر أنك فعلت شيئاً خلال الليل. هذه النشاطات من شأنها أن تحدث سواء كنت أو لم تكن تشرب الكحول أو تتناول أدوية أخرى تسبب لك التنعاس سوية مع **نوكتورنو**. إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض المفصلة أعلاه، فتوقف عن العلاج بـ **نوكتورنو** فوراً واتصل بالطبيب أو بغيره من الطاقم الطبي الخاص بك.

قبل تناول **نوكتورنو**، من المهم التأكد من أن باستطاعتك النوم على الأقل 7 حتى 8 ساعات من النوم المتواصل، وذلك للمساعدة على تقليل خطورة حدوث أعراض جانبية معينة (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات أعلاه تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول **نوكتورنو**.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

هذا الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين ما دون عمر 18 سنة. **نوكتورنو** قد يُغيّر من نسب إنزيمات الكبد التي تظهر في فحوص الدم، هذا الأمر قد يدل على خلل في الأداء الوظيفي للكبد لديك.

حدث شق في الشفة والحلك (يسمى أحياناً "شفة الأرنب") لدى المولود. قد يحدث تناقص في حركة الجنين وتغيرات في نظم قلب الجنين وذلك بعد تناول **نوكتورنو** خلال الثلث الثاني و/أو الثالث من الحمل.

إذا تم تناول **نوكتورنو** في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فقد يبدي رضيعك ضعفاً في العضلات، تناقصاً في حرارة الجسم، صعوبة في الإطعام ومشاكل في التنفس (تنثبيط تنفسي).

إذا تم تناول هذا الدواء بشكل دائم في مراحل الحمل المتأخرة، فقد يتطور لدى رضيعك تعلق جسدي وقد يكون معرضاً لخطورة تطوير أعراض الفطام، مثل عصبية أو رجفان. في مثل هذه الحالة يجب مراقبة المولود بشكل حثيث خلال الفترة التي تلي الولادة.

الإرضاع

لا يجوز تناول **نوكتورنو** إذا كنت في فترة الإرضاع أو تخططين للإرضاع. وذلك لأن كميات ضئيلة قد تنتقل إلى حليب الأم.

- الأدوية المستعملة في العمليات الجراحية (أدوية التخدير).
- أدوية للتهنئة، للتقليل من القلق أو أدوية لمشاكل النوم (أدوية ذات تأثير منوم)

أدوية لمعالجة حمى العلف، الطبخ، أو الحساسيات الأخرى، التي قد تسبب لك التنعاس (مضادات الهيستامين المنومة) مثل كلورفينيرامين أو پروميتازين.

- أدوية معينة لتسكين الألم المتوسط حتى الشديد (مسكنات الألم المخدرة)، مثل كودئين، ميتامون، مورفين، أوكسيكودون، بتيدين أو ترامادول.

بالمشابه للأدوية الأخرى لمشاكل النوم، فمن شأن **نوكتورنو** أن يؤدي لتباطؤ الأداء الوظيفي السليم للدماغ (تنثبيط الجهاز العصبي المركزي). إن خطورة حدوث تضرر نفسي حركي بما في ذلك تضرر القدرة على السيقاة، تزداد إذا:

- كنت تقوم بنشاطات تتطلب منك اليقظة خلال 12 ساعة من تناول **نوكتورنو**.
- كنت تتناول مقداراً دوائياً أكبر من المقدار الدوائي الموصى به من **نوكتورنو**.

كنت تتناول **نوكتورنو** في حين أنك تتناول حالياً دواء آخر ميثبط للجهاز العصبي المركزي أو دواء آخر الذي يرفع من نسب **نوكتورنو** في دمك، أو خلال شرب الكحول.

لا يجوز ممارسة نشاطات خطيرة التي تتطلب اليقظة التامة، مثل السيقاة أو تشغيل الماكينات، بعد تناول **نوكتورنو**، وخاصة، خلال الـ 12 ساعة التي تلي تناول **نوكتورنو**.

لا يجوز تناول **نوكتورنو** في حين أنك تتناول حالياً دواء آخر ميثبط للجهاز العصبي المركزي أو دواء آخر الذي يرفع من نسب **نوكتورنو** في دمك، أو خلال شرب الكحول.
يتم إستعمال **نوكتورنو** ومستحضرات أفبونية المفعول بالترازن فقط عندما تكون خيارات العلاج الأخرى غير كافية. الرجاء أخبر طبيبك عن كافة الأدوية ذات المفعول الأفبوني التي تستعملها وإحرص على التقيد بإرشادات الطبيب فيما يتعلق بالمقدار الدوائي.

الأدوية التالية قد تقلل من تأثير **نوكتورنو**:

- أدوية معينة لمعالجة الصرع، مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال أو فينيتوين.

- ريفامبيسين (مضاد حيوي) لمعالجة التلوثات.

St. John's wort (دواء أساسه نباتي) لمعالجة تغيرات الحالة النفسية والإكتئاب.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول خلال فترة إستعمال **نوكتورنو**. قد يزيد الكحول من تأثير الدواء وأن يسبب لك نوماً عميقاً جداً، بحيث تنففس بشكل غير سليم أو أن تعاني من صعوبة في الإستيقاظ.

الحمل، الإرضاع والحصولية

لا يوصى بإستعمال **نوكتورنو** خلال فترة الحمل. إستشرى طبيبك قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل.

يحدث شق في الشفة والحلك (يسمى أحياناً "شفة الأرنب") لدى المولود. قد يحدث تناقص في حركة الجنين وتغيرات في نظم قلب الجنين وذلك بعد تناول **نوكتورنو** خلال الثلث الثاني و/أو الثالث من الحمل.

إذا تم تناول **نوكتورنو** في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فقد يبدي رضيعك ضعفاً في العضلات، تناقصاً في حرارة الجسم، صعوبة في الإطعام ومشاكل في التنفس (تنثبيط تنفسي).

إذا تم تناول هذا الدواء بشكل دائم في مراحل الحمل المتأخرة، فقد يتطور لدى رضيعك تعلق جسدي وقد يكون معرضاً لخطورة تطوير أعراض الفطام، مثل عصبية أو رجفان. في مثل هذه الحالة يجب مراقبة المولود بشكل حثيث خلال الفترة التي تلي الولادة.

الكبار

المقدار الدوائي الاعتيادي هو قرص واحد من **نوكتورنو فورته 7.5** (7.5 ملغ) حالاً قبل النوم.

المسنون

المقدار الدوائي الإبتدائي الاعتيادي هو قرص واحد من **نوكتورنو 3.75** (3.75 ملغ) حالاً قبل النوم. من الجائز أن يتم رفع المقدار الدوائي في السيقا، بحسب الحاجة.

يجب الحذر والإستناد أثناء النهوض من الفراش!

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين دون عمر 18 سنة. لم تُحدد بعد نجاعة وسلامة **نوكتورنو** لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

متعاجون لديهم مشاكل في الكبد، في التنفس أو في الكلى

المقدار الدوائي الإبتدائي الاعتيادي هو قرص واحد من **نوكتورنو 3.75** (3.75 ملغ) حالاً قبل النوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!

فترة العلاج

فترة العلاج الاعتيادية هي يومين حتى 3 أسابيع.

تناول الدواء

- يجب بلع الدواء مع الماء.

- لا يجوز شطر، سحق أو مضغ الأقراص.

يجب تناول المقدار الدوائي المطلوب من **نوكتورنو** دفعة واحدة ولا يجوز تناول جرعة إضافية بنفس الليلة.

يجب تناول المستحضر عندما تكون في الفراش، حالاً قبل النوم، والتأكد من أنه يمكنك النوم 7-8 ساعات من دون إنزعاج.

إذا تناولت مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر معه علبة الدواء.

إن تناول جرعة مفرطة من **نوكتورنو** هو خطير جداً. فأنت قد تعاني من الأعراض التالية:

- الشعور بنعاس، إرتباك، نوم عميق لا بل إمكانية حدوث سبات.

- إرتخاء العضلات (قلة التوتر).

الشعور بدوار، ضبابية أو إغماء. هذه الأعراض هي جراء إنخفاض ضغط الدم.

- سقوطات أو فقدان التوازن (ترنح).

- تنفّس سطحي أو صعوبات في التنفّس (تنثبيط تنفسي).

إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول **نوكتورنو** فقط قبل النوم.

إذا نسيت تناول الدواء حالاً قبل النوم، فلا يجوز تناول الدواء في أي وقت آخر. وإلا، فأنت قد تشعر بميل للنوم، دوار وإرتباك خلال اليوم.

بأي حال من الأحوال لا يجوز تناول جرعتين سوية عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

في حال توقفك عن تناول الدواء

يجب مواصلة تناول **نوكتورنو** إلى أن يبلغك طبيبك بالتوقف عنه.

لا تتوقف عن تناول **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، بل بلغ طبيبك إذا كنت تنوي التوقف عن العلاج. يحتاج طبيبك إلى خفض المقدار الدوائي الخاص بك والتوقف عن العلاج بشكل تدريجي على إمتداد فترة من الزمن.

في حال توقفك عن العلاج بـ **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، فإن إضطرابات النوم قد تعود لديك، وأنت قد تعاني من 'أعراض الفطام'.

إذا حدثت هذه الحالة، فأنت قد تعاني من بعض الأعراض المُفصّلة لاحقاً. يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض

التأليه:

- الشعور بقلق، قلة ثبات، عصبية، هياج، إرتباك أو لديك نوبات من القلق.

- تعرق.

- صداع.

- ضربات قلب أسرع أو غير منتظمة (خفقان).

- تدني مستوى اليقظة ومشاكل في التركيز أو التمرکز أو التركيز.

- كوابيس ليالية، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة).

- حساسية مفرطة للضوء، للضحيج والممس.

- خلل في إدراك الواقع.

- خدر والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

- آلام عضلية.

- مشاكل في البطن.

في حالات نادرة قد تظهر أيضاً تشنجات (إختلاجات).

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرةٍ تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

كما لكل دواء، إن إستعمال **نوكتورنو** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدمش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توقف عن العلاج بالدواء وتوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا:

كنت تعاني من رد فعل تحسسي لـ **نوكتورنو**. العلامات يمكن أن تشمل: طفح، صعوبات في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

الشعور بنعاس، إرتباك، نوم عميق لا بل إمكانية حدوث سبات.

إرتخاء العضلات (قلة التوتر).

الشعور بدوار، ضبابية أو إغماء. هذه الأعراض هي جراء إنخفاض ضغط الدم.

سقوطات أو فقدان التوازن (ترنح).

تنفّس سطحي أو صعوبات في التنفّس (تنثبيط تنفسي).

إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول **نوكتورنو** فقط قبل النوم.

إذا نسيت تناول الدواء حالاً قبل النوم، فلا يجوز تناول الدواء في أي وقت آخر. وإلا، فأنت قد تشعر بميل للنوم، دوار وإرتباك خلال اليوم.

بأي حال من الأحوال لا يجوز تناول جرعتين سوية عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

في حال توقفك عن تناول الدواء

يجب مواصلة تناول **نوكتورنو** إلى أن يبلغك طبيبك بالتوقف عنه.

لا تتوقف عن تناول **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، بل بلغ طبيبك إذا كنت تنوي التوقف عن العلاج. يحتاج طبيبك إلى خفض المقدار الدوائي الخاص بك والتوقف عن العلاج بشكل تدريجي على إمتداد فترة من الزمن.

في حال توقفك عن العلاج بـ **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، فإن إضطرابات النوم قد تعود لديك، وأنت قد تعاني من 'أعراض الفطام'.

إذا حدثت هذه الحالة، فأنت قد تعاني من بعض الأعراض المُفصّلة لاحقاً. يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض

- الشعور بدوخة أو نعاس.

- صداع.

- تعرق.

- الشعور بإرهاق جسدي أو نفسي.

- عصبية.

- ضربات قلب أسرع أو غير منتظمة (خفقان).

- تدني مستوى اليقظة ومشاكل في التركيز أو التمرکز أو التركيز.

- كوابيس ليالية، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة).

- حساسية مفرطة للضوء، للضحيج والممس.

- خلل في إدراك الواقع.

- خدر والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

- آلام عضلية.

- مشاكل في البطن.

في حالات نادرة قد تظهر أيضاً تشنجات (إختلاجات).

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرةٍ تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

أعراض جانبية نادرة (rare) (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- الشعور بقلّة راحة أو غضب.

- الشعور بدوار أو مشاكل في التنسيق.

- إزدواج الرؤية.

- حركة غير ثابتة أو متأرجحة.

- ضعف العضلات.

- إضطراب في الهضم.

- تشكل تعلق بـ **نوكتورنو**.

- تنفّس بشكل أبطأ (تنثبيط تنفسي).

شعور غير عادي في الجلد، مثل خدر، وخز، نخز، إكتواء أو تمل

توقف عن العلاج بالدواء وتوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا:

كنت تعاني من رد فعل تحسسي لـ **نوكتورنو**. العلامات يمكن أن تشمل: طفح، صعوبات في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

الشعور بنعاس، إرتباك، نوم عميق لا بل إمكانية حدوث سبات.

إرتخاء العضلات (قلة التوتر).

الشعور بدوار، ضبابية أو إغماء. هذه الأعراض هي جراء إنخفاض ضغط الدم.

سقوطات أو فقدان التوازن (ترنح).

تنفّس سطحي أو صعوبات في التنفّس (تنثبيط تنفسي).

إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول **نوكتورنو** فقط قبل النوم.

إذا نسيت تناول الدواء حالاً قبل النوم، فلا يجوز تناول الدواء في أي وقت آخر. وإلا، فأنت قد تشعر بميل للنوم، دوار وإرتباك خلال اليوم.

بأي حال من الأحوال لا يجوز تناول جرعتين سوية عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

في حال توقفك عن تناول الدواء

يجب مواصلة تناول **نوكتورنو** إلى أن يبلغك طبيبك بالتوقف عنه.

لا تتوقف عن تناول **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، بل بلغ طبيبك إذا كنت تنوي التوقف عن العلاج. يحتاج طبيبك إلى خفض المقدار الدوائي الخاص بك والتوقف عن العلاج بشكل تدريجي على إمتداد فترة من الزمن.

في حال توقفك عن العلاج بـ **نوكتورنو** بشكل مفاجئ، فإن إضطرابات النوم قد تعود لديك، وأنت قد تعاني من 'أعراض الفطام'.

إذا حدثت هذه الحالة، فأنت قد تعاني من بعض الأعراض المُفصّلة لاحقاً. يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض

- الشعور بدوخة أو نعاس.

- صداع.

- تعرق.

- الشعور بإرهاق جسدي أو نفسي.

- عصبية.

- ضربات قلب أسرع أو غير منتظمة (خفقان).

- تدني مستوى اليقظة ومشاكل في التركيز أو التمرکز أو التركيز.

- كوابيس ليالية، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة).

- حساسية مفرطة للضوء، للضحيج والممس.

- خلل في إدراك الواقع.

- خدر والشعور بوخز في اليدين والقدمين.

- آلام عضلية.

- مشاكل في البطن.

في حالات نادرة قد تظهر أيضاً تشنجات (إختلاجات).

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرةٍ تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

أعراض جانبية نادرة (rare) (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):