

## עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיורים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פומליידומיד או. ק". 1 מ"ג

פומליידומיד או. ק". 2 מ"ג

פומליידומיד או. ק". 3 מ"ג

פומליידומיד או. ק". 4 מ"ג

חומרים פעילים:

פומליידומיד או. ק". 1 מ"ג:

כל כמוסה קשיחה מכילה 1 מ"ג פומליידומיד pomalidomide 1 mg

פומליידומיד או. ק". 2 מ"ג:

כל כמוסה קשיחה מכילה 2 מ"ג פומליידומיד pomalidomide 2 mg

פומליידומיד או. ק". 3 מ"ג:

כל כמוסה קשיחה מכילה 3 מ"ג פומליידומיד pomalidomide 3 mg

פומליידומיד או. ק". 4 מ"ג:

כל כמוסה קשיחה מכילה 4 מ"ג פומליידומיד pomalidomide 4 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים וآلרגניים: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

פומליידומיד או. ק". צפי לגורם לפגיעה קשה בעורך עד כדי גרימת מוות. אין להשתמש בתרופה זו אם את בהריון או צופה שתיכנסו להריון. עליך לפעול על-פי המלצות למניעת הריון המפורטות בעلون זה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

פומליידומיד או. ק". משמש לטיפול במבוגרים הסובלים מסוג סרטן הנקרא 'מיאלומה נפוצה'.

פומליידומיד או. ק". ניתן עט:

• שתי תרופות נוספות – תרופה הנקראת "בורטזומיב" (סוג של תרופה כימותרפית)

-

"דקסמתזון" (תרופה אנטि-דלקטיבית) במבוגרים אשר קיבלו בעבר לפחות טיפול אחד אחר – כולל לנליידומיד.

או

• תרופה אחת אחרת בשם 'דקסמתזון' (UMB-7531) במבוגרים עם מיאלומה נפוצה אשר חוזרת או החמירה. למרות שקיבלו לפחות שני טיפולים אחרים הכוללים לנליידומיד בורטזומיב) והציגו התקדמות במחלת הטיפול האחרון.

**קובצתה רפואיית:** התרופה שייכת לקבוצת תרופות המדכאות את המערכת החיסונית.

#### **מה מיאלומה נפוצה**

מיאלומה נפוצה היא סוג של סרטן שפגע בסוג מסוים של תא דם לבנים (הנקראים 'תאי פלזמה'). התאים הללו מצברים במח העצם ומתרכבים באופן בלתי נשלט. מצב זה עלול לגרום נזק לעצמות ולכליות.

על-פי-רוב אי אפשר לרפא מיאלומה נפוצה. עם זאת, אפשר להקטין מאוד את סימני המחללה וتسمיניה ואף להעלים אותם כמעט לתקופה מסוימת באמצעות ניתוח טיפול. במידה וזה קורה, מכנים זאת 'תגובה'.

#### **כיצד פומליידומייד אס. קי". פועל**

פומליידומייד אס. קי". פועל בכמה דרכי שונות:

- עצירת התפתחות התאים הסרטניים.
- גירוי חלק מן המערכת החיסונית לתקוף את התאים הסרטניים.
- מניעת התפתחות כלי הדם בגידול הסרטני.

#### היתרון בשימוש פומליידומייד אס. קי". עם בורטזומיב ודקסמטזון

כאשר פומליידומייד אס. קי". בשימוש עם בורטזומיב ודקסמטזון, באנשים אשר קיבלו לפחות טיפול נוספת, הוא יכול לעזור את החומרה של מיאלומה נפוצה:  
• בממוצע, פומליידומייד אס. קי". כשניתן עם בורטזומיב ודקסמטזוןוצר מיאלומה נפוצה מההישנות עד ל- 11 חודשים – בהשוואה ל- 7 חודשים אשר השתמשו רק בבורטזומיב או בדקסמטזון.

#### היתרון בשימוש בפומליידומייד אס. קי". יחד עם דקסמטזון

כאשר פומליידומייד אס. קי". בשימוש עם דקסמטזון, באנשים אשר קיבלו בעבר לפחות שני טיפולים אחרים, הוא יכול לעזור את החומרה של מיאלומה נפוצה:

- בממוצע, השימוש בפומליידומייד אס. קי". יחד עם דקסמטזון, דוחה התפרצויות מחודשת של מיאלומה נפוצה לפחות עד 4 חודשים בממוצע בהשוואה לחודשים בלבד אצל חולמים שהשתמשו בדקסמטזון בלבד.

### 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

ניסיונות:

• נשים:

- אל תשתמשי בתרופה זו אם הinker בהריון או מתכוננת להרות. פומליידומייד אס. קי". עלול להיות מסוכן לעובר, ועל-כן אם הinker בגיל הפוריות – אין להשתמש בתרופה מבלי לנתקוט באמצעות מתאימים למניעת הריון (אנא ראי "הריון, אמצעים למניעת הריון והנקה – מידע לנשים ולגברים").
- לאחר סיום השימוש בתרופה, יש להמתין לפחות 4 שבועות נוספים לפני שימוש להינוך להריון.

גברים:

- אל תשתמש בתרופה זו אם אין יכול או מוכן להשתמש בקונדומים בכל קיומם ייחסי מין עם אישה בגיל הפוריות (אנא ראי "הריון, אמצעים למניעת הריון והנקה – מידע לנשים ולגברים").
- אל תתרום זרע בעת נתילת התרופה, במהלך הפסיקות בין מנופת של התרופה ובמשך 4 שבועות לפחות לאחר הפסקת נתילת התרופה.

## כל המטופלים:

- אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל – פומליידomid או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6: "מידע נוספים").

## **ażhorot myichodot nogaot leshimosh batrrofa**

### **lafni htipol bafomliidomid ao. kii, sefer lrofa am:**

- סבלת אי פעם מקרישי דם – במהלך הטיפול בפומליידomid או. ק".י. אתה נמצא בסיכון מוגבר להופעת קרישי דם בורידים ובעורקים. יתכן שהרופא ימליץ לך ליטול תרופה נוספת (כגון וורפרין =קומדי) או שהוא יקטין את מנת הפומליידomid או. ק".י. כדי להקטין את הסיכון להופעת קרישי דם.
- הייתה לך אי פעם תגובה אלרגית לאחר נטילת תרופות מסווג דומה בשם: 'תלידomid' או 'לנילדomid' – כגון פריחה, גירוד, התנפחות, סחרחות או קשי נשימה.
- אתה סובל מאיספיקת לב או חווית התקף לב, אם אתה סובל מקשי נשימה, או אם אתה מעשן, אם אתה סובל מלחץ דם גבוה או רמות גבוזות של קולסטרול.
- יש לך כמות גדולה של גידולים בכל הגוף, כולל מה העצם. זה עלול לגרום למצב שבו הגידולים מתפרקים וכותזאה מכל כמות החומריים הכימיים בدم עליה באופן חריג, מה שעלול לגרום לכשל בתפקוד הכליאות. יתכן שתבחן גם בדוק לא סדר.
- המצב הזה מכונה 'תסמונת הגידול פירוק' (Tumour Lysis Syndrome).
- אתה סובל או סבלת מחלת של מערכת העצבים ההיקפית (neuropathy), שמתבטאת, למשל, בעקצוצים או כאבים בידיים או בכפות הרגליים.
- יש לך או היה לך הפטיטיס B. הטיפול בפומליידomid או. ק".י. יכול לגרום לגיפ ההפטיטיס B להיות פעיל מחדש בחולים הנחשבים נשאים וכותזאה להישנות הדיזהום. הרופא שלך יבדוק האם היה לך אי פעם הפטיטיס B.
- אתה חוות או חוות בעבר אחד או יותר מהتسمינים הבאים: פריחה על הפנים או פריחה נרחבת, עור אדום, חום גבוה, תסמים דמוני שפעת, קשריות לימפה מוגדלות (סימנים של תגובה עורית חמורה הנקרהת תגובה לתרופה, נמק איפדרמי רעלני (DRESS) או תסמונת רגישות יתר לתרופה, או תסמים מערכתיים (TEN- SJS) ראה בנוסף סעיף 4 "תופעות לוואי")

חשוב לציין שחולים במיאלומה נפוצה המקבילים טיפול בפומליידomid עלולים לפתוח סוגים נוספים של סרטן, לכן הרופא שלך צריך לבחון בתשומת לב את התועלות אל מול הסיכון כאשר הוא רושם לך את התכשיר התרופתי הנ"ל.

בכל זמן במהלך הטיפול או לאחריו, ספר לרופא באופן מיידי אם אתה חש מטושטש, חוות ראייה כפולת או אובדן ראייה, קושי בדיבור, חולשה בזרוע או ברגל, שינוי בצוואר ההליכה ושינוי המשקל, קלות חושם מתמשכת, ירידת או אובדן תחושה, אובדן זיכרון ובלבול. תסמים אלו עשויים להצביע על מצב של אירוע מוחי רב מוקדי (PML). ספר לרופא אם הוא לך תסמים אלו טרם תחילת הטיפול הרפואי.

## **ildim vmatbagrim**

פומליידomid או. ק".י. אינו מיועד לטיפול ילדים ובכעירים בני פחות מ-18 שנים.

## **badikot vomeukav**

לפני הטיפול בפומליידomid או. ק".י. ובמהלכו ייערכו לך בדיקות דם סדירות. זה נדרש

משמעותה שתרופה שאתה נוטל עלולה לגרום לירידה במספר תאי הדם שמשיעים להילחם בזיהומיים (תאי דם לבנים) ובמספר תאי הדם שמשיעים להילחם בדיומיים (טסיות דם).

הרופא יבקש מך לעבור בדיקת דם:

- לפני תחילת הטיפול.
- כל שבוע במשך שבועות הראשונים של הטיפול.
- לפחות פעם בחודש לאחר מכן, כל עוד אתה נוטל פומליידomid או. קי... על פי תוצאות הבדיקה, יתכן שהרופא ישנה את המינון של פומליידomid או. קי... אתה נוטל או יורה לן להפסיק את הטיפול. הרופא יכול לשנות את המינון או להוראות לך להפסיק ליטול את התרופה גם לאור מצבך הבריאותי הכללי.

### אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות:

**אם אתה לוקח או אם لكחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם**

**ותוספי**

תמונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. הסיבה לכך היא שפומליידimid או. קי. עלול להשפיע על האופן שבו פועלות תרופות אחרות. כמו כן, תרופות אחרות עלולות להשפיע על האופן שבו פומליידimid או. קי.

פועל. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות כלשהן נגד פטריות, כגון קטוקונזול.
- תרופות אנטיביוטיקה כלשהן, לדוגמה: ציפורפלוקסצין, אנווקסצין.
- תרופות כלשהן נגד דיכאון, כגון פלובוקסמי.

**בסוף הטיפול عليك להחזיר את כל התרופות שלא השתמשת בהן.**

### שימוש בתרופה ומazon

- אפשר ליטול את התרופות עם או ללא אוכל.

### הירין, אמצעים למניעת הירין והנקה – מידע לנשים ולגברים

יש לפעול על-פי ההנחיות שלhallן, כמפורט בתכנית לניהול סיכונים/תוכנית למניעת הירין בעת נטילת פומליידimid או. קי. (RMP/PPP). נשים וגברים שנוטלים פומליידimid או. קי. צריכים להימנע מהיכנס להירין או להכנס להירין, משום שפומליידimid צפוי לגרום נזק לעובר. את ובן זוגם צריכים להשתמש באמצעים עיליתים למניעת הירין בעת נטילת התרופה הזאת.

#### **נשים**

אל תיטלי פומליידimid או. קי. אם הינך בהירין, חשוב שתinic בהירין או מתכוננת להיכנס להירין, משום שתרופה זאת צפוי לגרום נזק לעובר. לפני תחילת הטיפול, عليك לומר לרופא אם הינך מסוגלת להרות, גם אם את חשבת שזה לא סביר.

**אם את יכולה להיכנס להירין:**

- את חייבת להשתמש באמצעים עיליתים למניעת הירין במשך 4 שבועות לפחות לפני,
- שאת מתחילה את הטיפול, במשך הזמן (כולל הפסקות בין המנות) ועד 4 שבועות

- לפחות אחרי סיום הטיפול. התייעצֵי עם הרופא שלאן איזו שיטה למניעת הירין מתאימה לך ביתר.
- בכל פעם שהרופא רושם לך מרשם, הוא יודע שאתה מבינה מה עלייך לעשות כדי למנוע הירין.
  - הרופא שלאן יסידר ביצוע של בדיקות הירין לפני תחילת הטיפול, כל 4 שבועות במהלך הטיפול (כולל הפסוקות בין המנות) ו-4 שבועות לאחר סיום הטיפול.

אם נכנסת להירין על אף אמצעי המניעה שנקטת בהם:

- עלייך להפסיק מיד את הטיפול ולפנות אל הרופא שלאן בבדיקות.

הנאה:

לא ידוע האם פומליידומייד אס. קי". מועבר בחלב-אם. הודיעי לרופא שלאן אם את מניקה או מתכנתה להניך. נדרש להחליט האם יש להפסיק להניך או להפסיק את הטיפול.

### **גברים**

- פומליידומייד אס. קי". חודר לזרע של בני-אדם.
- אם בת-הזוג שלאן בהירין או יכולת להיכנס להירין, عليك לשימוש בקונדום במשר כל תקופה הטיפול, בזמן הפסוקות בין המנות ו-4 שבועות לפחות לאחר תום הטיפול.
  - אם בת-הזוג שלאן נכנסת להירין בעת שאתה נוטל פומליידומייד אס. קי". או במהלך 4 שבועות לאחר סיום הטיפול, דוח על זה מיד לרופא. גם בת-הזוג שלאן צריכה לדוח על זה מיד לרופא שלה.
  - אל תתרום זרע במהלך הטיפול (כולל הפסוקות בין המנות) ובמשך 4 שבועות לפחות לאחר תום הטיפול.

### **תרומות דם ובדיקות דם**

אסור לך לתרום דם במהלך הטיפול (כולל הפסוקות בין המנות) ובמשך 4 שבועות לפחות לאחר תום הטיפול.

### **נהיגה ושימוש במכוונות**

פומליידומייד אס. קי". עשוי לגרום לעייפות, לSchedulerת, ירידת במצב ההכרה או עילפון. אם הינך סובל מתסמינים אלה, אין לנוהג או להפעיל כלים או מכונות.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה פומליידומייד אס. קי". מכיל נתרן**

התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) עברו כמוסה, لكن היא נחשבת למעשה "נטולת נתרן".

### **פומליידומייד אס. קי". מכיל סוכרים**

אם נאמר לך על-ידי הרופא שלאן שיש לך אי סבירות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו

## **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

רק רופא עם ניסיון בטיפול במיאלומה נפוצה יכול להורות לך ליטול פומלייד או. קי' .. נוטלים פומלייד או. קי'. יחד עם תרופה נוספת הנדרשת דקסמטזון או בשילוב דקסמטזון ובורטזומייב. עיין בעלון המצורף לדקסמטזון ובורטזומייב למידע נוסף על השימוש בהן ועל השפעותיהן.

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן השימוש יקבעו על ידי הרופא בלבד.

#### **מתי ליטול פומלייד או. קי'. עם תרופות אחרות**

פומלייד או. קי'. עם בורטזומייב ודקסמטזון

- עיין בעלונים המצורפים לבורטזומייב ודקסמטזון למידע נוסף על השימוש בהן ועל השפעותיהן.
- פומלייד או. קי', בורטזומייב ודקסמטזון נלקחים ב"מחזרי טיפול". כל מחזר טיפול נמשך 21 ימים (3 שבועות).
- ראה בטבלה מטה ליטול באיזה יום במהלך מחזר של שלושה שבועות:
  - כל יום, הבט בטבלה ומצא את היום הנוכחי על מנת לראות אילו תרופות לקחת.
  - בחלק מהימים, אתה נוטל את כל שלושת התרופות, בחלק מהימים רק שתי תרופות או אחת ובחלק מהימים אף אחת מהתרופות.

**POM : פומלייד או. קי' .. BOR: בורטזומייב, DEX: דקסמטזון**

מחזרי טיפול תשייעי ואילן				מחזרי טיפול ראשון עד שמיני			
<b>DEX</b>	<b>BOR</b>	<b>POM</b>	יום	<b>DEX</b>	<b>BOR</b>	<b>POM</b>	יום
✓	✓	✓		✓	✓	✓	1
✓		✓		✓		✓	2
		✓				✓	3
		✓		✓	✓	✓	4
		✓		✓		✓	5
		✓				✓	6
		✓				✓	7
✓	✓	✓		✓	✓	✓	8
✓		✓		✓		✓	9
		✓				✓	10
		✓		✓	✓	✓	11
		✓		✓		✓	12
		✓				✓	13
		✓				✓	14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21

לאחר השלמת כל מחזר טיפול בן 3 שבועות, התחל מחזר חדש.

**פומליידומייד או. קי". עם דקסמתזון בלבד**

- עין בעלון המצויר לדקסמתזון למידע נוסף על השימוש בו ועל השפעותיו.
- פומליידומייד או. קי". ודקסמתזון נלקחים ב"מחזרי טיפול". כל מחזר טיפול במשך 28 ימים (4 שבועות).
- ראה בטבלה מטה ליטול באיזה יום במהלך מחזר של ארבעה שבועות:
  - כל יום, הבט בטבלה ומצא את היום הנוכחי על מנת לראות אילו תרופות לקחת.
  - בחלק מהימים, אתה נוטל את שתי התרופות, בחלק מהימים רק תרופה אחת ובחalkק מהימים אף אחת מהתרופות.

**POM : פומליידומייד או. קי"., DEX: דקסמתזון, BOR: בורטוזומיב**

שם התרופה		
DEX	POM	יום
✓	✓	1
	✓	2
	✓	3
	✓	4
	✓	5
	✓	6
	✓	7
✓	✓	8
	✓	9
	✓	10
	✓	11
	✓	12
	✓	13
	✓	14
✓	✓	15
	✓	16
	✓	17
	✓	18
	✓	19
	✓	20
	✓	21
✓		22
		23
		24
		25
		26

		27
		28

- לאחר השלמת כל מחזור טיפול בן 4 שבועות, התחל מחזור חדש.

### כמה פומליידומייד אס. קי. ליטול עם תרופות אחרות

#### פומליידומייד אס. קי. עם בורטזומיב ודקסמתזון

- המינון ההתחלתי המומלץ של פומליידומייד אס. קי. הוא 4 מ"ג ליום.
- המינון ההתחלתי המומלץ של בורטזומיב יחוسب על ידי הרופא שילר ויתבסס על גובהו ומשקלך (1.3 מ"ג / מ"ר שטח הפנים של הגוף).
- המינון ההתחלתי המומלץ של דקסמתזון הוא 20 מ"ג ליום. עם זאת, אם הינך מעל גיל 75 שנים, המינון ההתחלתי המומלץ הוא 10 מ"ג ליום.

#### פומליידומייד אס. קי. עם דקסמתזון בלבד


- המינון ההתחלתי המומלץ של פומליידומייד אס. קי. הוא 4 מ"ג ליום.
- המינון ההתחלתי המומלץ לדקסמתזון הוא 40 מ"ג ליום. עם זאת, אם הינך מעל גיל 75 שנים, המינון ההתחלתי המומלץ הוא 20 מ"ג ליום.

יתכן שהרופא שלך יקטין את המינון של פומליידומייד אס. קי., בורטזומיב או של דקסמתזון או יפסיק אחת או יותר מתרופות אלה בהתאם לתוצאות של בדיקות הדם שלך, למצבך הכללי, תרופות אחרות שאולי הינך נוטל (לדוגמיה צ'יפרופולוקסצין, אנווקסצין ופלובוקסמין) ולטיפולים הלואוי של הטיפול (במיוחד פריחה או נפיחות), במידה ויויעו. אם אתה סובל מבעיות בכבד או בצליות, הרופא יבודק את מצבך בקפדיות רבה בעת הטיפול בתרפיה.

#### AIR ליטול פומליידומייד אס. קי.

- אין לשבור, לפתח או ללווע את הרכמות. אם אבקה מכוסה שבורה של פומליידומייד אס. קי. באה בmagic עם העור, שטוף מיד את העור היבש במים ובסבון.
- הוצאות הרפואית, המטפלים ובני המשפחה צריכים לבוש כפפות חד פעמיות בmagic עם המגשית או הרכמה. לאחר מכן יש להסר את הרכמות בזהירות כדי למנוע חשיפה לעור, ולהניח אותן בתוך שקית פלסטיק שניתנת לאטימה ולהשליכן בהתאם להנחיות. לאחר מכן יש לשטוף ידיים היבש עם מים ובסבון. נשים בהריון או שוחשותות שהן בהריון צריכים להימנע מגע עם המגשית או הרכמה.
- יש לבלווע את הרכמה בשמלותה - עדיף עם מים.
- אפשר ליטול את הרכמה עם או ללא אוכל.
- בכל יום יש ליטול פומליידומייד אס. קי. בערך באותה השעה.

על מנת להוציא את הרכמה מהmagשית (בליסטר) יש ללחוץ בקצת אחד של הרכמה בלבד ולהוציא מרדייד האלומיניום על ידי לחיצה. אין להפעיל לחץ על מרכז הרכמה לאחר והיא יכולה להישבר.



הרופא שלך ינחה אותך איר ומתי ליטול פומליידומייד או. קי". אם יש לך בעיות כליאות והין מקבל טיפול דיאליזה.

**marsh הטיפול בפומליידומייד או. קי".**  
עליך להמשיך במחזרי הטיפול עד שהרופא יורה לך להפסיק.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר**

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצד התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיען של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

**אם שכחת ליטול פומליידומייד או. קי".**

אם שכחת ליטול פומליידומייד או. קי". בזמן המועד, אין ליטול מנה כפולת. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל למשך.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהין לוקח תרופה. הררכב משקפיים אם הין זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה  
אל תפסיק את השימוש בתרופה מבלי להתייעץ עם רופא.**

#### 4. **תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בפומליידומייד או. קי". עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא ראשית תופעות הלואאי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

**הפסק ליטול פומליידומייד או. קי".** ופנה לרופא מיד, אם אתה מבחין בתופעת לוואי כלשהי מבין התופעות החומרות הראשונות מטה – **ייתכן שאתה זקוק לטיפול רפואי דחוף:**

- חום, צמרמורות, כאב גרון, שיעול, כיבים בפה או סימנים אחרים של זיהום (עקב ירידת במספר תאי הדם הלבנים הנלחמים בזיהום).

- דימום או חבורות לא סיבת, כולל דימום מהאף ודימומים במעיים או בKİבה(עקב ההשפעה על תאי הדם הנקראים 'טסיות דם').

- נשימה מהירה, דופק מהיר, חום וצמרמות, מיעוט שתן עד אי מתן שtan, בחילות והקאות, בלבול, חוסר הכרה (כתוצאה מזיהום בدم המכונה אלח דם או הלם ספיגה).
- שלשול חמוץ, מתmeshץ או דמי (יתכן עם כאבי בטן או חום) הנגרמים על ידי חיידקים *Clostridium difficile* Clostridium difficile
- כאב בחזה, כאב רגליים והתנפחות של הרגליים, במיוחד בחלק התחתון של הרגל או השוק (נגרם על ידי קרייש דם).
- קוצר נשימה (הנובע מזיהום חמוץ בחזה, דלקת ריאות, אי-ספיקת לב או מקריש דם).
- נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון וגרון, אשר עלולים לגרום לקשי נשימה [עקב סוגים חמוריים של תגובה אלרגית הקוראים אנגיואדמה (angioedema) ותגובה אנטיפילקטית (reaction anaphylactic)].
- סוגים מסוימים של סרטן עור (קרצינומה תאי קשך - basal cell carcinoma), אשר יכולים לשנות את מראה העור או לגרום לגידולים על העור. אם בזמן הטיפול בפומליידומייד או. קי' הינך מבחין בשינויים כלשהם בעור, ספר לרופא שלר מיד.
- הישנות של זיהום בהפטיטיס B אשר יכול לגרום להצבה של העור והعينים, שתן בצלע חום כהה, כאבי בטן לצד ימין, חום, בחילות והקאות. יש לספר מיד לרופא במידה והinic מבחין באחד מסימני אלה.
- פריחה נרחבת, חום גוף גבוהה, בלוטות למפה מוגדלות ומעורבות איברי גוף נוספת (תגובה תרופתית עם אוזיאנופיליה וסימפטומים מערכתיים היודיעים גם כ- DRESS או תסומנת רגישות יתר תרופתית, נמק איפדרמלי רעלני Necrolysis Toxic Epidermal). הפסיק לשימוש בטיבנס-ג'ונסון). הפסיק לשימוש בפומליידומייד או. קי'. אם אתה מפתח תס敏ינים אלה וצורך קשר עם רופאך או פנה לקבלת טיפול רפואי מייד.
- **הפסיק ליטול פומליידומייד או. קי' ופנה לרופא מייד אם אתה מבחין באחת מתופעות הללווא' החמורות המפורטות לעיל - יתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף.**

### תופעות לוואי אחרות

- שכיחות מאוד** (יכולות להופיע אצל יותר מ-1 מתוך 10מטופלים):
- קוצר נשימה (dyspnoea).
  - ירידת במספר תא הדם האדום הعالולה לגרום לאנמיה וכתוצאה לכך לתחות חולשה ועייפות.
  - רמות נמוכות של אשלגן בדם (היפוקלמיה) הוללות לגרום לחולשה, התכווצויות שרירים, כאבי שרירים, דפוקות לב, עקצוצים או חוסר תחושה, קוצר נשימה, שינויים במצב הרוח.
  - רמות גבוהות בדם.
  - אובדן תיאבון.
  - עצירות, שלשול, בחילה.
  - הקאות.
  - חוסר אנרגיה.
  - קושי בהירדמות או בשינה.
  - סחרחות, רעד.
  - התכווצות שרירים, חולשת שרירים.
  - כאב עצמות, כאבגב.
  - חוסר תחושה, עקצוץ או צריבה בעור, כאב בידים או ברגליים (נוירופתיה היקפית).
  - התנפחות של הגוף, כולל התנפחות של הזרועות או הרגליים.
  - זיהומים בריאות (דלקת ריאות וסימפונות).

- **ziehominim** באף, בסינויים ובגרון, הנגרמים על ידי חידוקים או נגיפים.

**שכיחות** (יכולות להופיע אצל עד 1 מתוך 10 מטופלים):

- קצב לב מהיר ולא סדיר (**פרופור פרזודורים**).
- ירידה במספר תאי הדם האדומים, תאי הדם הלבנים וטסיות הדם בו **זמןית** (**פנציטופניה**) מה שיגרום לנטייה לדימומים וחבלות. תחושת עייפות, חולשה וקוצר נשימה. עליה בסיסי לפתח **ziehominim**.
- ירידה במספר הלימפוציטים (סוג אחד של תאי הדם הלבנים) הנגרמת לעתים קרובות בשל **ziehomin** (**לימפופניה**).
- רמות נמוכות של מגניזום בدم (**היפומגנזמיה**), אשר עשויות לגרום לעייפות, חולשה כללית, התכווצות שרירים, עצבנות ועלולה לגרום לרמות נמוכות של **סידן** בדם (**היפוקלצמיה**), אשר עלולות לגרום לחוסר תחושה /או עקצוצים של הידיים, הרגליים או השפתיים, התכווצויות שרירים, חולשת שרירים, סחרחות, בלבול.
- רמות נמוכות של זרחן בדם (**היפופוטמייה**), העשויה לגרום לחולשת שרירים ועצבנות או בלבול.
- רמות גבהות של **סידן** בדם (**היפרקלצמיה**), העשויה לגרום להאטת ריפלקסים ולחולשת שרירי השلد.
- **תסמיינים דמוני שפעת** (**שפעת**).
- צמא או יובש בפה.
- **שינויים בחוש הטעם**.
- כאב בטן, בטן נפocha.
- אי יכולת מתן שתן.
- דלקת בדרכי השתן, העשויה לגרום לתחושת צריבה בעת הטלת שתן או צורך במתן שתן לעתים קרובות יותר.
- כאב באגן הירכיים.
- איבוד משקל.
- **נפילות**.
- **תחושת בלבול**.
- **מצב רוח ירוד** (**דיcanoï**).
- **נזק לכליה**.
- רמות גבהות של אשלגן בדם, עלולות לשבש את קצב הלב.
- רמות נמוכות של נתרן בדם, עלולות לגרום לעייפות ובלבול, לעוינות שרירים,
- **לפרקeosים** (**התקף אפילפטי**) או תרדמת.
- רמות גבהות של חומצה אורית (**חומצת שתן**) בדם, אשר עלולות לגרום לסוג של דלקת מפרקים הקוריה שיגdon (**gout**).
- לחץ דם נמוך, אשר עשוי לגרום לשחרחות או לעילפון.
- **עכירות של העין** (**קטרטקט**).
- חוסר תחושה, עקצוץ או צריבה בעור, כאבים בכפות הידיים או הרגליים, סחרחות, רעד.
- עור מגורה (**גרד**).
- **אובדן הכרה, עילפון**.
- **תוציאות חריגות** (**לא תקיןות**) של בדיקות (**תפקודי**) כבד.
- **דימום תור-גולגלי**.
- **ירידה** ביכולת התנועה או התחושה בידיים, בזרועות, בכפות הרגליים וברגליים בגלל נזק עצבי (**נוירופתיה סנסוריומוטורית היקפית**).
- **חו索ר** תחושה, גרד ותחושת סיכות ומחטים בעור (**נימול**).

- תחושת סחרור של הראש, המקשה על קימה ותנוועה תקינה.
- התנפחות שמקורה בנזלים.
- כיבים (חרפת).
- פריחה.
- גרד בעור.
- שלבכת חוגרת.
- התקף לב (כאב בחזה המתפשט לזרועות, לצואר, לסת, תחושת הדעה וחוסר נשימה, בחילה או הקאות).
- כאב בחזה, זיהום בחזה.
- עלייה בלחץ הדם.

#### **מופיעות לעיתים רחוקות (יכולות להופיע אצל עד 1 מתוך 100 מטופלים):**

- דלקת של הכבד (הפטיטיס) אשר עלולה לגרום לגרד עורי, הצהבהה של העור ושל האזוז הלבן של העיניים (צהבתה), צואה בצלע חיוור, שタン בצלע כהה וכאב בטן.
- בעיות בכליות הנובעות כתוצאה מפירוק התאים הסרטניים הגורם לשחרור חומרים רעלים לרום הדם (تسمונת פירוק הגוף).
- שבץ.
- תת פעילות של בלוטת התריס אשר עלולה לגרום לתסמייני עייפות, עייפות שרירים, חולשה, דופק איטי ועליה במשקל.

ששכיחותן אינה ידועה (טופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- דחיה של השתלות איברים מוצקים (כגון לב אוCBD).

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.**

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ובאמצעות דוא"ל ליחידת בטיחות המטופלים של בעל הרישום:  
report@sk-pharma.com

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מוחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה המופיע על גבי המגשית והאריזה אחורי EXP.

תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנאי אחסון**

- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

- אל תשתמש בפומליידומייד או. ק"י. אם אתה מבחין בנזק כלשהו.
- אל תשליך את התרופה לאסלה או לסל האשפה הביתי. בסוף הטיפול יש להחזיר לבית המרחת כל מוצר רפואי שלא נעשה בו שימוש. זה מסיע להגן על הסביבה.

## 6. מידע נוספת

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

pregelatinised starch, isomalt 721, isomalt 801, sodium stearyl fumarate.

**Hard Gelatin capsule Shell Size ' 4 '** - Gelatin, purified water, titanium dioxide, titanium dioxide

### Edible Ink

Strong ammonia solution, shellac, Dehydrated alcohol, black iron oxide, propylene glycol, Isopropyl Alcohol, butyl Alcohol, Purified Water, and potassium hydroxide

כמוהה קשicha של פומליידומייד או. ק"י. 1 מ"ג מכילה גם:  
yellow iron oxide

כמוהה קשicha של פומליידומייד או. ק"י. 2 מ"ג מכילה גם:  
red iron oxide, yellow iron oxide

כמוהה קשicha של פומליידומייד או. ק"י. 3 מ"ג מכילה גם:  
Brilliant blue FCF-FD&C Blue 1

כמוהה קשicha של פומליידומייד או. ק"י. 4 מ"ג מכילה גם:  
Brilliant blue FCF-FD&C Blue 1, FD&C Red#3

### כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה

כמוהות קשichות של פומליידומייד או. ק"י. 1 מ"ג: מכסה וגוף בצבע צהוב אטום עם הכתובת "LP" על גבי המכסה ו "664" על גבי גופו הכתובה  
**כמוהות קשichות של פומליידומייד או. ק"י. 2 מ"ג:** מכסה וגוף בצבע כתום אטום עם הכתובת "LP" על גבי המכסה ו "665" על גבי גופו הכתובה  
**כמוהות קשichות של פומליידומייד או. ק"י. 3 מ"ג:** מכסה וגוף בצבע ירוק אטום בהיר עם הכתובת "LP" על גבי המכסה ו "666" על גבי גופו הכתובה  
**כמוהות קשichות של פומליידומייד או. ק"י. 4 מ"ג:** מכסה וגוף בצבע כחול אטום עם הכתובת "LP" על גבי המכסה ו "667" על גבי גופו הכתובה  
 כל קופסה מכילה 21 כמוהות קשichות.

### בעל הרישום:

בעל הרישום וכותבו: ק"י. א. ס. אינטראנסיונל (או. ק"י. פארמה) בע"מ, רח' יגאל אלון 94, תל-אביב-

יפו 6789139

היצן:

Adalvo Limited :

Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zarnmit Buildings, San wann  
Industrial Estate, San Gwann SGN3000, Malta

נערך בינואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פומליידומיד א.ו. ק"י. 1 מ"ג: **175-67-37351**

פומליידומיד א.ו. ק"י. 2 מ"ג: **175-68-37352**

פומליידומיד א.ו. ק"י. 3 מ"ג: **175-69-37353**

פומליידומיד א.ו. ק"י. 4 מ"ג: **175-70-37354**

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בחלוקת בלשון זכר. על אף זאת, התרופה  
מיועדת לבני שני המינים.

KS\_POMA\_\_PIL\_01\_2024\_V1