

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשייריט) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**פרופסיה
טבליות מצופות**

כל טבלייה מצופה מכילה:

Finasteride 1 mg
פינסטריד 1 מ"ג

לרשימה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 6.1 "מה **פרופסיה** מכילה". ראה גם סעיף 2.6 " מידע חשוב ברגען החלק מהמרכיבים של **פרופסיה**".

קרא בעין את העלון עד סופו **טרם** תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על **פרופסיה**. אם יש לך שאלות נוספות נספות, שאל את הרופא שלך או רוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורי. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשולך.
- התרופה **מיועדת לשימוש בגברים בלבד** ואני **מיועדת לשימוש בנשים או בילדים**.

1. למה מיועדת פרופסיה?

פרופסיה מיועדת להגברת צמיחת שיער הראש ולמניעת נשירה נוספת של שיער בגברים מתקרחים (androgenetic alopecia)

קבוצה רפואיית: מעכבי 5-אלפא רדוקטאז

2. לפני השימוש בפרופסיה

2.1 אין להשתמש בפרופסיה אם:

- | |
|---|
| – את אישה (כיוון שתרופה זו מיועדת לגברים). מחקרים קליניים הראו פרופסיה אינה יעילה לטיפול בנשים הסובולות מנשירת שיער. |
| – אתה רגיש (אלרגי) לפינסטריד או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של תרופה זו (לרשות המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6.1). |
| – אתה כבר נוטל פינסטריד או דוטסטריד המשמשים לעבה בערמוניית בשם היפרפלזיה שפירה של הערמוניות (BPH). |

אל תיטול **פרופסיה** אם משאו מהמתואר לעיל חל עלייך. אם איןך בטוח, דבר עם הרופא שלך או רוקח.

2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בפרופסיה

לפני הטיפול ב **פרופסיה** ספר לרופא אם:

- אתה עומד לעשות בדיקת דם לסרtan הערמוני בשם PSA (prostate-specific antigen). זאת מכיוון **פרופסיה** יכולה להשפיע על תוצאות בדיקה זו.

סרtan שד

ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

שינויים במצב הרוח ודיכאון

שינויים במצב הרוח כגון מצב רוח דיכאוני, דיכאון, ובשכיחות נמוכה יותר, מחשבות אובדן, דחווחה במטופלים שטופלו ב**פרופסיה**. אם אתה חווית כל אחד מהתסמים אלה הפסיק ליטול **פרופסיה** ונסה אל הרופא שלך ליעוץ רפואי נוסף בהקדם האפשרי.

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש בפרופסיה בילדים. לא קיים מידע המראה עילוות או בטיחות של פינסטריד בילדים מתחת לגיל 18.

- 2.3 אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות**
- אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספר עלך לרוקא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין-תרופתיות.
- פרופסיה אינה משפיעה על תרופות אחרות בדרך כלל.
- אל טיפול **פרופסיה** אם אתה כבר נוטל פינסטריד או דוטסטריד, המשמשים לבעה בערמונייה בשם היפרפלזיה שפירה של הערמונייה (BPH).
 - אין מידע אודות השימוש בפרופסיה עם מינוקסידיל, סוג נוסף של תרופה להתקשרות גברית למריחה על הראש.

2.4 נטילת פרופסיה ומדוזן
ניתן ליטול **פרופסיה** עם או בלי מזון.

- 2.5 הרין, הנקה ופוריות**
פרופסיה מיועדת לטיפול בהתקשרות גברית בטבליות בלבד.
- **פרופסיה** אינה מיועדת לנטליה על-ידי נשים.
 - על נשים בהריון או שעשוות להיות בהריון או מתכוננת להרות (טבליות שלמות מצופות כדי למנוע מגע עם התרופה בזמן שימוש רגיל). זאת מכיוון שתרופה זו עלולה להשפיע על איברי המין של התינוק.
 - אם אישה בהריון באה ב מגע עם טבליות מרוסקות או שבורות של **פרופסיה**, דבר עם הרופא בלבד.

השפעות על פוריות
אי פרוון דווח בגברים שנטו פינסטריד במשך זמן ארוך והו להם גורמי סיכון אחרים שהופיעו על פוריות. נירמול ושיפור באיכות זרע דווחה לאחר הפסקת נטילת פינסטריד. לא נערכו מחקרים קליניים ארכוי-טוווח אודות ההשפעות של פינסטריד על פוריות בגברים.

- 2.6 מידע בגיןן לחילק מהמרכיבים של פרופסיה**
- פרופסיה מכילה 110.4 מ"ג לקטוז מונוהידראט. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך איסבולות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת תכשיר זה.
- פרופסיה** מכילה נתרון.
- תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרון (23 מ"ג) בטבליה, ולכן נחשבת 'נטולת נתרון'.

2.7 נהיגה ושימוש במכונאות
לא סביר שפרופסיה תשפיע על היכולת שלך לנוהג, להשתמש בכלים או מכונות.

3. כיצד השתמש בפרופסיה?
יש להשתמש בפרופסיה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בתוח בגין המינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת דרך הפה, כל יום.
יש לבלווע הטבליה עם מעט מים, עם או בלי מזון.

אין מידע בגין ריסוק/חציה/לעיסה של הטבליות.
ראה גם סעיף 2.5 "הרין, הנקה ופוריות".

אין לעבר על המנה המומלצת.
פרופסיה לא תעבור מהר יותר או טוב יותר אם טיפול אותה יותר מפעם ביום.

יתכן ויהי עלייך ליטול **פרופסיה** באופן יומי לפחות שלושה חודשים או יותר לפני שתבחן בתועלת מנטילת **פרופסיה**. **פרופסיה** יכולה לעבוד בטוח/arוך רק אם תמשיך ליטול אותה. אם התרופה לא השפיעה עלייך במשך 12 חודשים, סביר להניח שהמשך טיפול לא יעיל.

פרופסיה אינה יעילה בטיפול בהתק rheothotitis בנים (androgenetic alopecia) לאחר גיל המעבר.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר של פרופסיה
אם נטלת מנת יתר, או אם בטיעות בעלILD מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול פרופסיה
אם שכחת ליטול **פרופסיה**, אל ליטול טבילה נוספת. יש ליטול את הטבילה הבאה כרגע.
יש להתמיד בטיפול כפי שהוא מילץ על-ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא שלך.

אם אתה מספיק ליטול פרופסיה
אם תפסיך ליטול **פרופסיה**, סביר להניח כי תאבד את השיעור שצמיחת 12 חודשים מהפסקת הטיפול. עלייך לדzon על כך עם הרופא שלך.

אין ליטול תרופות בחושך! יבדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. **תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ב**פרופסיה** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת משתמשים.
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק ליטול **פרופסיה ולדבר עם הרופא שלך אם אתה חוווה:**

- **תסמיינים של תגובה אלרגית:** התנופחות של השפטנים, הפנים, הלשון והגרון שלך; קושי בבליעה; גושים מתחת לעור (סרפנדת) וקשיים בנשימה. הפסיק ליטול **פרופסיה** ודבר עם הרופא שלך באופן מיידי.
- **דיכאון** (הרגשות עצבות עמוקה וחוסר ערך).

עליך לדוח לרופא שלך מידית על שינויים כלשהם בركמת השד שלך כגון גושים, כאב, הגדלה או הפרשה מהפטמות מכיוון שאתה עשוי להיות סימני במצב חמוץ, כגון סרטן שד.

אין שכיחות: יכולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים

- **יתכן ולא תוכל להגיע לזקפה (אין אונות)**
- **יתכן ותהיה לך רירידה בחשך המיני**
- **עלולות להיות לך בעיות בשפיכה, לדוגמה רירידה בכמות הזרע הנפלטת במהלך יחס מין. לא נראה כי לרירידה זו בכמות הזרע יש השפעה על תפקוד מיני נורמלי**

שכיחות לא ידועה:

- התנופחות או רגישות בשדיים
- דפיקות לב (הרגשות פעימות הלב שלך)
- שינויים באופן שבו פועל הגוף שלך, שניתן לראות בבדיקה דם
- כאב באשכים
- נוכחות דם בנוזל הזרע
- קושי בהגעה לזקפה שנמשך גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה
- רירידה בחשך המיני שנמשך גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה
- בעיות בפליטת זרע שנמשכו גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה

- אי פרוינן אצל גברים או איכות זרע דלה
- חרדה
- מחשבות אובדניות

אם הופעה תופעת לווין, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לווין שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

האם השימוש בפרופסיה ישפיע על השיער בחלקים אחרים של הגוף?

פרופסיה אינה משפיעה על שיער בחלקים אחרים של הגוף.

מה עוד עליך לדעת על פרופסיה?

ניתן להשתמש בפינסטריד גם לסוג של בעיה בערמוניות בשם 'היפרפלזיה שפיראה של הערמוני' או BPH. מידע שנאוסף ממחקר קליני בגברים שלקו 5 מ"ג פינסטריד (מינון הגבוח פי 5 מאשר בפרופסיה) במשך 7 שנים:

- מספר הגברים שפיתחו סרטן ערמוני היה נמוך יותר בגברים שלקו פינסטריד בהשוואה לאלה שלא נטלו דבר.
- מספר הגברים שהיה להם ציון גבוח בסולם דירוג גידולים היה גבוה אצל חלק מלאה שנטלו פינסטריד בהשוואה לאלה שלא נטלו דבר.
- השפעת שימוש ארוך טווח בפינסטריד על גידולים מסווג זה אינה ידועה.

אם אתה רוצה מידע נוסף על סולם דירוג הגידולים או על מחקר זה, אנא דבר עם הרופא שלך.

דיווח תופעות לווין

ניתן לדוח על תופעות לווין למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לווין עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לווין, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את פרופסיה?

- מנע הרעלת! תרופה זו כמו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כר תמן הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בפרופסיה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן תרופה זו באזetta המקורית. יש לאחסן תרופה זו מתחת ל- C³⁰.
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד.
- אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידוע נוסף

6.1 מה פרופסיה מכילה?

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, sodium starch glycolate, hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, magnesium stearate, talc, docusate sodium, red ferric oxide (E172) and yellow ferric oxide (E172).

6.2 כיצד נראה פרופסיה ומה תוכן האריזה

הטבליות מצופות, בצבע חום בהיר, בצורת מתומן, מוטבעות עם האות "P" על צד אחד, והמילה PROPECIA על הצד השני.

גודל האריזות: 7, 10, 28, 30, 98 טבליות באזetta מגשית.
יתכן ולא כל גדי האריזות משוקרים.

旗帜: ארגון CLL, ניו ג'רזי ארה"ב

נערך במרץ 2024

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 140-64-29458