

سينتوميسين 3%

مرهم للجلد

التركيبية

كلورامفينيكول 3% Chloramphenicol

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأراجية انظر الفصل 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 -"معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج التلوثات الجلدية السطحية التي تسببها كائنات حية دقيقة حساسة لكلورامفينيكول.

الفصلية العلاجية

مضاد للجراثيم للاستعمال الموضعي.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لكلورامفينيكول أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر لاحقاً في الفصل "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية").
- كانت لديك مشاكل في الدم (خاصةً الانخفاض في عدد كريات الدم) أثناء علاج سابق بكلورامفينيكول.
- وجدت لديك سيرة مرضية عائلية لمشاكل في الدم مثل الكمية المنخفضة لكريات الدم البيضاء، الحمراء أو الصفائح الدموية.
- كانت لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك مشاكل في الجهاز الدموي أو في نخاع العظمي. يمكن أن تشمل هذه المشاكل على انخفاض خطر في كمية كريات الدم الحمراء أو على عد دموي أقل من المستوى الطبيعي.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يحتوي المستحضر على كلورامفينيكول الذي قد يسبب تغيرات في الصورة الدموية عند الاستعمال المتواصل. بموجب ذلك، يجب الامتناع عن الاستعمال المتواصل للمستحضر.

المستحضر غير مخصص للاستعمال في العينين، لا يجوز إتاحة ملامسة المستحضر لهما. في حالة ملامسته للعينين، يجب الشطف فوراً بالماء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل أدوية تؤثر على وظيفة النخاع العظمي (أدوية تقلل نشاط النخاع العظمي وتؤدي إلى عد دموي منخفض)، مثل أزاثيوبرين أو إذا كنت تتلقى علاجاً كيميائياً.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال سينتوميسين 3% أثناء الحمل أو في فترة الإرضاع، إلا إذا قرر الطبيب أن الاستعمال ضروري، لأن تأثيرات الدواء غير معروفة. إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، تظنين أنك حامل أو تحظطين حملاً فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على المركب لانولين (Lanolin) الذي قد يسبب تهيجاً جلدياً (مثلاً التهاب الجلد التماسي).

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيدهدما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المتبعة عند غياب أمر آخر من الطبيب: ادهن كمية صغيرة من المرهم على المنطقة المصابة، 4-3 مرات في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال بضعة أيام، فيجب مراجعة الطبيب ثانية. اتبه

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

إذا بلعت الدواء بالخطأ

إذا بلعت أو إذا بلع ولد المرهم، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت دهن المرهم في الوقت المحدد، فادهنه عند تذكرك، وواصل العلاج كما مذكور من قبل الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سينتوميسين 3% إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية، فيجب إيقاف استعمال الدواء ومراجعة الطبيب فوراً:

- ردود فعل تحسسية تشمل: ضيق التنفس، الحُمى، الانفتاح في الوجه، الشفتين أو اللسان، الحكّة أو الطخ الجلد مع انتفاخ الجلد (قد يكون الطخ مع انتفاخ أو مع بقع، أو قد يبدو كحويصلات صغيرة)، الجروح في الفم أو الألم في الحلق مما يسبب صعوبات في البلع أو في التنفس، الانتفاخ الجلد في اليدين، الرجلين أو الكاحلين.
- ألم في الحلق، كدمات أو عدم القدرة على التغلب على التلوثات. في حالات نادرة جداً، طرأت تغيرات على خلايا الدم لدى المرضى الذين عولجوا بكلورامفينيكول، مما سبب التعب الشديد أو الإصابة بجروح بسهولة.
- الاستعمال الجلد لكلورامفينيكول يمكن أن يؤدي أحياناً إلى تطور كائنات حية دقيقة مقاومة مثل الفطريات. إذا تطوّر ثلوث جديد أثناء العلاج بالمرهم، فيجب إبلاغ الطبيب.

تشتمل الأعراض الجانبية المحتملة على:

- لذع
- حكة
- وخز طفيف
- التهاب جلدي خفيف (ديرماتيتيس)
- تهيج

تشتمل الأعراض الجانبية النادرة على:

- كبت النخاع العظمي (حالة يكون فيها النخاع العظمي غير قادر على إنتاج كريات الدم)
- تدنّ في إنتاج كريات الدم الحمراء وموتها (فقر الدم)
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارات المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسلسل هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسلسل. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

يمكن استعمال الدواء حتى 12 شهراً بعد فتحه لأول مرة، وليس بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية.

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Petrolatum yellow (paraffin, yellow soft), Lanolin (wool fat), Mineral oil (paraffin liquid), Silica colloidal anhydrous.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

في كل عبوة توجد أنبوبة تحتوي على 10 غرامات من المرهم الأصفر اللون. اسم صاحب الامتياز والمصنع وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.،

شارع دقوره هانقينيه 124، تل أبيب 6944020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

025.11.20849

تم تحرير هذه النشرة في كانون الأول/ديسمبر 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

Syntho Oint PIL MW1223